



Columbus.

Anatomia





DE RE ANATOMICA





7117  
A


240

col. complete

COLUMBUS, M.R.

1800





Mort en 1577. Disciple de Césaire dont il releva les erreurs. Sans —  
ménagement.



REALDI  
COLVMBI CRE-  
MONENSIS, IN ALMO

GYMNASIO ROMANO  
Anatomici celeberrimi,

*Dere Anatomica libri XV.*

Hiscce iam accesserunt **IOANNIS POSTHII** Germersemij, Med.D. **OBSERVATIONES ANATOMICÆ.**

*Cum INDICE RERVM, quo hactenus caruerunt, satis copioso.*



**FRANCOFURDI,**

Apud Martinum Lechlerum, sum-  
ptibus Petri Fischeri.

**M D XCIII,**

COL VMSI CRE  
HISTORICAL IN ALMO

ONAL ROMANO  
HISTORICAL IN ALMO

ONAL ROMANO

ONAL ROMANO

ONAL ROMANO

315936







PAVLO IIII. PONT. MAX.

REALDVS COLVMBVS

Cremonensis,

S. P. D.



AVDEO mirandum  
in modū, Pont. Max.  
me opus illud de re A-  
natomica, quod ab-  
hinc multos annos in-  
choaueram, tandem  
felicissimis tuæ sanctitatis temporib. ab-  
soluisse. Quis enim pius Christianis omni-  
bus non gratuletur? quis sibi ipsi ex ani-  
mo non gaudeat se ad hæc usque tempora  
seruatum esse, cum in sedem Petri succes-  
serit sanctissimus, atque optimus senex,  
qui tanta iam inde a puero vitæ sanctita-  
te præditus sit, tanta optimarum artium

## EPISTOLA

omnium cognitione , ut huic Sanctæ Se-  
 di merito seruatus fuisse videatur : qui  
 tot integerrimorum morum exemplo, do-  
 ctrina, concionibus , sobrietate , ieiuniis  
 præsentibus, absentesque Christianæ religi-  
 onis amore inflammare possit : qui abusus  
 omnes , omnes hæreses profligare , atque  
 radicitus euellere solus queat . nullus e-  
 nim umquam post hominum memoriam  
 hæreticos , prauosque homines acrius in-  
 sectatus est : nemo religionem hæresibus  
 labefactatam melius erexit : literarum  
 studia libentius fouit. Quid, quod tu hu-  
 manos affectus omnes ita domuisti , ut  
 nemini prorsus pepercisse palam ostende-  
 ris. Cum igitur adeo acriter vitia inse-  
 cteris, adeo potenter virtutes euehas, bo-  
 nisque artibus & disciplinis humano ge-  
 neri perutilibus libens faueas, illasque pa-  
 terna charitate foveas , non dici potest  
 quantum opere gaudeam me meis, quos de A-  
 natome conscripsi libris, te Pontifice, ex-  
 tremam manum imposuisse , quos humili  
 pro-

## DEDICATORIA.

*propensoque, ut decet, animo tibi hodie  
nuncupo, tuisq; sanctissimis pedibus pro-  
uolatus sanctitatem tuam supplex exo-  
ro, ut illis, meisque omnibus benedicat,  
amplexetur, ac eos protegat. Si enim tue  
sanctitati licebit umquam per maxima  
illa quæ sustines totius Reipub. Christia-  
na negotia, meos hosce qualescumque li-  
bellos perlegere, eos non inutiles Medici-  
nae caterisque artibus iudicabis. Deus  
faxit, ut te quam diutissime incolumem  
videamus: te enim Pontifice Christiana  
Religio vel a remotissimis barbaro-  
rum nationibus, atque illius a-  
cerrimis hostibus be-  
ne audiet.*



# INDEX CAPITVM TOTIVS DE RE ANATOMICA OPERIS.

## LIB. I.

<b>P</b> rooemium pagina	1
De ossibus in vniuersum	2
De appendicibus, atque processibus ossium	6
De compositione ossium	14
Tabula compositionis ossium	16
De diuisione ossium	17
De capitis ossibus, siue caluaria	27
De osse iugali	47
De ossiculis organi auditorij	
ibidem.	
De maxilla superiore	51
De inferiore maxilla	58
De dentibus	61
De capitis foraminibus	67
De osse hyoide	76
De larynge	79
De dorso in vniuersum	84
De vertebrae ceruicis, & capitis	
motibus	88
De vertebrae thoracis	96
De lumborum vertebrae	100
De sacro & coccygis osse	103
De thorace	109
De osse pectoris	119
De scapulis	121
De clauiculis	126
De humero	128
De cubito	132
De brachiali	137
De postbrachiali	141
De digitis manus	144
De ilium osse	148
De femore	154

De tibia	159
De patella	163
De pedis ossibus, ac primum de	
talo	165
De pedio	175
De digitis pedis	176
De sciaminis	178

## LIB. II.

De cartilaginibus	180
De palpebrarum cartilaginibus	
181	
De aurium cartilaginibus	ibid.
De nasi cartilaginibus	183
De maxillae inferioris cartilaginibus	184
De asperae arteriae cartilaginibus	ibid.
De spinæ dorsi cartilaginibus	186
De cartilaginibus in superiore	
pectoris parte	ibid.
De cartilaginibus in medio	
pectore	187
De costarum cartilaginibus	ib.
De scutiformi cartilagine	188
De cartilaginibus in scapulae, co-	
xendicis, ac tibiae sinibus	189
De cartilaginibus iuxta bra-	
chiale	190
De cartilaginibus inter pubis	
ossa	ibid.
De articulorum cartilaginibus	
ibidem	
De vnguibus	191

## LIB. III.

De ligamentis	192
De capi-	

# INDEX CAPIT. LIB.

De capitis ligamentis	193	De musculis humerum mouen-	
De ligamentis capitis cum dua-		tibus	242
bus primis vertebrais	194	De musculis capitis	243
De hyoidis ac linguæ ligamentis		De musculis ceruicis	247
196		De musculis dorsi	249
De ligamentis brachialis	197	De musculis thoracem mouen-	
De ligamentis femoris tibięque		tibus	251
198		De septo transuerso	255
De ligamentis inter sacrum os,		De musculis abdominis	258
& coxendicis	199	De musculis testiculorum	264
De ligamentis tranuersis in pede		De musculis penis	ibid.
200		De musculis vteri	265
De ligamentis reliquorum arti-		De vesicæ musculus	266
culorum	ibid.	De musculis ani	ibid.
De ligamentis cubito, tibiæ, ac		De musculis femur mouentibus	
pubi oppositis	201	267	
De ligamentis hepatis	ibid.	De musculis tibiā mouentibus	
L I B. I I I I.		271	
De scelecto	202	De musculis in tibia extremo pe-	
L I B. V.		di deseruientibus	276
De musculis	215	De musculis in extremo pede	
Quid sit musculus ac de muscu-		281	
lorum differentiis	ibid.	De musculis qui cubito deser-	
De faciei musculis	219	uiunt	284
De musculis frontis	ibid.	De musculis summam manum	
De duobus musculis nasi	221	mouentibus	286
De musculis latis in collo positis		De musculis externis, qui manui	
ibidem		famulantur	291
De quatuor musculis labiorum		De musculis in extrema manu	
222		294	
De musculis supercilium trahen-		L I B. V I.	
tibus	223	De icore & venis	298
De palpebrarum musculis	224	L I B. V I I.	
De oculorum musculis	225	De corde & arteriis	232
De musculis aurium	228	L I B. V I I I.	
De musculis maxillæ inferioris		De cerebro	345
ibidem		De cerebro, eiusque membranis;	
De musculis ossis hyoidis	231	De spinali medullæ Item de ner-	
De linguæ musculis	232	uis	ibid.
De musculis laryngis	233	De organis odoratus, & neruis	
De musculis scapulas mouenti-		356	
bus	240	De neruis in vniuersum	357

# INDEX CAPITVM.

<b>D</b> eneruis medullæ spinalis post caluariam	366	De vesicula bilis	426
<b>D</b> eneruis manus	374	De renibus	427
<b>D</b> eneruis thoracis	380	De vesica	430
<b>D</b> eneruis lumborum	383	De peritonæo	432
<b>D</b> eneruis ossis sacri, & pedis	386	De abdomine	434
		De vasis seminariis	435
		De testibus	438
		De pene	440
		De utero	443
		De umbilico	445
<b>LIB. IX.</b>		<b>LIB. XII.</b>	
<b>D</b> e glandulis	392	De formatione fœtus, ac de situ infantis in utero	451
<b>LIB. X.</b>		<b>LIB. XIII.</b>	
<b>D</b> e oculis	396	De regentibus fabricam humani corporis	466
<b>LIB. XI.</b>		De cuticula, cute, pinguedine, membrana carnosâ	ibid.
<b>D</b> e visceribus	406	De pilis	469
<b>D</b> e vena, tonsillisque, necnon de tunica vestiente nasum, palatum, os, œsophagum, ventriculum, intestina, & asperam arteriam	406	De perioestio	470
<b>D</b> e pulmone	409	<b>LIB. XIII.</b>	
<b>D</b> e pleura, & mediastino	414	De viua sectione	471
<b>D</b> e œsophago, & ventriculo	416	<b>LIB. XV.</b>	
<b>D</b> e intestinis	419	De iis quæ raro in anatome conspiciuntur	482
<b>D</b> e mesenterio & omento	423		
<b>D</b> e liene	425		

FINIS.





REALDI COLVMBI  
CREMONENSIS  
DE OSSIBVS,

Liber I.



*VMANI Corporis fabricam descripturi, primum ab ossibus incipiamus: ab ea nimirum parte, ad cuius imaginem ceteras omnes effingi merito cōuenit: quādoquidem ossium structura*

*Cur ossium Anatomæ præcedat.*

*Gal. i. de Anat. administ. cap. 1.*

*eandem in corpore rationem obtinet, quam in ædificiis columna, trabes ac fundamenta. Ut enim rustici humiles sibi casas ædificaturi, inuicem primum ligna compacta intertexere solent, quæ deinde ramis, cæmentisque opplent, atque oblinunt, lutoque demum, ac palea incrustant & obtegunt, quo se a cæli, ferarum, atque hominum iniuriis aliquo pacto tueantur: Sic prope modum se ossium strues habere videbitur, si carnem ab ossibus eximas, & denudata ossa eo mo-*

do componas, & colligas, quem nos infra edo-  
cturi sumus, ubi de componendi sceleti ratione  
ex professo agemus. Enascentis etiam navis ex-  
ordium si intueberis, carinam inquam, & co-  
stas, exemplum habebis huic eidem rei accom-  
modatissimum. Ossa igitur fundamenta corpo-  
ris optimo iure dixerimus, quæ fulciant, stabili-  
antque partes alias: neutiquam enim per se con-  
sisterent, firmari ve possent, nullamque, aut certe  
imperfectam functionem obtinerent, nisi solidis  
hisce partibus adnascerentur, atq; adhærescerent.

Ordo in tra- *Quamobrem de ossibus agere primum expedit,*  
ctada Ana- *ut cum alios anatomicos, tū Galenum ipsum ita*  
tome. *inbentem sequamur. His addemus tractationem*  
Offiū Ana- *illam, quæ est de Cartilaginibus: tertio vero loco*  
tomæ sequi- *de ligamentis differemus, particulis admodum*  
tur cartila- *necessariis ad ossa unienda, compagemque ipsam*  
ginū sectio. *ossium continendam, ut ne a sua sede dimovean-*  
Postcartila- *tur, aut huc vel illuc dilabi temere possint. Et*  
gines liga- *hæc sane similia sunt vinculis, aut clavis, quibus*  
menta. *trabes connectuntur tuguriis aut carinis exadi-*  
*ficandis. Postremo, tractatum hunc concludet ea*  
De sceleti *pars, in qua sceleti faciendi artem quandā haud*  
structura *inutilem commonstrabimus.*  
postligamē-  
ta.

## CAPVT I.

Cur ab ossis *A* B ossibus itaque cum sit exordium, or-  
nomine nō *do ipse rerum tractandarum a veteribus*  
exorditur. *nobis per manus traditus exigere videretur, ut*  
*primo*

primo explicaremus, quid ossis nomine intelligi  
 velimus, nisi omnibus ea res esset quam notissi-  
 ma. Præterea dum ossium substantiam enarrabi-  
 mus, id ipsum omnino docere videbimur. No-  
 minis igitur ossiū disquisitione prætermis-  
 sa, quod non ita in promptu sit cuius ossium natura, seu  
 substantia, nomina, differentia, figura, & usus,  
 operæ pretium fuerit de his accurate, quoad eius  
 fieri potest, agere. Ossium igitur substantia ter-  
 rea quidem est maxime: scire etenim licet corpo-  
 ra omnia aut esse simplicia, qualia sunt prima  
 quatuor elementa, aut ex iis composita. Compo-  
 sitorum autem diuersam naturam esse pro varia  
 quam sumunt ab elementis portione: ea siqui-  
 dem corpora ignea dicimus, in quibus ignei plus  
 elementi viget, aerea vero, aut aquea, in quibus  
 aer, vel aqua dominatur: sic alia grauiora, alia  
 leuiora, cæterisque qualitatū differentiis præ-  
 dita magis nuncupamus eandē ob causam. Cum  
 igitur plus terra, quam reliquorum elementorū  
 in ossium natura deprehendatur: non ab re  
 terrestria illa, cum medici omnes, tum philosophi  
 appellauerunt, ac præterea durissima, frigidissi-  
 ma, aridissimaque partium omnium corporis,  
 qualis est ipsa terra: qua limitatione Galeno oc-  
 curritur, qui pilos ossibus sicciores dicit, ac etiam  
 frigidiores in fine primi temperamētorum: quo-  
 niam pili excrementa sunt, non partes corporis,  
 si proprie loquamur. Sunt etiam ossa immobilia

Ossium sub-  
 stantia ter-  
 rea.  
 Corporum  
 diuisio.

Ossa cur ter-  
 rea.

Gal: in cal-  
 ce primi de  
 tēperamen-  
 tis.

Contra Gal.



#### 4 REALD. COLUMBI CREM.

*suapte natura graua, alba, & sensus omnis expertia: quamquam non ex ea ratione dicendum mihi videtur ossa minime sentire, quod plurimo abundant elemento terreo: sed quoniam per ipsorum substantiam nulla neruorū portio disseminetur, quorum beneficio cetera omnia, quibus sensus inest, sentire pro comperto habemus. Id*

*Natura est  
Dei voluntas.*

*Ossium munus.*

*quod prudentissime Dei optimi maximi voluntate, quam naturam dicimus, factum fuisse intelligemus, si animaduertamus ossa ea esse, quae totam corpoream molem sustentent, quae frequentibus ac variis motibus cieantur, quibus motis partes reliquas secum vnā trahi, ac deferri necesse est: quae si sensu prae-dita essent, tantū non assiduos labores non sine dolore persentiscerent,*

*Si ossa sentirent, quae inconuenientia sequerentur.*

*Contra credentes ossa sentire.*

*& ea tristis, (vt vocant) sensatio aut maximam actionum partem tolleret, aut saltem frustrarentur. Neque illi audiendi sunt, qui obstinate asserunt insignem in ossibus sensum inesse, qui si adesset, cum vruntur, secantur, franguntur, ac grauius percutiuntur, sauisimis cruciatibus agros angerent, quod tamen perraro accidit, tuncque dolor ab ossibus minime proficiscitur: sed a membrana illa, quae ossibus obducitur, atq; ideo a Graecis vocatur περιosteos.*

*Quod ossa periostij gratia sentiant.*

*Quod autem ossa periostij munere, non sponte sentiant, hinc patet. Hac etenim abrasa non modo sine dolore, verum etiam sine vlllo prorsus sensu ossa secabis, cōbures, & quo lubuerit modo tractabis. Quare cum*

*Gale-*

Galeno, & aliis recte sentientibus concludamus ossa omni prorsus carere sensu; dentes tamen excipio, quos sentire omnium consensu, magistrat, experientia comprobatum est. Cuius rei rationem, ne omnia ubique cōculcentur, in suum locum reiicimus. Atque hæc prima sit ossium differentia ita obiter dicta, quæ non solum nominibus discrepant, cum singula suū sibi nomen vendicent siue proprium, siue tralatū: sed differunt etiam magnitudine, cum alia parua sint, magna alia: quin & forma, siquidem alia oblonga sunt, alia breuia, alia triangulum, alia quadrangulum referentia, vel alius figura, hæc lenia, illa aspera, alia processibus munita, alia appendices habentia, alia commissuris distincta, alia non item. Vsu quoque distinguuntur, cum ad vnā tantum functionem, aut opus commune omnia non sint destinata; quod etiā tam multiplex formarum diuersitas attestatur: videre enim est nonnulla plane cantaua, & ex his quedam cauitatem amplam habent, quedam angustam. Neque id pro magnitudine contingit ossium, quādo aliqua sunt grandia, nec tamen manifestam cauitatem habent, vt sunt ossa, quæ cum sacro committuntur, & ipsum os sacrum, scapulaque, & alia, de quibus suo loco dicemus. Parua item sunt aliqua, & insigniter cōcaua, sicuti sunt ossa digitorum, quicquid de hac re Galenus senserit primo de partium usu. Ossa omnino solida non

Prima ossiū differentia. Dentes sentiunt.

2. Ossiū differentia a magnitudine.

3. Ossiū differentia ab usu.

Ossa quæ cū sacro committuntur, os sacrum & scapulæ insigni cauitate carent.

Contra Gal. 1. de usu partium.

Ossa digitorum sunt insigniter cōcaua.

## 6 REAL. COLUMBI CREMEN.

Ossa nasi, se-  
samina, &  
auditus in-  
strumētū nō  
sunt solida.  
Contra Vesa-  
lialium.

Brachiale,  
dētes & mul-  
ta digitorū  
ossa sunt  
perforata,  
cōtra Vesa-  
lialium.  
Cur forami-  
na in ossib.

ego numerauerim ossa nasi, neque sesamina, ne-  
que oscula organum auditus constituentia: mi-  
hi enim prorsus non sunt solida, quamquam Vesa-  
lius aliter sentiat: nam si quis fracta hac, vel  
recentia, neque dum exsiccata diligenter inspi-  
ciat, in iis apparebit spongiosa quedam substan-  
tia pumici denso persimilis, sinus quosdam per-  
exiguos prae se ferens: adhuc ossa ipsa extrinsecus  
foraminibus referta sunt, sed alia magis, alia mi-  
nus, licet omnino solida videantur esse. Huius-  
modi foramina nō agnoscit Vesalius in brachia-  
li, dentibus ac permultis digitorum ossibus, qui  
tamen in hac parte parum oculatus fuit, ut in-  
fra ostendemus: hac autem foramina ne inutilia  
duxeris. nam ideo a sapientissimo rerum opifice  
Deo facta sunt, ut per ea aditus pateret tum ve-  
nis ad sanguinē crassiusculum pro nutrimento  
deferendū, tum etiā arteriis ad vitālē calorem  
cōmoderandum. At illa, quae nullis foraminibus  
donata sunt, cum neque venas, neque arterias  
admissura essent, ab adiacētibus partibus & fo-  
uentur, & nutriuntur: atque hac in vniuersum,  
& quasi per transfennam de ossium differentiis  
dicta nunc sint. Reliquum esset, ut iam ad sin-  
gulorum enarrationem veniremus, ubi planius  
omnia dignoscantur.

### CAPVT II.

Cur statim  
singula ossa  
nō explicat.

**S**ED quoniam in singulorum ossium enarra-  
tione nonnulla occurrunt nomina, quibus



in toto hoc tractatu de ossibus ut edum erit, quæ nisi prius cognita forent, dubio procul difficultatem aliquam, obscuritatemque parerent: idcirco de his antea differendum mihi esse videtur; quæ, qualiaque hæc sint, quoque significato accipi debeant: in hoc etenim præcipuos anatomicos imitari statui, qui & ipsi existimarunt horum nominum tractationem plurimum conferre ad ea percipiendâ, quæ de ossium natura, deque ipsorum compositione sunt dicenda.

Primum itaque videamus quid sit appendix quam Græci ὀστέουσι vocant: ea nihil aliud est, quam ossi os adnatum, coagmentatumque, quemadmodum linea quedam ossium capita circumscribens aperte indicat: scito autem hanc in iunioribus animalibus facillime deprehendi; in grandioribus vero, ac ætate præcæctis vix discerni posse. Nam si hædi, aut agni, vel alterius animalis nuper nati ossicula decoxeris, in eorum extremitatibus partes quasdam diuelli, ac concidere conspicias, siue id sponte, siue de industria fiat, & hæc particula superius inferiusve appositæ adnexæque appendices dicuntur, quarum utilitatem neque Galenus solertissimus alioqui nature inuestigator recte descripsit, ut Vesalius optime reprehendit. Sed neque ipse, quod magis miraberis, nouisse videtur, aut si nouit, scribere neglexit. quippe qui arderet cupiditate incredibili in Galenum inuehendi, & eius

ἰνὸς ὀστέουσι.  
appendix,  
quid sit.

Appendix in  
grandioribus  
vix cer-  
nitur.

Vesalius  
quandoque  
errat nimio  
studio repre-  
hédēd Gal.

Gale. ratio  
de appendi-  
cibus 9. de  
Vsu Part.

Vesalijratio  
contra Gal.  
de appendi-  
cibus.

Quid intel-  
ligat Vesa-  
lius per ossa  
non medul-  
losa.

Appendices  
non effedu-  
tiores ossib.  
contra Gal.

errores adnotandi, ut ad Galenum redeamus, is ix. de partium usu asserit, naturam appendicibus ossa donasse, ut operculi vicem gererem, ne scilicet medulla sinibus contenta efflueret: quam rationem satis infirmam esse, ne insul-  
sam dicam, ex eo patet (inquit Vesalius) quoni-  
am ossa huiusmodi sinibus carentia, tamen ap-  
pendicibus non sunt propterea destituta; quin &  
scapula, & vertebra, & ossa nonnulla parua,  
quamuis minime sint medullosa, suas tamen ap-  
pendices habent. Haecenus ille: et si pluribus cum  
verbis, tum etiam exemplis Galenum oppugnet:  
quo loco animadvertere oportet ossa minime me-  
dullosa Vesalium intellexisse, non quae prorsus  
medulla careant, sed quae cavitates aut sinus in-  
signes non habent, at solum cauernulas quasdam  
perexiguas, fungosam substantiam referentes,  
in quibus medulla delitescit, & propterea me-  
dullosa esse non videntur, si cum iis cōferantur,  
in quibus ampli sunt sinus, & manifesti, multa  
oppleti medulla. Illud etiam multo pacto omit-  
tendum est, quod Galenus eodem in loco addi-  
dit: Appendices scilicet, multo esse duriores  
ossibus, quod quomodo concedi possit, non equi-  
dem video: nam appendices ab ossibus auulsas  
sepius unusquisque nostrum dentibus compres-  
sit, atque attriuit; ut dulcem inde succum, &  
non iniucundum exprimeremus: quare tantum  
abest, ut appendices ossibus duriores sint, ut con-  
tra

tra in his spongiosum corpus, & molle experiamur: nisi fortasse de parte illa sensisse Galenum opinemur, qua committuntur appendices cum ipsis ossibus: sed neque hac limitatione tueri Galenum possumus. Etenim quod appendices frequentius, assiduoque motu articulorum non attendantur, non est uni appendici acceptum ferendum, quod durissima sit, sed illud contingit propterea quod inuestiatur cartilagine defsa, ac molli, quæ sua duritie, atque (vt ita dicam) vinctuositate articulationem ipsam conseruat, ne dum lubricam magis, & ad motum promptiorem facit: id quod perspicuum magis tibi fiet, si consideraueris, non omnia ossa, quæ per articulum committuntur appendicibus esse munita, tamen crustam hanc cartilagineam præ se ferre; quippe quæ necessarium præsidium afferat, ne longo attritu ossa disrumpantur. Sed, his omisis, iam appendicum usum dicamus, nemini adhuc, quod sciam, cognitum, licet res sit cum scitu digna, tum vero per necessaria. Ego cum scirem nihil frustra a natura factum, neque adeo nullius precij in corpore particulam dari, quæ alicui vsui non esset addicta, peruestigare non destiti, quæ nam foret appendicum utilitas: & cum Galeni sententia mihi non probaretur, demum comperi appendices ossibus adnexas esse, vt ex ea coniuncti-  
one ligamenta prodire possent, quæ in articulis compositionem ipsam roborant, stabiliuntq, qua-

Gal. defensio.

Defensio-  
nis Gal. op-  
pugnatio.  
Cur appen-  
dices non at-  
terantur ex  
assiduo mo-  
tu articulo-  
rum.

Appendi-  
cum vsus ve-  
rus a nemi-  
ne adhuc ex-  
pressus.



lis est femoris superne cum osse coxendicis, inferne autem cum tibia, qualis etiam humeri cum scapula, & cum ulna atque radio, qualis denique aliorum articularum, quibus cum etiam illos numerari velim, qui, ut paulo supra diximus, appendicibus non sunt donati, quibus quomodo praesto sint ligamenta, per quae vincti teneantur infra proprio de ligamentis capite tractabimus.

Quomodo articuli carentes appendicibus detineantur a ligamentis, dicitur in tractatu de ligamentis. Ligamenta oriuntur etiam ex appendicibus ubi non est articulus.

Ex ligamentibus cartilaginibus musculi saepe oriuntur.

Ligamentales musculo rum cartilagine denique desinunt in Tendines. Ligamenta oriuntur ex appendicibus.

Luxationum causa.

Neque vero id unum tantum ligamenta praestant, cum ex his etiam appendicibus exoriantur, ubi nulla fit coarticulatio, ut in ossibus ilij, ut in scapulis, ac nonnullis vertebrarum processibus: inde enim fluunt ligamenta, quae ad musculorum constitutionem necessario concurrunt, sicuti proprio capite ostendemus. Quos fit, ut musculi inde plurimum ortum ducant: unde exeunt huiusmodi cartilagine ligamentales: sic enim appellare nunc libet, quae quidem per musculos disseminantur, vim ac robur illis subministrantes, ac demum in tendines ipsos desinunt: quae duo ligamentorum munera, cum tantopere sint necessaria, necessariam quoque fuisse appendicum generationem quis non videt? cum ea sublata vix reperias, unde commodè prodire possint ligamenta. Quod autem ea sint, quae articulationem ipsam colligent, atque ita contineant, ut ne huc vel illuc dilabatur, praeterquam quod per disseminationem constare liquide possit, animaduertere etiam licet in luxationibus, cum ob nimiam molli-

tiem,

tiem, & humiditatem lenta fiant ligamenta, & protrahantur, aut aliquid glutinis calli cuiusdam instar intersideat, quo longius quā necesse sit, ligamentum reddatur, aut tenella puerorum ossa validius imperiti medici manu fuerint attrēctata; quandoquidem eousque extenduntur, ut secum vnā appendices diuellant. Quam luxationem numquam, aut summa quidem certe cum difficultate curari posse crediderim, propter sinuum, ac tuberculorum multitudinē, quibus utraque pars, tam appendicis, quam ossis cui adnascitur abundat, & eorumdem mutuum ingressum postulat. Sequitur ἀπὸ τοῦ οὐς a Græcis dicta, quam Latini interpretes diuersis vocibus reddunt, nos autem ubique processum dicemus. Is autem est, cum os in aliqua parte prominet, quasi ramum, vel radicem iuxta trunci arboris ritum emissurum. Cum itaque pars aliqua gibbi aut tuberculi instar ex osse procedit, rectissime processus nuncupatur, qui ab appendice differt quoniam is vera pars est eius ossis, unde prominet; appendix vero ossis, cui adnascitur, nullo modo. Item appendices plerumque processus habēt, ut in vlna cernimus, & tibiæ parte inferiore, atque etiam in aliis quibusdam ossibus, de quibus infra. Rursus nonnullis processibus harēt appendices: nā interior scapulae processus anchoræ imagine, & scapulae spina, quæ itidem scapulae processus est, appendices habēt. Illud tamē adnotandū,

Luxatio manufacta.

Luxationis species quæ difficillime curatur, &amp; cur.

Α' π' οὐς, i. processus quid sit.

Processus &amp; appendicis differentia prima.

Differentia. 2

Differentia. 3

Processus *femoris processus, qui trochanteres, siue rotatores*  
 Trochate- *vocantur, appendices verius esse, quam quod ap-*  
 res videtur *pendicibus muniti dici debeant; tota enim pars*  
 appendices. *illa, quæ protuberat, & ideo processus dicitur,*  
*appendicis locum tenet, ut ibi idem sit processus,*

Vesalius *qui & appendix, licet Vesalius discrimen posu-*  
 male distin- *isse videatur. Nam si rotatores in nuper editis*  
 guit in ro- *animantibus auellantur, ut ea ratione appen-*  
 tatorib. pro- *dices abeant, nihil loci processibus relinquetur.*  
 cessus ab ap- *Cum itaque ablati appendicibus, processus una*  
 pendicibus. *auferantur, merito partem unam atque ean-*  
*dem, processum & appendicem eo in loco iudica-*  
*bimus. Sed hæc parui sunt momenti. Præter-*

Differ. 4. *ea differunt processus, & appendix, quoniam*  
*pauca sunt admodum ossa, quibus aliquis non ad-*  
*sit processus, cum fieri vix possit quin aliqua ex*  
*parte emineant: at multa tamen sunt ossa ap-*  
*pendice destituta, ut ossa capitis, maxilla supe-*  
*rioris, brachialis, & quadam alia. Differunt-*  
*que processus inter sese, cum diuersas figuras*

Quæ ossa *sortiantur: alij enim tenues sunt, & acuti styli*  
 appendicib. *formam referentes, propterea Styloides a Græcis*  
 careant. *vocati: alij acuti quidem, sed non ita tenues, qua-*  
*les in cerui conspiciuntur & in arcus cornu, ubi*  
*neruus assidet. Huiusmodi processus in inferio-*

Styloides *re maxilla reperiæ, & hi sunt, quos coronas Ga-*  
 processus *lenus appellauit, quasi processus in acutum ten-*  
 qui. *dentes, alij anchoræ similitudinē præ se ferunt, ut*  
*interiores scapularum processus ancyroides, alij in*  
*caput*

Coronæ pro-  
 cessus qui.  
 Ancyroidis  
 processus  
 qui.



caput desinunt, idq. bifariā: nam quidā illud depressum habet, ut postbrachialis, ubi cū brachia li iungitur, & pedij ossa ubi cum ossibus tarfi, & fibula cum suprema parte tibiae: quidā vero oblongū, & prominens, ut femoris caput superius, quo articulatur cū osse coxendicis: in aliquibus etiam caput rotundum est, quale est humeri cū scapula & osiū postbrachialis, cum primis articulis digitorum: longi capitis processus ceruicē quoq. habere dicuntur. Ceruicis autem nomine eam partem intelligimus, quā in ipso processu tenuior est, & ab osse usq. ad ipsum caput pertinet, quod spatium collo quam simillimum apparet, sicuti perspicuum est in superiore femoris parte, quā in coxedicem ingreditur. Et quoniam capitum facta mētio est quā ideo effecta sunt, ut aliorum sinus articulationis gratia subeant: sciendū est pro capitū varietate sinus quoq. varios esse, siquidem illis ipsis proportionē respōdent. Nam si oblongū fuerit caput, oblongum aequē esse sinum oportet, in quem inseratur: sin autem depressum, humilem etiā ac modicā cavitatem requirit. Sinum amplum, profundum & valde perspicuū Latini acetabulum, Graeci vero κοτύλῃ siue κοτυληδώνα dicūt: planū autē, & obscurum γλύνῃ, qui sinus adeo leuiter, superficieque tenuis cauatus est, ut vix primo aspectu comprehendī queat. At eorum sinuū, qui ampliter caui sunt, profunditates augere solent processus quidam circulares, quos

Processus  
capite de-  
presso.

Processus  
oblongi &  
prominen-  
tes.

Processus  
capite ro-  
tundo.

Ceruix in  
ossib. quid  
vocetur.

Caput in  
processibus  
cur factum  
fuerit.

Sinus pro-  
portione re-  
spōdēt ca-  
pitib. pro-  
cessuum.

κοτύλη, vel  
κοτυληδών. i.  
acetabulū,  
quid.

Γλύνῃ in fini-  
bus ossium  
quid sit.

Sinus ossis  
quandoque  
a processu  
& cartilagi-  
ne ampli-  
catur.

*in superficie positos labra, siue supercilia vocamus. Augent etiam huiusmodi cavitates, cartilaginee, quae in aliquibus inveniuntur, quemadmodum in scapula, ubi cohaeret cum humero, & in coxendicis articulatione cum femore: & haec luxationem difficiliorem faciunt.*

*Processus differunt numero.*

*Processuum usus triplex.*

*non figura modo, sed etiam numero distant, quaedam enim ossa pluribus, quaedam vero paucioribus sunt donata, quemadmodum ex uniuscuiusque ossis descriptione patebit. Processuum vero utilitas non est una dumtaxat. Nam facti sunt ab opifice Deo, tum ut commodam ossium articulationem, compositionemque praebeant, tum ut inde quasi ex rupibus, aut collibus quibusdam musculi prodeant, vel in eos ipsos implantentur tum demum ut propugnaculi munere fungantur, quales sunt scapularum, vertebrarumque processus. Quid vertebra sit, notum tibi fiet tractatu de vertebri; quid vero articulus, sequenti tabula intelleges.*

### CAPVT III.

*Q*UAE CUMQUE superiore capite completi sumus, dedimus operam, ut quam brevissime perstringeremus: quando eadem repetere continget, & fusius fortasse alibi pertractare. sed nullo modo praetermittenda erant, praesertim ut ossium structura diuisio facilius intelligatur: quae nusquam aptius, quam hic locari poterat: & ob declaratas iam voces, & quia

uni-

vniuersa huic historia luminis multum afferet.  
 Cum itaque constet sicuti initio dictum est, to-  
 tam ossium molem esse veluti fundamentū ani-  
 mati corporis, cuius proprium est, vt sentiat, &  
 moueatur: inutilis ea constructio fuisset, qua con-  
 tinua esset, ac solida. quidenim illius fabrica ala-  
 pidea vel aenea statua differret? Sed ossa, cū si na-  
 tura per se immobilia habeantur, moueri tamen  
 eadem apprime necessariū fuit: vt ad ipsorū mo-  
 tum animalis motus cōsequeretur, ac praesertim  
 hominis animantium omnium perfectissimi: cui  
 ob infinitas propemodū artes, quas ipse tractat,  
 innumerabilesq. actiones, quas edit, infinita pe-  
 ne mou. . . genera debebātur. Tale igitur com-  
 positionem ossa postularunt, vt neq. omnino dis-  
 iuncta ac dissoluta, neq. prorsus continua essent  
 modo venarum, vt male Aristoteles putauit ter-  
 tio de Natura Animalium, Cap. 7. Ergo conti-  
 gua ossa, coniūctaq. esse oportuit, vt super aliquo  
 quiescente moueri possent: tametsi ossium vnio,  
 quae ob motum praecipue facta est, ob transpirati-  
 onem etiam, transitumque corporum facta fue-  
 rit, vt suturae in caluaria, quam & tutela causa  
 ex pluribus ossibus efformata esse suo loco audi-  
 es, ac demū ob partium diuersitatē, vbi dura mol-  
 libus committuntur. Cum autē in cōponendis os-  
 sibus sapiēs natura nō vnā rationem seruauerit:  
 vt facile quisque intelligat, quā varie sint inui-  
 cem composita, sequentem tabulam subiecimus.

Cur homo  
 non constat  
 ex osse vno  
 continuo &  
 solido.

Ossium com-  
 positio qua  
 lis esse de-  
 buit in ho-  
 mine praes-  
 sertim &  
 cur.

Contra A-  
 rist. 3. de na-  
 tura Ani-  
 mal. Cap. 7.

Suturae ca-  
 pitis ob tra-  
 spirationē  
 factae sunt.

Cranium tu-  
 tamēti gra-  
 tia factum.  
 Ossium com-  
 positio va-  
 ria est.



## Tabula compositionis ossium.

OSSA HVMANI CORPORIS  
inuicem componuntur;

Per articulum, qui est ossium  
compositio cum motu, huius  
duæ sunt differentia.

Diarthrosis,  
quæ est dearticulatio  
ad motum mani-  
festum, diuiditur  
autem in

Enarthrosim,  
Arthrodiam,  
Ginglymon.

Enarthrosis fit, ubi ro-  
tundū aut oblongū  
caput in cauum ali  
quod inseritur: Et  
est articulatio fe-  
moris cū coxæ dīce,  
humeri cum scapu-  
la, prima aciei di-  
gitorū cum ossibus  
postbrachialis.

Arthrodia est, quæ le-  
niter cauum, & in  
superficie, & capi-  
tulū etiā depressum  
habet: Et primæ cer-  
uicis vertebra cum  
secunda, & radius  
cum cubito.

Synarthrosis,  
quæ est coarticulatio  
cū motu obscuro:  
in easdem autem  
species diuiditur,  
in quas & Diar-  
throsis diuisa est,  
videlicet in

Enarthrosim,  
Arthrodiam,  
Ginglymon.

Eo vero inter se tantū  
differunt, quod ha-  
obscurū, ille ma-  
nifestum habent  
motum.

Nec mirandū est eas-  
dē res diuersimode  
consideratas, posse  
sub diuersis in eo-  
dē predicamento  
generib. collocari.  
nā id quandoque  
in diuersis predica-  
mentis contingit.  
Exempla in hoc  
genere sunt;

Enarthroseos. Tali os

Per Symphysin, quæ  
est ossium inter se  
coniunctio, siue & nio  
sine motu, hanc no-  
bis visum est diui-  
dere in

Suturam,  
Gomphosim,  
Harmoniam.

Sutura ea compositio  
est, quæ in capite ha-  
betur in serra mo-  
dum, Et est sutura  
coronalis, sagitalis  
& Lambdoïdis.

Gomphosis est, cum ad  
instar elauī, os ossi  
infigitur: Et sunt  
dentes in maxil-  
lis.

Harmonia est ossium  
structura per sim-  
plicem lineam: Et  
sunt commissura ma-  
xilla superioris, &  
ea præcipue, quæ  
in naso habetur,  
quaquæ secundum  
longitudinem pala-  
ti fertur.

Gingly-

*Ginglymos* ea est, in qua ossa sese inuicem ingrediuntur, & tum suscipiunt, tum suscipiuntur: Et *Ulna*, siue cubitus cum humero, femur cum tibia, secunda, & tertia digitorum acies.

cum osse cymbam referente, & tertium os brachialis, cum primo & secundo eiusdem.

*Arthrodia*. Tarsi ossa inter se, cyboides cum calce, & quadam ossa brachialis inter se.

*Ginglymi*. Talios cum calce, & nonnulla item brachialis ossa inter se.

Omnia hæc inuicem committuntur.

*Synchondrosi*, qua ossium unio per cartilaginem facta, Et videre est in osse pubis, pectoris, & ilei, qua sacro connectitur.

*Syssarcosi*, qua est ossium counctio appositione carnis repleta, Et inter dentes, & maxillas cernitur, atque etiam in articulis, quos musculi circumdant.

*Syndesmosi*, qua est eorundem per ligamentum compositio, Et in articulis patet.

Plura sequenti capite & triusque generis exempla adducemus, ubi explicanda nobis est huiusce nostre diuisionis ratio, quam quam illa passim occurrent in vniuersa ossium tractatione.

## CAPVT IIII.

**N**E forte quispiam admiretur, quod in superiore diuisione neque Galenum, neque Vesaliū in omnibus sequuti sumus, ratio reddenda

Cur in offiū  
diuisione  
neq; Gale-  
num in om-  
nibus, neq;  
Vesaliū se-  
quatur.

Galenī er-  
ror, vel con-  
tradictio po-  
tius.

Galenī er-  
ror alius.

Galen. error  
tertius.

Gal. error  
quartus, vel  
contradi-  
ctio potius.

Vesaliij er-  
ror.

da est, quam obrem ab illis dissentiamus. Nā li-  
cet Galenū tanquam numen veneremur, Vesa-  
liog, in dissectionis arte plurimū tribuamus, ubi  
cū rei natura cōsentiunt: tamen cū aliquādo vi-  
deamus rem aliter multo se habere, ac ipsi descri-  
pserint, veritas eadem, cui magis addicti sumus,  
nos cogit ab illis interdū recedere. A Galeno ita-  
que nunc discedo, quoniā definiēs Synarthrosim,  
coarticulatione esse dixit ad motū quāuis obscu-  
rum, cuius deinde veluti species enumerat Sutu-  
rā, Gomphosim, & Harmoniā, quæ omni prorsus  
motu carēt. Præterea Symphysi tantū adscribit  
cōiunctiones illas, quæ media cartilagine, aut li-  
gamento, aut carne fiunt: cū tamen articuli quo-  
que omnes ligamentorum ope uniantur, quos ad  
Symphysim referre non decet, quando ille hac si-  
bi inuicem opponit, per Articulam, ac per Sym-  
physim. Postremo, cum asserat fungosā, ac mol-  
liā ossa nullius rei interuentu connecti: & aper-  
te videamus ossa pectoris præcipue & sacrum os  
cōstituentia fungosā, & molliā per cartilaginem  
uniri. Addo quod in Introductorio, siue medi-  
co, maxilla superioris unionem sub Symphysi  
ponit, quam in libello de ossibus ad Harmoniam  
retulit. Dicendum itaque aut harmoniam spe-  
ciem esse non Synarthroseos, sed Symphyseos, sic-  
ut nos fecimus, aut artem illum in hoc cōfudi-  
se. Sed hætenus de Galeno: ad Vesaliū trans-  
eo, qui Symphysim cum Gomphosi, Sutura, atq;

Har-



Harmonia connumerat, quatuor efficiens differentias eius structura, unde nullus omnino motus prouenire solet. At rectius poterat Symphyseos nomine genus intelligere innominatū, quod tres illas sub se differentias cōprehenderet. Quod si diligentius structuram ipsorū ossiū consideraremus, alia profecto videbimus ita coalescere, ut connata prorsus videātur, alia coniūcta, & colligata rectius appellari. Quae cōnata sunt, ea sub Symphysi ponenda videntur, sicuti etiam ipsius vis vocabuli praese fert. Vbi ossiū autem cōpositio ad aliquem motum facta est, ad Articulum non referri non potest. Cum igitur quae per Gomphosim, Harmoniam, Suturaeque uniuntur, eiusmodi sint, cuiusmodi Symphysis esse diximus, quid obstat cur sub Symphysi, veluti sub natura quadā communi non reducātur? Iam vero cum Vesalius ita distribuatur ossium cōmissuras, ut alterā fieri dicat alicuius partis ope, alterā nullius (pace tanti viri dixerim) falsa, & rationi minime consentanea protulit. Nam si quid ego in clauorum dissectionibus diligenter obseruauī, id unum praecipue fuit, ut aliquando certo scirem, an usquam reperiri posset ossium unio, siue cōpositio nullius mediū beneficio: quod equidē (ut ingenue fatear) nusquam inuenire potui: sed mihi vel caro, vel ligamentum, vel cartilago semper occurrebat. Exemplum vero quod de appendicibus attulit, absurdum mihi, ne dicam perridic-

Ex ossib. alia cum aliis cōnata, alia coniūcta videntur.

Vesalij error.

Os quodcūque cum alio vnitur media carne vel ligamento vel cartilagine. Vesalius male putat appendices nulla remedia ossib. vniri.

culum, videtur. Etenim ut appendices in natu grandioribus adeo coalescant, ut discernere nequeas, an partes sint ipsorum ossium, quibus adnatae sunt, non ex eo tamen sequi debet nullius partis ope fuisse coniunctas, cum per cartilaginem unitae fuerint: quanquam ea temporis progressu tandem excidetur, atque aboleatur. Quocirca

Cartilagine appedim cum eadem abolentur. Propriae diuisionis ossium compositionis, causam reddit. *Articulus*, i. articulus quid sit.

Articuli nomine quid intelligat Hippocrates.

Motus perspicui exempli.

Motus obcuri exempli.

Diarthrosis quid.

Synarthrosis quid.

aliam diuisionis formam excogitauimus hoc pacto. Primum diuissimus genus, Humani scilicet corporis diuisione in articulum, ac Symphysim. quid esset Symphysis, ex superioribus patuit. Articulus Graecis ἄρθρον est ossium compositio alicui motui destinata, (quanquam Hippocrates artius articuli nomen acceperit, pro ea commissura, in qua pars aliqua ossis rotunda, caput inquam proximum ossis alterius sinum committitur) nos articulum naturalem ossis compositionem omnem vocabimus voluntarij motus gratia factam, siue is motus euidentis fuerit, ut femoris ad os coxendicis, & capitis super collum: siue obscurus. ut postbrachialis ossium ad ossa brachialis, & calcis cum talo, atque aliorum id genus, de quibus alibi dicitur. Ergo pro duplici motu duas articulationis differentias constituimus; alteram, in qua neminem motus latere potest, Diarthrosim; alteram in qua difficilis est exploratu motus, Synarthrosim vocantes. Rursus utraque speciem subdivisimus, tres differentias unicuique tribuentes, nomine easdem, illa tamen ratione disjunctas.

disiunctas, qua differunt ipsorum genera, licet enim Enarthrosim tam sub Diarthrosi, quam sub Synarthrosi collocemus, non est tamē utrobique eadem: nam Diarthrosis motum perspicuum includet, quæ vero incerti, obscurique motus fuerit, ea sub Synarthrosi ponetur, id quod in cæteris duabus seruandum erit. Enarthrosim itaque esse dicimus, cum sinus altus, atque profundus, quem acetabulum supra vocauimus, caput ossis longum ac rotundum excipit: quæ articulationis species facile apparet in coxendice, & femore, in humero cum scapula, & postbrachialis, ac pedij cum primis digitorum ossibus. Atque hæc exempla illam Enarthrosim explicant, quæ Diarthroseos species est: siquidem in his non modo manifesti motus, sed omnes etiam motuum differentie deprehenduntur: in talibus enim articulis planissime cernimus extensionis, ac contractionis motum ad latera: nec non etiam in circulum multæ insuper aliæ dantur huiusmodi articulationes, de quibus cum usu venerit, separatim agemus. Verum ut facilius intelligatur, quid intersit inter Enarthrosim sub Diarthrosi positam, & eam, quæ ad Synarthrosim pertinet, intueamini articulationem tali ossis cum ossis cymbam referente, & septimi ossis brachialis, cum primo, & secundo eiusdem. Hæ namq; articulationes, quamuis eo modo fiât, quæ Enarthroseos definitio præscribit, non ad Diarthrosim ta-

Non est eadem Enarthrosis sub Diarthrosi quæ sub Synarthrosi.

Enarthrosis quid.

Enarthroseos sub Diarthrosi exempla.

Enarthroseos sub Synarthrosi exempla.



Arthrodia  
quid.

In Arthro-  
dia differt  
motus a  
motu per  
magis & mi-  
nus obscu-  
rum.

Arthrodia  
sub Diar-  
throfi ex-  
empla.

Costæ con-  
stringuntur  
& dilatantur.

Arthrodia  
sub Synar-  
throfi ex-  
emplū pri-  
mum.

Qui motus  
sit proprius  
ossū post-  
brachialis,

*mē, sed ad Synarthrosim referendas indicabitis: motus enim obscurissimus est, & nisi multa diligentia adhibeatur, vix animaduerti potest. Arthrodia ea est ossium coniunctio, quorum alterum capite sit depresso, alterum sinum habeat lenem, ac planum, quem glenem appellant, alterius, quod suscipiendum erat, capiti respondentē; in quo difficile est dignoscere caput ab ipso sinu, contra quam accidit in Enarthrosi: quo fit, ut nō ita evidens sit motus in Arthrodia, qualis in Enarthrosi. Verum in ipsa Arthrodia motus datur alio evidentior: quamquam omnes parum sint evidentes, usque adeo, ut qui minus evidens sit, obscurus penitus esse videatur, si cum evidentiori cōparaueris. Manifestioris motus Arthrodia, species erit Diarthroseos, obscurioris autem Synarthroseos. Prioris exempla sunt in ea coniunctione, quæ fit costarū cum vertebris, & earumdem processibus. Sensui etenim patet costas constringi, ac dilatari, qui motus quemadmodum & quorsum fiat, nō huius est loci explicare. Sed Arthrodiam paulo manifestiorem animaduertes in articulatione primæ vertebrae cum secunda, ac etiam radij cum cubito: obscurioris autem Arthrodia exempla sunt ossa postbrachialis cum brachiali, in quibus tamen motus quoquo modo observari potest: nam si ad pollicem minimum digitum sensim adduxeris manum ipsam inflectendo, plane conspicias postbrachialis ossa, quæ*

que aliqui manu porrecta, atque in planum extensa, planam ac rectam figuram obtinebant, circumduci, atque obliquari: qui motus proprius est ipsorū postbrachialis ossium: at multo aptius obscuram Arthrodiā exprimunt tria ossa tarfi, quæ cum naviformi committuntur: & cyboides cum calce, ac etiam nonnulla alia, in quibus et si motus aliquis omnino sit, est tamen observatu valde difficilis. *Ginglymos* tertia articuli species est, ubi mutuus fit ossium congressus, ita quod in alterutra extant partes prominētes, quæ alterius sinum exposcant, partesque illæ gibbæ, ac protuberātes unius ossis in alterius sinum immittuntur, & huius cavæ partes illius gibbas excipiunt. Itaque fit utriusq; partis mutuus ingressus. Hæc articulatio in motu manifesto, & obscuro inuenitur: manifestus, & evidens *Ginglymos* erit femur cum tibia, cubitus cum humero, & alia: obscurus vero tali cum calce connexus, & ossium brachialis: in quibus si recte animaduerteris, articulationis formā offendes. Atque hæc hæctenus de articuli partibus, ac differentiis. Nunc *symphysim* persequamur, quæ ossium structura omni penitus motu, cum obscuro, tum etiam manifesto caret. Huius tres differentias diximus, *Suturam*, *Gomphosim*, & *Harmoniam*: in his enim nemo unquam motum deprehenderit, quamquā non defuerunt, qui ausi sunt affirmare cranij ossa, quæ per *Suturā* cōmittun-

*Ginglymos*  
quid.

*Ginglymi*  
sub Diarthrosi exempl.

*Symphysis*  
quid.

*Symphysicos* subdiuisio.

Causa erroris existimātiū ossa cranij moueri.

tur, moueri motu, (si Diis placet) manifesto, inani specie meo iudicio delusi. Cum enim cerne-  
rent frontis, capitisque cutim, quæ crassa est, &  
musculosa, alte atq; insigniter in aliquibus mo-  
ueri, motum illum ex ossium dimotione profici-

Ad motum  
pinna-  
rum na-  
si, eius ossa  
non moue-  
ri.

Caluariæ  
Suturæ vix  
scalpellodi-  
uelluntur.

ῥαφὴ, id est,  
Sutura vn-  
de dicta.

Suturæ tres  
capitis, in  
valde seni-  
bus vix sunt  
conspiciuæ.

sci existimarunt: quemadmodum si quis nasi os-  
sa, quæ per harmoniam uniuntur, motum edere,  
cum narium pinnae moueri viderit, arbitraretur.  
Neque enim credendum est suturas capitis  
laxari, atque ita mouendis ossibus ansam præbe-  
re, quæ alioqui adeo compactè inuicem inharēt,  
ut nulla vi laxari possint, nisi quis scalpello di-  
uellere, aut frangere tentauerit: adeo ut in nulla  
Symphyseos specie motum inesse plane perspiciat-  
tur. Sed ad singulas ipsius species deueniamus.  
Sutura, quæ Grecis ῥαφὴ dicitur, consutarum  
rerum similitudinem præ se fert, vel contrarij  
ferrarum occursum, quo mutuum ingressum fa-  
ciunt, quando dentata vnius partes, alterius si-  
nibus occurrant: quidam etiā unguium commis-  
surarum exemplum addunt; nō quod mutuo sese  
respiciant, sed interstitia illa occupent, ac stipent,  
quæ inter digitorum ungues residēt. At propius  
ad rei naturā accedere videntur, qui ferrarum,  
quam qui unguium similitudinem in medium  
adferūt, quandoquidem illa rara admodum est,  
hæc autem frequentissima: cuiusmodi tres sunt in  
capite. Sutura, quæ in senioribus appendicū mo-  
re coalescunt, ut vix vestigia appareāt: in iunio-  
ribus



ribus autem maxime sunt conspicuae. Vna quidem in *incipie* *σεφαιεία* dicta, altera vero in *ocipite* *λαμῆδοειδής*, tertia medio vertice *recta*, *ὀρελιδία*, quasi sagittalis, de quibus suo loco latius agetur. Non me latet apud aliquos plures tribus suturas dari, qui voluerunt squamosa temporum ossa per suturam copulari. Equidem non negarem in quibusdam caluariis talia ossa dentatim esse resecta, ut facile conicere possis in *star* *ferrarū* esse coniuncta: sed id in paucissimis, ac in superficie tantum ipsorum ossium obseruavi. Quamobrem vera talium ossiū unio, ut in pluribus ad harmoniam potius, quam ad suturam referenda videtur. Est autem harmonia ossium structura per simplicem lineam, ubi scilicet neque adsunt sinus, neque tubera, & nonnumquam ne asperitates quidem reperiuntur: quod tamē non tollit, quin veteres suturarum voce harmoniam quandoque intellexerint: cum videlicet ossa rupta sibi mutuo per harmoniam occurrunt: quamquam hic occursum nō ad amussim per simplicem fit lineam. Adsunt enim asperitates quaedam sese mutuo ingredientēs: ideo mixta potius est unionis forma harmonia, suturaque particeps. Verum id obiter sit dictum, quando sermo institutus est, de naturalibus ossium cōpositionibus, non de iis, quae casu, vel arte, licet natura praevia sūt. Simplici ergo linea, atque harmoniaca uniuntur nasi ossa, & illa, quae palatum constituunt,

Sutura *σεφαιεία* quae

Sutura *λαμῆδοειδής* quae.

Sutura *ὀρελιδία* quae.

Ossa squamosa cum uniuntur per Suturam.

Sutura non est profunda.

Ossa squamosa ut in pluribus vniuntur per harmoniam quam per Suturam.

Harmonia quid sit.

Sutura nomine veteres quādoque harmoniam cōprehenderunt.

Ossa fracta uniuntur forma quadā harmoniae & Sutura particeps. Harmoniae exempla.

ac secundum totam ipsius longitudinem feruntur. Huiusmodi etiam sunt reliquæ omnes maxilla superioris commissuræ, cuius ossa sola linea distinguuntur. Porro Gomphosis in solis dentibus locum habet. ita enim illos infixos in maxillas videmus, quemadmodum clavi ligneis tabulis, quibus reuulsis inania foramina conspiciuntur: sic dentes suos habent alueolos, ex quibus extrahi solent, cum usu venit. In vino capite non ita apparent; siquidem carne obducuntur, aut gingiva contracta replentur, quæ subinde callosa fit, atque ita indurescit, ut dentium munere plerumque fungatur. At inde mortui caluaria nuda, atque exsiccata conspiciuntur in maxillis alueoli, e quibus leui opera dentes educuntur. Iam vero cum ossa omnia alicuius rei beneficio componantur, licet aliis aliter videatur, rursus affirmamus ossa inter se trib. mediis iungi: aut enim intercedit cartilago, quam unionem Græci Synchondrosin appellant: aut nerui, ligamenti uel ope coniunguntur, Synneurosisque dicitur (nerui enim nomine ligamēta quoque veteres intellexerunt) sed tamē differunt, ac rectius dixeris ligamētum, quod Græcis Syndesmos est, & propterea Syndesmosis: aut carnis appositione unio ipsa fit, & Græco nomine Syssarcosis nuncupatur. Synchōdrofi copulatur pubis, ac pectoris ossa, vertebrae ipsæ, & partes sacrum os constituētes, & quæ cū sacro cōmittuntur, ac demū appēdices suis ossibus

Gomphoseos  
exemplum.

Alueoli dē-  
tium.

Maxilla  
quandocumque  
inftar ossis  
indurescit  
callo, itaque  
dentis munere  
fungitur.

Synchōdro-  
sis quid si-  
gnificet.

Synneuro-  
sis quid.

Nerui no-  
mine liga-  
mēta com-  
prehende-  
runt veteres.

Syndesmo-  
sis quid.

Syssarcosis  
quid.

Synchōdro-  
seos exēpla.

per

per cartilaginem iunguntur. Synneurosi componuntur omnia illa ossa, in quibus cernere est ligamenta, quae per eam partem prodeunt, quae solent appendices suis ossibus adhaerescere. Talibus enim ligamentis inuestiuntur ossa ad articulos colligandos. Prominent quoque, atque nasci quodam modo videntur valida ligamenta in mediis quorundam ossium capitibus, per quae suis sinibus vinciuntur, ut tenacius inhaereant, qualia extant in articulatione femoris cum coxendice, atque etiam inter femur & tibiā: neque alibi reperire licebit, nisi addideris ligamentū, quo dens secunda cervicis vertebra occipiti nequitur. Carne autē veluti glutine quodam firmatur dentes in suis alueolis, idque per Syssarcosin fieri dicitur, semotaque carne neque coherere, neque stare villo modo possunt. Aristoteles existimavit articulos quoque per carnem uniri, ubi scilicet absideant muscoli circumdantes, & valli instar illos munientes: cuius sententia, si cui forte arrideat, non multū laboro. Sed hac de diuisione compositionis ossium sat sunt, ad singula describenda accedamus.

Synneuroseos exemplum.

Ligamenti ex ossium capitibus nascentis exempla.

Syssarcoseos exemplum. Aristotelis opinionem de vnione articulorum per Syssarcosim neque laudat neque vituperat.

De capitis ossibus, siue caluaria.

## CAPVT V.

**A** CAPITIS ossibus exordiemur, quoniam caput in corpore principem locum tenet, quod in eo residet cerebrum, cui principatus iure optimo debetur: quamquam Arist. multo aliter senserit: & quod hinc humana fabrica de-

membrum totius corporis contra Aug.

Cur ossium anatomē a capitis ossibus incipiat. Cerebrum est princeps



Quæstio v-  
trum caput  
sit gratia o-  
culorū vel  
cerebri.

Galenī opi-  
nio oculo-  
rum gratia  
conditum  
caput.

Galenī im-  
pugnatio.

Probat ca-  
put factum  
potius gra-  
tia cerebri  
quam oculo-  
rum.

Cācrorum  
oculi duri.

*scribenda initium recte sumi possit, ut a nomine ipso capitis, quasi principij cuiusdam admone-  
mur. A capite igitur exorsi, illud primum pro virili discutiamus, quod diu præclara ingenia fa-  
tigavit, oculorūne, an cerebri causa caput natu-  
ra construxerit? Oculorum gratia factum sensit  
Galenus, postquam scarabeorum, cancrorum, ac quorūdam aliorum id genus animalium oculos est contemplatus, quibus cum nullum adesset caput, in quo tamquam in arce summa oculi collocarentur, unde longius prospicerent, processus quosdā natura largita est, qui capitis vicem gererent. Verum tamen capitis figuram recte considerantes secus iudicabunt. licet enim Galeno concedatur necessarium fuisse in suprema parte corporis, ceu in altissima specula oculos constitue-  
re, atq; illos ideo, capitis sedem sibi tamquā propriam asciscere, in cuius sinibus manerēt vndique tecti, ac muniti, ne ab externis iniuriis laderentur: non propterea tamen fatendū fuerit ad hos tātum vsus caput ipsum ea magnitudine, ea figura, totque ossibus fuisse constructum: quam formam quis non videt cerebri etiam gratia fuisse conditam? Immo vero cerebri potius quam oculorum? quid enim obstabat cur summus opifex caput in duos dumtaxat prominentes processus diduceret, in quibus oculi tamquam speculatores insiderent, atque hos ipsos quemadmodum in cancris duriores efficeret? vel si molliores om-  
nino*

nino futuri erant, quales humani, alia praesidia, ac munimenta pararet, per quae tutissimi ab externis incommodis redderentur. Mihi igitur numquam fiet verisimile oculorum causa caput fuisse conditum: ad cerebrum potius talem formam spectasse crediderim, nempe ad illud, quod futurum erat domicilium rationis, qua ratione homo diuinum propemodum animal iudicatur: est enim virtutum omnium, animaliumque facultatum regina, cui ut praesto esse possent sensus omnes, veluti satellites ac ministri, in ipso capite suas singuli sedes obtinuerunt: quod quam apposite factum fuerit, suo loco explicabitur. Cumque sentiendi vis per nervos deferatur, quorum fontem, atque originem esse cerebrum cum Galeno opinamur, quis non videt maiorem inesse cerebro quam sensibus dignitatem, cum a cerebro sensus dependeant, non a sensibus cerebrum? Cerebro vero caluariae formam inseruire ex eo maxime patet, quod pro eius figura diuersitate cerebri constitutionem physici perspectam, atque exploratam habent. Sed ad alia utiliora properamus. Capitis ossa neque prorsus sunt solida, neque omni ex parte fungosa, rara, ac pumici similia; ex hoc enim fragile naturam, & leuissimam cuiusque iniuria obnoxiam sortita essent: ex illo vero onere satis molesto premerentur. Præterea huiusmodi substantia minime transpirabilis esset, sicuti expediebat. Caput namque futurum erat veluti operculum

Cur cerebri  
gratia con-  
ditum caput

Ratio est vir-  
tutum om-  
nium regi-  
na.

Cerebrum  
est origo  
nervorum.

Cerebrum di-  
gnius sensibus.

Cerebrocranium inseruire.

Capitis ossa qualia.

Capitis ossa cur non fungosa.

Capitis ossa cur solida omnino non sunt facta.

Capitis ad ollae operculum comparatio.

quoddam ebullienti vasi superpositum, nō secus atque calida domus tectum. Multis itaque vaporibus, atque excrementis continenter ad cerebrum ascendentibus, nisi exitus pateret, ut reliqua omittam incommoda, nemo diuturnam sibi

Cur caluaria futuris distincta sit.

vitā polliceri posset. Idcirco provida natura perforatam esse voluit caluariam, variisq; futuris distinctam, ut purgando a recrementis cerebro nusquam occasio deesset. Quod autē futura hunc usum inter cetera praeferant, praeter authorū probatissimorum, ac praecipue Galeni testimonium, nos etiam ipsa experientia docuit, ut mox audie-

Historia iuuenis mortui ob dolorem capitis, in quo futura non erat conspicua.

tis. Patavij superioribus annis inuenem quēdam propinquorum voluntate ad me delatum domi in magna amicorū corona secui, qui diutino capitis dolore vexatus nullis remediis sanari potuerat: in cuius caluaria vix futurarum vestigia apparebant, adeo erant cōpacta, ut in unum coacta capitis ossa viderētur. Quamobrem pro-

In viris & mulieribus capita mire dolentibus futuras augmentatas inueniri.

comperto omnes, qui tunc aderant, habuerunt, non aliunde ingentem ac fere continuum capitis dolorem profectum esse, quam ex arctissima illa ossium compositione, ex qua nullus exitus patebat fumidis illis crassissq; vaporibus, qui & perpetuo doloris causa fuerant, & tandem mortē intulerant. Sed neq; semel id mihi cōtingit, periri: complures etenim secui, qui dum viuerēt, in frequentem capitis dolorem incidere solebant, in quorū caluariis exiguas futuras, & eas coagmen-

tatas



ratas inuenimus neque in viris modo, sed etiam in muliere: quod mirum fuit, ut vix credibile. nudatum enim, ac decoctum illius caput fere sine futuris offendimus. & hac pariter multo, magnoque capitis dolore quam diutissime affecta atque afflicta, postremo phrenesi laborauit, & mortua est. Ceriissimum ergo argumentum nobis erit capitis futuras non modo conferre ad salutem corporis tuendam, verum eo plus conferre quo maiores, laxioresque fuerint. Quare Cornelij Celsi sententiam ego numquam approbare potui asserentis capita sine futuris non modo validissima esse, ac firmissima: sed etiam ab omni penitus dolore immunia, eaque reperiri in calidis, & astuosis regionib. Nam ille extrinsecas tantum causas caput ladentes animaduertit. Quod si Celsi vera esset sententia, imbecilliora essent capita, & ad patiendum promptiora, qua insignes futuras haberet, quã qua aut exiguis essent praedita, aut eisdem prorsus carerent. Cum vero contrà res habeat, maiusque impendeat dānum ipsi cerebro ab internis fuliginosis recrementis, quam ab externis noxis, concludendum est a dolore longetutiora esse capita futuris amplioribus, quam iis ipsis destituta, aut exilibus admodum, arctissimisq; interfecta. Præterea cum cranium sit veluti galea quadam, ac propugnaculum cerebro, primo illud considera carne, ac cute quam parum munitum fuisset, nisi obducto etiam osse,

Capitis future quo maiores eo meliores.

Cornelij Celsi opinio de bonitate capitis absque futuris, reprobatur.

Caput amplioribus futuris est dolori minus obnoxium.

Cur craniū osseum.

Cur os ca-  
pitis multi-  
plex.

quod durissimum, ac densissimum esset. Deinde cum caput alioqui ossum gravi aliquo ictu percussum labefactari, frangique posset, ideo multiplex fieri oportuit, ut si quādo pars aliqua frangeretur, aliae partes integræ seruarentur, cū ictus ille longius protendi nequeat, quā quo fines percussa partis pertinent, quod secus eueniret, si ex unico osse caluaria constaret. id quod exemplo facili perspicuum fiet, si lapide, aut ligno fictile vas, vitreūve feriat: saepe enim contingit, ut una parte cōtusa, scissura ad alteram usque permeet: ut pene totum ipsum vas abrupatur.

Cur futuras  
habeat cap.

Prima ratio

Ossa igitur capitis suturis non iniuria distincta sunt, ut illud iniuriis minus pateret. Sutura autem non illud solum præstant, ut per ipsas transmitti possint fumida recrementa, sed etiam ut

Secunda.

prohibeāt, ne unico ictu, nisi illud grauissimum

Tertia.

sit, petita caluaria undique cōfringatur. Ad has utilitates accedit tertia, ut scilicet inde pendeat interna membrana, quæ durior est: ac rursus per easdem futuras effusa, membranā alteram ex se gignat, quæ conuexā caluariæ partē circundat,

περιεργασιον  
gignitur a  
dura mem-  
brana.

Arist. opi-  
nio de ca-  
num calua-  
ria absque  
suturis, re-  
fellitur.

Et ideo a Græcis περιεργασιον dicitur. Sed de hac posterius. Illud interim non omittendum Aristotele falso tradidisse canum capita continua, ac sine suturis existere, cum vel lippī ipsi cernant in canum caluariis insigniores, atq; elegantiores suturas, quā in humanis apparere. Consimile illud est quod quidam literarum monumētis tradidere, ho-

re, ho-

re, homines caluariis continuis, nullisque suturis distinctis in Perside reperiri. At nos eandem in eadem specie naturam semper esse existimamus: neque magni aestimamus, si in aliquibus indiuiduis aliquid euariet. Etenim quamuis conspici-  
 bimur eorum, qui diutissime vixerunt, appendices, atque illas in ossium, quibus adnatæ fuerant, portionem abuisse plane perspiciamus, adeo ut neque separari, neque dignosci queant: suturas itidem in senum capitibus plerumque abolitas, ac deperditas: tamen negandum nullo pacto est appendices dari, vel sine suturis caluarias esse: quemadmodum in infantibus partes aliquæ tenerrimæ cartilaginis naturam sapiunt, neque dum ossæ, nisi aliquot post mensibus fiunt. Ecquis autem dicere audeat partes easdem, non ossa, verum cartilagineas esse? Sed ad rem redeamus. Caput cum dicimus, partem supremam nostri corporis intelligimus, oculorum, cerebrique gratia factam, cuius figura naturalis rotunda, oblongaque esse debet, nempe ad oblongæ sphaeræ utrinque depresso similitudinem, eam ab utraq; maxilla distinguimus, & modo caluariam, modo cranium appellamus ex pluribus ossibus, ut supra attigimus, merito constructum, atque ex iis, quæ interiorius atque exterius densam & lenem superficiem haberent, cum meditullium fungosum sit, ac pumici persimile. Nam si substantiam undiq; asperâ adepta essent, nihil impedimento futurum erat,

In Perside caluarias suturis carere falsum est.

Appendices in valde senibus non possunt ab ossibus separari.

Suturæ in valde senibus aliquando deperduntur.

Ossium partes aliquæ in pueris ob mollitiem cartilagineas videntur.

Caput quid significet.

Capitis vus.

Capitis figura.

Caluariæ substantia cur non sit aspera.



quo minus adherentes membranas laderent, atque eroderent: caucernosa vero inter utranque squamam ossa capitis extiterunt: non modo ut leuiores forent, sed etiam ut medullam continere possent, suum ipsorum palulum ac nutrimentum. Perforata vero sunt crebris foraminibus exiguis illis, nullamque ordinem seruantibus, ut per ea pateat aditus venulis, atque arterioliis, quae sanguinem pro alimento, spiritumque pro calore fouendo, ac vita conseruanda deferunt. Hoc autem interstitium purnicosum causa fuit, ut nonnulli dixerint ex duobus parietibus caluariam conditam esse, quas tabulas vocant, duas illas crustas, seu squamas intelligentes quae durae sunt, & aliquantulum crassae, atque undique spongiosam, ac medullosam illam substantiam claudunt. Ossa vero ipsa suis undique seiuncta sunt terminis, quos fere omnes lato vocabulo Suturas nominarunt: de quibus hic nobis agendum est, cum plurimum conferant ad capitis ossa explicanda. Suturarum aliae sunt legitima, aliae nothae; quae cum potius commissurae quadam sint, ad harmoniam magis, quam ad Suturam referenda videntur. Oportet itaque omnes sunt, quinque spuriae, propriae ac verae suturae tres, ex quibus una est, quae in occipitio, & in eius basi, quae vergit ad utranque aurem, diuellit, lateque disiuncta in ipso ascensu sensim angustior redditur, atque in cuneum coit. Graece litera  $\Delta$  formam constituens, itaque labdoidis

Cur media  
pars ossium  
caluariae  
fungosa est.  
Cur ossa ca-  
pitis sunt  
crebris fo-  
raminibus  
praedita.  
Duo calua-  
riae parietes.  
Tabulae os-  
sium capitis.  
Duae crustae  
& squamae  
caluariae  
quae.  
Suturae quae  
dicuntur.  
Suturarum  
cognitio in  
ossium ca-  
pitis expli-  
catione ne-  
cessaria est.  
Suturarum  
diuisio.  
Suturae non  
legitimae  
sunt har-  
moniae.  
Suturarum  
numerus.  
Labdoidis  
Suturae de-  
scriptio &  
usus.

*lambdoidis nomen adhuc retinet: dirimit ossa sincipi-*  
*tis, & temporum ab osse occipitis. Altera in sin-*  
*cipite posita, e regione lambdoidis, anteriorem su-*  
*pra frontem circuli speciem ambit; & quia vel si-*  
*milis est corollæ; vel quia coronæ ibi potissimum*  
*locari solent: ideo coronalem omnes vocant; &*  
*Stephania a Grecis nominatur, dirimens ossa sin-*  
*cipitis ab osse frontis. Tertia per verticem rectâ*  
*incedit, & quodammodo partem calvaria dex-*  
*tram sinistra sciungit. Hanc ðe malav Greci, nos*  
*sagittalem, & rectam appellamus. pædoeidh quo-*  
*que vocant, cum virgæ similitudinem refe-*  
*rat. & ea est quam Galenus in libello De ossibus*  
*seruari semper affirmat: ubi ex professo agit de*  
*variis capitum figuris. Reliquas vero duas testa-*  
*tur deleri, aliquando ambas, aliquando alterutram*  
*tantû. Ego vero (pacet âti viri dixerim) utrun-*  
*que falsum esse affirmare ausim, sexcenta millia*  
*capitum inspicere, manibusque attrectare mihi*  
*per otium licuit multis in locis, ac præsertim Flo-*  
*rentiæ in Diuæ Mariæ Nouæ amplissimo Xeno-*  
*dôchio, ubi per innumera propemodum secula*  
*demortuorum ossa in elegantissimas strues dige-*  
*sta seruantur: necnon Romæ in communi gen-*  
*tium omnium cimiterio, quem Campum san-*  
*ctum nominâr, & tamen ne vnum quidem cra-*  
*nium cernere potui, quod figura n natura oîi con-*  
*staret, aut cui Sutura illa deesset. Sciendum an-*  
*tem, ut supra attigimus, caput eam figuram a na-*

Coronalis  
 Sutura de-  
 scriptio &  
 vsus.

Sagittalis  
 Sutura no-  
 mina de-  
 scriptio, &  
 vsus.

Gal. lib. de  
 ossibus ser-  
 uari sagit-  
 talem in o-  
 mni capitû  
 figura affir-  
 mat.

Gal. opinio  
 de capitû di-  
 uersitate in  
 futuris ex-  
 perientia diti-  
 ce reproba-  
 tur.

Sanctæ Ma-  
 riæ Nouæ  
 hospitale  
 Florentiæ.  
 Capus san-  
 ctus Romæ.  
 Capitû fi-  
 gura natu-  
 ralis quæ.

Capitis fi-  
gura varia  
futurarum  
non variat  
numerum.

Suturarum  
differentia.  
Sagittalis  
in viris &  
mulieribus  
quandoque  
ad nares vf-  
que descen-  
dit.  
Aristotelē  
irridet, qui  
mulierum  
futuram cir-  
cularem po-  
suit.  
Squamosa-  
rum futu-  
rarum de-  
scriptio.

tura obtinere: ut spheram utrinque leniter com-  
pressam referat: ita ut in longum aliquo pacto  
protuberet: ab hac autem forma nonnullas eua-  
riare comperies, ut modo vertice sint acutiore, ac  
magis fastigiato, modo fronte prominentiore,  
modo pressius contracta, quod pari etiam ratio-  
ne de occipitio dici potest. Lateribus item constat  
modo magis, modo minus compressis, quae tamen  
formae omnes naturales sunt, neque adeo differunt,  
ut has naturales, illas non naturales appellaue-  
rit: seruarique in his semper cognoscas futuras o-  
mnes, licet haec quoque nonnihil discrepent. Atque  
ut praetermittamus, quod in aliquibus grandio-  
res, ac laxiores appareant, in aliquibus exiles, &  
compactae magis, quemadmodum supra diximus:  
illud est tamen adnotandum, in quibusdam cal-  
uariis tum virorum, tum mulierum, quidquid alij  
dixerint, sagittalem ipsam per mediam frontem,  
usque ad nasi summum descendere: sed hoc raro  
admodum accidit. Quamobrem vix satis mirari  
possum Aristotelis diligentiam, qui differen-  
tiam in viris, & mulieribus quo ad futuras, quae  
nulla est, observavit. Sequuntur duae futurae in  
declivi capitis longitudine sitae, a sagittali aequae  
distantes, quae ab extremitate descendens coro-  
nalis circulari quodam ductu supra aures ferun-  
tur, & in quibusdam humilimam labdoidis se-  
dem pertingunt, in nonnullis vero os mammi-  
lare non transeunt, a qua non magni refert, si alios  
anato-



anatomicos sequentes principium sumamus harum suturarum. Sat enim esse debet, si cum rei veritate descriptio cōsentiāt. Hæ duæ suture utrinque scilicet una cum squamosa ossa constituent, atque conglutinent, squamosæ & ipsæ dicuntur: ossa vero hæc squamosa merito nuncupantur, quoniam instar squamarum componuntur. Quod enim exterius ab aure ascendit, paulatim attenuatur: quod vero subest, descendēdo fit tenuius: Aut alteri pars, tenuior parti alterius crassiori incumbat, & equali proportionē hinc inde agglutinetur. Hæc forma tibi facile occurret: si piscium squamas, aut ferreas lorice laminas aliis aliis incumbentes & inhærentes intueberis. Verum prius quam ab his ossibus discedas, illud adnotabis, quod extrinsecus aſidet, illo durius esse multo, quod est suppositum, cum illi natura hoc ipsū tamquam propugnaculū constituerit. Quinque suture iam explicatæ ipsius capitis sunt propriæ: sexta suture illa erit, quæ ab extremitate labdoidis deducta per medium lapidosorum ossium fertur tendēs ad capitis basim, ubi caput prima cum vertebra iungitur, quam partem Gale-nus additamenta labdoidis suture nuncupat. Inde itaq; incipiēs sexta suture sursum utrinq; repetit ad caua temporū, vsq; ad fines coronalis, ac reflexa deorsum ad extremos dentes, atque ad palatum: & ibi capiti ac maxillæ superiori communis est, uniuersumque os cuncale in se comprehendit.

Ossa squamosa cur dicta sint, & qualia.

Squamosorum ossium figuram aliis exemplis illustrat. Ex ossibus squamosis cur superius est durius.

Suture sextæ descriptio.

Additamenta labdoidis quid sint Gal.

Vbi sexta suture cōmunis est capiti & maxillæ superiori.

Septimæ fu-  
turæ descri-  
ptio.

*Septima propria os capitis, quod octauum nume-  
rabitur, ab osse frontis distingui, ab omni parte  
illud separans. Octaua & ultima sutura nobis  
fuerit, quæ a canis temporum ortum habet, ubi  
sexta, quæ reflectitur, rectâ incipit descendere,  
ac per mediam minoris cantbi regionē mediam-  
que oculi orbitam serpit, & ad summum nasum  
transuersim delata maxillam superiorem a fron-  
te diuidit: at in interna caluaria iuxta basim os  
cuneale ab osse frontis disjungit. Et hæc de futuris  
breuiter dicta sint: in quo unum illud animad-  
uertendum est, suturas omnes extrinsecus magis  
apparentes esse. Intrinsecus enim suturarū ima-  
ginem non referunt, sed in harmoniam potius de-  
generant. Reliquum est, ut tandem capitis ossa  
explicemus. Ossium caluariam constituentium  
numerus non est idem ubique apud Galenū. Nam  
in libro De ossibus sex enumerat, & hoc ei cum A-  
ristotele conuenit: at in XI. de Partium utilita-  
tibus septem esse dixit. Ego vero octo unâ cum  
Vesalio numeravi. Duo sincipitis siue bregmatis:  
bregma enim dicitur pars superior cranii iuxta  
suturam coronalem, quæ infantibus, ac nuper  
natis tenerrima est, paulatim autem durefcit, ita  
ut temporis progressu ossa fiat. Aristoteles obser-  
uauit, pueros non prius vocem dearticulare pos-  
se, quam vniuersa caluaria in os concreuerit. In  
bregmate, cum adhuc molle est, Sislolem ac Dia-  
stolem plane perspicimus. id quod nobis opti-  
me*

Suturæ ex-  
tra conspi-  
cux sunt,  
intra vix  
apparent.

De ossium  
capitis nu-  
mero.

Gal. lib. de  
ossibus. A-  
ristot. de

Par. anim.

Gal. II. de V-  
su partium.

Vesal. opi-  
nio de nu-  
mero ossiū  
capitis lau-  
datur.

Aristotelis  
opinio de  
bregmate.

In bregma-  
te pueri  
Diafoles &  
Systoles cō-  
spicua est.

me confirmat perpetuo constrictionis, ac dilatationis motu cerebrum donari. Præterea sciendum est, vulnera in bregmate accepta lethalia esse solere: ossa autem hæc illa sunt, quæ inter labdoidem, coronalemq. suturam clauduntur, quæ sagittalis dirimit, atque intersecat: itaque utrinque alterum constituitur, ambo vero descendunt in unionem squamosorum ossium, & quadrilateram ferme formam habent: atq. hoc modo circumscribuntur, superiore parte per rectam pene lineam a sagittali, anteriore a coronali, posteriore a labdoide, inferiore autem a squamosis conglutinationibus. Tertium os quod occiput vocamus, a sutura labdali fines habet, præterquam quod in basi per sextam suturam transversim incidet, ab osse sphenoide disiungitur. Hoc os partibus constat inæqualibus, aliis quidem crassioribus, aliis vero tenuioribus: in media enim basi crassissimum est, necnon etiam ab eo foramine, per quod in spinalem medullam cerebrum deriuatur, insurgit prominentia quedam, quæ sursum ad summum usque ascendit: ut ubi os validius fieret. Ergo si quando in supinum quis laberetur, minus ex eo casu pateretur ossis huius robore munitus. semper enim natura conservandi operis sui studiosa, ubi maius periculum impendit, ibi quoque maiora struit presidia: cū itaque ictus occipitis neque propulsari possent, neque oculis præcaueri, ossis crassitiam munimenti instar esse voluit. Ut videatis

Cerebrum  
mouetur  
motu dia-  
tationis &  
constrictionis.

Bregmatis  
vulnera le-  
thalia.

Bregmatis  
ossium de-  
scriptio.

Occipitis  
circumscip-  
tio.

Cur in oc-  
cipite pro-  
muetia sit.

Cur occipi-  
tis os. cras-  
sissimum.



Arist. opin.  
3. de hist. A.  
mal. quod  
occiput sic  
tenuissimū,  
reprobatur.

quam longe erret Aristot. qui primo de animalium Hist. infirmisimum, tenuissimumque osium omnium occiput esse dixit: reliqua partes ab eo quod diximus, tuberculo tenuissima quidē sunt: sed admodum dense ac solide, neque excarnes, siquidem a musculis teguntur posteriorem colli sedem occupantibus. In hoc ipso osse cerebellum residet, neque ullo pacto est inane: sicuti falso asseruit Aristoteles. Vesalius Galenum inquit in calce libelli de ossibus temere scripsisse in cerebro quoddam os dari, idque esse processum illum in canibus cōspicuum, qui inter cerebellum ac cerebrum iacet. Sed falso Galenum citat hoc loco Vesalius. nusquam enim, quod ego viderim, huius ossis mentionem Galenus fecit. Occipitium iam a nobis descriptum non tribus lateribus, ut Galeno placuit, sed quinque mihi constare videtur: quorum duo prima incipiunt ab infima parte, & sursum a sutura labdoïdis iuxta temporū ossa, & sursum a sutura numquam declinantes ascendunt, donec ad mucronem eiusdem suturae coeant: duo vero alia ab eiusdem suturae calce secundum os mammillare, ac deorsum tendunt vsque ad eam lineam, seu suturam, quae dirimit occiput a sphenoidē; cuius suturae transuersim deducta beneficio quintum occipitis latus necessario conficitur. Scire insuper licet occiput in adultis unicum esse: at in pueris ex quatuor, quinque & septem ossibus constructum videri. Ad amplum enim

Occiput cō-  
stat quinq;  
lateribus  
non tribus,  
vt Galen.  
Occipitis  
laterum de-  
scriptio.

Occiput in  
infantibus  
nunc quin-  
que, nunc  
septem os-  
sibus con-  
stare vide-  
tur.

foramen,

foramen, per quod medulla dorsi egreditur, quatuor discrimina apparēt, quibus in quatuor partes ~~et~~ ipsum disjunctum dixeris. Ex his autem interstitiis effluit cartilago, quæ ligamenti vice caput prima, ac secunda vertebra connectit, vt moles tanta capitis paruis ossibus firmitus harere posset: de qua articulatione miranda multa refert Galen. lib. de Part. Vsu XII. Sed de his ligamenti plura suo loco dicemus. Illud postremo animaduertendum est, ab ipso sinu dorsalis medulle iuxta occipitis basim prominere duo tubera, longa illa quidem, & cartilagine in crusta modum obtecta, verum minus acuta quam censuit Galenus, qui illa corona assignauit; quæ ideo facta sunt, vt immittantur in sinus prima vertebra ad capitis articulationem constituendam. Quartū est os frontis, quod simplex atque vnicū est, exceptis caluariis quibus recta sutura, siue sagittalis vsq; ad summum nasi pertingit, quod tamen raro inueniri diximus. Proinde vnicū os frontis, quale in omnibus fere comprehenditur, circumscribemus. Illud quidem primum coronali sutura a sincipitis ossibus disiungitur, a cuneali autem distidet ea sutura, quā sextā fecimus, præcipue quæ per temporum caua subiugalibus transiens, & coronalis finibus accedēs ad interna penetrat: vbi perspicuum est, quod ponimus discriminē. Tertio seiungitur per septimā suturam ab osse capitis octauo. Vltimo a cuneali, ac etiam a maxilla

Occipitis  
multifidi  
in pueris  
tilitas,

Gal. 12. de  
Vsu part. ca-  
piti cū pri-  
ma & secū-  
da vertebra  
articulatio-  
nem effert.

Tubera  
duo in oc-  
cipite qua-  
li, & cur-  
talia.

Tubera  
duo occipi-  
tis non sunt  
vt coronæ,  
contra Ga-  
len.

Os frontis  
simplex.

Quibus os  
frontis du-  
plex est.

Ossis fron-  
tis circum-  
scriptio.

Ossis frōtis  
substantia  
qualis.

Sinus am-  
plus in osse  
frontis su-  
pra superci-  
lia.

Gale. igno-  
rauit caui-  
tatē in osse  
frontis.

Os frontis  
vbi tenuius  
& cur.

Ossa tem-  
porum.

Tempora-  
lium ossiū  
figura.

superiore, cuius interuentu suturae, quae a cauis  
temporum orta per medias oculorum sedes per-  
reptat, usque ad summum nasum peruenit, vbi  
supercilia desinunt, os frontis crassum est, sed non  
aeque ac ipsam occipitium, tenuius tamen se ipso  
redditur, ut in oculorum regione atque vbi cum  
octauo osse committitur, ac tandem supra super-  
cilia, vbi veluti duas in partes diducitur: ut si-  
num amplum ibi conficiat ad aerem continen-  
dum, qui sinus fere semper duplex reperitur, tam  
ad dextram quam ad sinistram vergens: quod  
ita esse in publicis priuatisque dissectionibus ob-  
seruari: hanc cavitatē Galenus ignorauit. Frontis  
ossis figura rotunda est, qualis sphaera compressa  
portio esse debet: os istud quae committitur cum  
verticis ossibus, & sagittali suturae occurrit, te-  
nuius est & infirmius: neque mirum est, cum in  
nuper natis pars illa membranea sit, qualem pau-  
lo supra diximus esse sincipitis portionem coro-  
nali suturae finitimam. Sequuntur ossa tempo-  
rum, quae superiore parte, quam sagittalem spe-  
ctant, squamosis agglutinationibus circumscri-  
buntur. Posteriores autem ab additamentis sutu-  
rae labdoidis, & a sexta sutura, quae infirmam quo-  
que eorundem ossium partem a Sphenoide, ante-  
riore vero a maxilla superiore disiungit: ossa haec  
ad triangularem figuram Galenus reuocauit. Sed  
ego cum Vesalio potius, circularia dicerem: cum  
taliam maxime viderentur superiore sui parte, nisi  
hanc



hanc formam multi processus obscurarēt, & primum mammillaris, de quo etiam supra meminimus, rupis similitudinem referens. Mammillaris ideo nuncupatus, quod vaccini vberis formā imitetur, Græcis μασοειδής vocatur. qui processus non solum musculorū insertioni deseruit, de quib. postea dicitur, sed etiam ut intus excavatus amplam sedem relinquat auditus organo apprimere necessariam. Ideo vacuum illud intus reperias, ac diuersis veluti speluncis excavatum. Deinde non procul hinc erumpit processus alter in eiusdem ossis basin implantatus, pertenuis, lōgus ac durus, qui diuersis nominibus donatus est pro diuersarū figurarum ratione, quibus comparatur. Ab acus enim imagine βελονοειδής, a styli scriptorij similitudine γραφοειδής, vel στυλοειδής, ac demum a galli calcaris specie πλῆκτρον appellatur; nos ubique styloidem dicemus: cuius nomine, quidam perperam intellexit totam eam partem, per quam meatus auditorius in cerebrum ducitur, & hunc Galeni testimonio βελονοειδῆ, seu γραφοειδῆ nuncupari asserit. Adest quidem processus alius iuxta hunc ipsum in longum protuberans interiore caluariae parte, in quo effingitur labyrinthus, reflectendis aeris ictibus quam appositissimus, auditorium sinum excipiens: sed non is est, quem acui, aut stylo similem esse diximus. Ad hos processus accedit quartus, qui portio est iugalis ossis, de quo sequenti capite agemus: & ab auris meatu

Mammillaris  
processus e-  
tymologia.

Mammillaris  
processus v-  
sus.

Idem est  
βελονοειδής  
processus.  
γραφοειδής  
στυλοειδής &  
πλῆκτρον.

Error cu-  
iusdam de  
processu  
styloide.

Processus  
tertius ossis  
temporalis  
descriptio.

Processus  
quartus of-  
fis tempo-  
ralis.

Gal. error.

Ossa  $\lambda\iota\theta\epsilon\alpha$ 

quæ.

Naturæ  
providentia  
in ossibus  
petrosis.Lonigus  
præceptor  
meus.Historia  
pueri cui os  
petrosum  
fractum erat.Historia a-  
lia similis.

incipit, in primumque maxilla superioris desinit, quo cum per obliquam suturam coniungitur, & pontis quodammodo formam constituit superequitantis caua temporum. Ab ortu eiusdem processus iuxta meatum auditorium sinus est altus cartilagine incrustatus, non oscitanter omittendus, in quem inseri atque articulari solet processus alter maxilla inferioris, qui longior est: quem sinum non recte Galenus descripsit libro de ossibus. ponitur namque inter aurem, & processum constituentem iugalem. Iam vero temporum ossa infra ad basim anfractuosa sunt, & aspera rupes ceu lapides imitantia, unde Græci  $\lambda\iota\theta\epsilon\alpha$ , quasi petrosa, vel lapidosa vocarunt, supra autem lenigata: & quamvis tenuissima sint, ac præcipue ubi assident muscoli, durissima tamen existunt mirabili naturæ providentia, cum vix frangi sine certo vitæ dispendio possint. Locus admonet ne silentio præteream, quod felicissime cecit prudentissimo, ac doctissimo ætatis nostræ Chirurgo Ioanni Antonio Plato cognomento Lonigo, quo præceptore septennium usus sum, adeo ut quantum in hac medendi arte profecerim, me nunquam pænitere possit. Hic Patauî puerum in Diui Antonii collegio, qui ex alto cadens temporis os ad ocularis formæ magnitudinem fregerat: miro ingenio, atque arte sanauit; quamvis certa mortis signa omnia adessent. Eundem ego fortune, curationisque exitum in Romano puero sum

ro sum affecutus. Ob capitis septimum varias formas præsefert, propterea Græci πολύμορφον *id* πολύμορ-  
 vocauere, quod etiam σφηνοειδὲς alio nomine di- φον & σφην-  
 cunt, hoc est, cuneiforme, quandoquidem inter os voειδὲς.  
 sa capitis, superiorisq; maxilla veluti cuneus qui- Os cuneale.  
 dam immittitur. barbari os basilare vocāt, quod Os basilare.  
 non secus ac basis quedam cerebro subternatur. Sphenoidis  
 nam in media capitis basi sedet circumscriptum offis descri-  
 vndique a sexta sutura, quam diximus totum ptio.  
 hoc os in se comprehendere: præterquam in ante-  
 riori parte, ubi terminum ab octaua etiam sutu-  
 ra capit. In ipsa basi crassum est, atque intus  
 antrum habet, quod continuum est cum cavitare  
 ossis frontis, in qua diximus aerem sursum per  
 nares attractum seruari, vsque quo in hoc ipsum  
 antrum delabatur. Ex quo fortasse materia ce-  
 rebro suppeditatur ad animales spiritus gignen-  
 dos, quidquid alij de hac re senserint, vt infra  
 ostendemus. Huiusmodi antrum in omnibus fe-  
 re amplum est, & vacuum; in aliquibus tamen  
 spongiosa cuiusdam substantia plenum. Squama  
 itidem tectum est dura & densa, nec ullis fora-  
 minibus peruia, quamquā Galenus foraminibus  
 refertū esse voluit cribri speciem referentibus, per  
 qua cerebri pituita percolaretur. In interna cal-  
 uaria medio hoc os sinum quendam habet perele-  
 gantem, equi sellæ similitum, in quo sita esse so-  
 let glādula quædā pituitam suscipiēs, vnde postea  
 defluit in palatū, ac nares per meatus ad palatum

Tertium os  
 πολύμορ-  
 φον & σφην-  
 voειδὲς.  
 Os cuneale.

Os basilare.  
 Sphenoidis  
 offis descri-  
 ptio.

Sphenoidis  
 antrum,

Noua opi-  
 nio de spiri-  
 tibus ani-  
 malibus.

Galenier-  
 ror.

Sellæ in  
 Sphenoide.  
 Glandula  
 suscipiens  
 pituitam.



ea in regione utrinque tendentes, de quibus agemus tractatu proprio de capitis foraminibus. Ad latera, quæ temporum caua respiciunt dua sunt partes intrinsecus concava, extrinsecus vero convexa. Item ea parte, quæ coheret cum extrema maxilla superiore, ubi molares infixi sunt, ad calvaria basim geminos utrinque processus inuenies alarum vespertilionum effigie exprimentes, propterea a Græcis dicti *πτερυγοειδεις*. in horum processuum medio sinus est profundus, unde exoriantur musculi in ore delitescentes, ut illud claudant. Octauum os capitis in media frontis basi positum a sphenoiide per septimam suturam, interna calvaria sede sciungitur, extra vero ad secundum, tertiumq; os maxilla superioris terminatur. Tenuissimum id est, crebriusq; foraminulis distinctum: quomobrem Græcis *ἰσχυροειδης* dicitur, quod imaginem cribri referat, per quæ foramina patere solet ascensus odoribus cerebrum petentibus: cuius rei argumentum inde sumimus, quod coryza, vel graui destillatione laborantes odorandi facultatem interim amittunt. Opplentur enim foraminula hac pituita spirituum grauitate detenta, atq; olfactitia organa ita impediuntur, ut ne vllum quidem odorem sentire queant, aut sensili virtuti suggerere. Media huius ossis regione prominet altus, subtilisq; processus sedē utramq; intersecans, qua olfactus instrumenta sunt sita, qui etiā in nares descendens nasi septū constituit.

Sphenoidis  
processus  
*πτερυγοειδης*.

Octauum os  
capitis  
delineatio.

*ἰσχυροειδης*  
cut ita di-  
catū.

Cur labo-  
rans coryza  
odorem nō  
percipiat.

Hoc os Galenus missum fecit in libello De ossibus, Gal. nō me-  
de quo tamen IX. de Partium Vsu meminit. minit de  
ithmoide

## De Osse Iugali. CAP. VI.

**O**S Iugale Græcis *Συγχα* describi solet se-  
paratim ab ossibus capitis ac maxilla supe-  
rioris, quamvis utriusq; portio existat: nam ex  
duobus processibus constitutū est, quorum alter a  
maxilla superiore sub paruo oculi angulo enasci-  
tur, alter vero ab ea parte osium temporum, que  
auditorio foramini superposita est. Hi duo pro-  
cessus committuntur per suturam, quam in me-  
dio obliquam habent, atq; ita os vnum efformāt,  
quod iugo simile est: ac etiam pontis cuiusdam in-  
star esse videtur, quod sit propositum temporis  
musculo, ceu propugnaculum quoddam a natura  
paratum, propterea foris gibbum est, intus autē  
cauum, & ut extrinsecus occurrentibus pertina-  
cius resistat, durissimum est ac pene solidum. Nō  
enim omni prorsus cavitāte destituitur, aut o-  
mnino expers est medulle, quemadmodum Ve-  
salius existimauit. Id namque effractum cauer-  
nosum protinus apparebit, ac intus nutrimētum  
continens. Factū praterea fuit iugale os, ut ab eo  
mansorius musculus principium duceret; sicuti  
ostendetur ubi de musculis agemus.

in lib. de  
ossibus.  
*Συγχα*.

Iugale est  
portio ossiū  
capitis &  
maxillæ.

Iugalis de-  
scriptio.

Iugale in-  
star pontis.  
Vsus Iuga-  
lis primus.

Iugale non  
caret me-  
dulla cōtra  
Vesaliū.  
Secunda v-  
tilitas Iuga-  
lis.

## De ossiculis organi Auditorij.

## CAPVT VII.

**A**NTEQVAM maxilla superioris ossa per-  
tracto: operæpretium est explicare nonnulla  
Gal. igno-  
rauit ossi-  
cula organi  
auditus.

osicula, quorum cum apud Galenum mentio nusquam fiat, coniiciendum est, veteribus anatomicis ignota fuisse, atque à recentioribus tandem inuenta; quis tamen inuentor fuerit, me plane

Vesalij laus.

Carpus ante Vesal. meminit officulorum meatus auditorii.

Inuenit tertium officulum.

Nemini praeclusa est philosophandi via.

Officula organi auditus membranis inuoluuntur. Quomodo inueniantur officula hæc. Figura primi officuli.

latet. Equidem Vesalium horum inuentorem libenter agnoscerem, cum Anatomica artis studiosissimus sit, & de illa optime meritis: nisi Carpus de his ante illum suis scriptis meminisset. Auditus organi constructionem ingrediuntur, de quo hic non est scribendi locus, sed infra cum reliquorum sensuum instrumentis. Ex his osiculis recentiores duo duntaxat nouerunt, quæ etiam descripserunt. At ego cum hac accurate peruestigare, tertium præterea inueni, quod describam post aliorum duorum descriptionem: ut videas nemini præclusam esse philosophandi viam. Inter ossa temporum, ut supra attigi, adest processus ad cerebri basim, qui in iugi modum extenditur, in acutum desinens, cauernamq; intus habet instar labyrinthi, in cuius prope media regione adstant osicula suis membranis adnexa. Ideo per auditorium meatum iter est ad horum osiculorum inuentionem, quorum primum propinquius est foramini interiori, longiusculum, ac femoris figura quam simillimum, a quo tamen aliquid tantulum euariat: siquidem parte inferiore non depressis est capitibus, ut femur, sed mucronis ritu in acutum tendit: parte vero altera capite est oblongo, rotundoque. Præterea duobus processibus



cessibus donatur similibus iis, quos rotatores in femore vocabimus: parte sui acuta, ac tenui in membranulam inseritur, quae intenditur ipsi ac illi, quod succedit, ad quam pariter extenditur, & adheret veluti ad eam stratum: parte aliera, quae crassior est, & capite insignita, illam ipsam membranam tympani modo quatit. Idcirco ab usu magis, quam a forma malleum hunc dixerunt: quemadmodum alterum, quod immediate sequitur, incudi simile esse voluerunt, quod incudis vices gerat, excipiens quodammodo ictus per moti, ac percutientis malleoli iam descripti. Id secundum ossiculum, quod incudis nomine donarunt, parte superiore crassiusculum est, quae planam incudis partem refert: & in duos tenues, acutosq; processus tanquam crura desinit: quorum alterum immittitur in tertium ossiculum, de quo mox dicam, & in membranula ibi assistente detinetur, ac stabilitur. Ossiculum hoc me indice molari denti aptius comparaueris, qui duas radices habeat, alteram longiorem ac tenuiorem, alteram vero crassiorem ac breuiorem. Caterum usus gratia, ut dicebā, incudis nomine dictum est. Natura non temere duo haec ossicula ita construxit, ut crassiore parte mutuo se respicerent, ac pene contingerent. Nam cum ex aeris motu auditio fiat, ictus aeris in meatum ad haec ossicula deferretur: fitque ibi quaedam repercussio ad eum ciendum sonitum, qui sentitur. Hec igitur

Cur primū  
ossiculū di-  
catur malle-  
us.

Cui secun-  
dum ossicu-  
lum dicatur  
incus.

Incudis os-  
siculū descri-  
ptio.

Secundum  
ossiculum si-  
mile est denti  
molari.

Vsus duo-  
rum ossium  
organici au-  
ditus.

Situs tertij  
ossiculi.

Staphæ cō-  
paratur fi-  
gura tertij  
ossiculi.

Ossicula  
tria auditus  
organo ser-  
uiunt.  
Ossicula or-  
gani audi-  
tus nō sunt  
solida con-  
tra Vesal.  
tertio exce-  
pto.

Administra-  
tio ossiculo-  
rum.

tur ossicula cedente membrana moueri, atq; in-  
uicem confricari necesse est: ut cum primum os  
aeris ictu percussum in alterū impingat, illudque  
feriat, merito malleoli, secundum vero incudis  
officio pariter, & vocabulo donatum est, ubi ista  
articulata sunt, cartilagine incrustantur. His  
tertium accedit nemini, quod sciam, ante nos co-  
gnitū. Iacet hoc, vel latitat potius in cauernula  
quadam ferme rotūda intra sinum auditorium  
exculpta, quo fit, ut ad organi auditus fabricam  
non pertinere non possit: cauū est, & perforatum  
egregie, ferrei instrumēti naturā imitatur, quod  
staphā nouo vocabulo nuncupamus, in quo equo-  
rum sellis insidētes pedes sistūt. Vna re tamē a sta-  
pede differt, quod caret eo foramine, in quod lora  
immittuntur ad stapedē sellæ vtring, alligandā.  
At huius loco capitulū quoddam extat rotūdum

quo ad incudis processum accedit. Quocirca cum  
ossicula hæc inter se coniuncta sint, & colligata:  
ex eo cōiectare haud dubie possumus auditus or-  
gano simul omnia deferuire. Ossicula hæc cū mi-  
nima sint: ideo Vesalius illa more suo solida esse  
affirmauit: attamē in iis cauernulis quāuis exi-  
guas reperimus: intus enim spōgiosa sunt, & me-  
dullam pro magnitudinis proportionē continēt:  
præsertim illa duo, quæ ab aliis descripta fuere.  
Etenim tertium propter nimiam suā tenuitatē soli-  
dum omnino esse crediderim. Si quis hæc ossicula  
inuenire cupiat, leuiter, paulatimq; incidat, quæ  
circa

circa meatum auditorium consistunt: & sensim  
 meatū aperiat, donec cavitatem illam detectam,  
 patentemq; videat: & ubi deuentum fuerit ad  
 mediam fere ipsius sinus regionem iuxta mem-  
 branam, qua ibi obducitur, ac implet cauernu-  
 las in eo sinu existentes, statim perquirenti occur-  
 rent forma a nobis descripta. Quae administra-  
 tio cum est incunda visu, tum etiam admirabi-  
 lis, & quae nos in sapientissimi opificis amorem  
 volentes, nolentesque trahit, rapitque.

De maxilla superiore.

CAPVT VIII.

**Q**UAE nam sit maxilla superior, facillime  
 quidem vel digito demonstratur: at nihil  
 fortasse difficilius est quā verbis explicare, qua-  
 lem figuram habeat, quot, quibusq; ossibus constet,  
 quomodo ve a ceteris capitis partibus distingua-  
 tur. Maxilla superior animantibus omnibus mo-  
 tu caret Crocodilo excepto, cui mobilis existit in-  
 feriore quiescente, & psittaco, qui utraq; eodem  
 tempore mouet, separatimq; alterutrā: quod ego  
 primus, quod scia, obseruauī. Ex penitissimis na-  
 turae arcanis perquirendū esset, cur hoc solū ani-  
 mantū genus ab aliis euariet: satis tamē interim  
 nobis esse debet effectū nosse: etiā si causa ignore-  
 tur. Verū in hominib; venustati est, ne dū cōmo-  
 do inferioris maxilla motus: nā maxillam supe-  
 riorē hominibus, aequae ac Crocodilo moueri, quid  
 ridiculū magis, ac deformius humana facie fiat?

Officiorū  
 organi au-  
 ditus ad o-  
 ptimum &  
 maximum  
 Dei amorē  
 inuitat.

Difficilis est  
 explicatio  
 maxillae su-  
 perioris.

Crocodilus  
 mouet ma-  
 xillam supe-  
 riorē.

Psittacus  
 mouet ma-  
 xillā utram-  
 que.

Cat homo  
 maxillam  
 superiorē  
 non mouet.



totam siquidem contrahi, rugarique oporteret:  
unde ea vultus forma, atque indoles corrumpere-  
retur, qua nihil intuitibus gratius, nihil incun-

**In hominis** fabrica or-  
nameti ra-  
tio habetur.  
**Cum** maxilla  
superior sit  
inferiore  
brevior.  
**Cum** maxilla  
superior cō-  
fletur ex plu-  
ribus ossibus.

**Causa secū-  
da.**

**De numero**  
offium ma-  
xillę superi-  
oris.  
**Gal.** non cō-  
stat sibi in  
numero of-  
fium maxil-  
lę superio-  
ris.

dus offerri potest. In humana autem fabrica de-  
cus, & ornamentū considerari quis admiretur,  
cum illa Deus Opt. Max. nihil absolutius crea-  
uerit, perfectius nihil? Adde quod brevior facta  
est superior maxilla, ut rotundior, atque elegan-  
tior esset facies, nec promineret quemadmodum  
in brutis. Ex pluribus etiam ossibus constructa  
fuit, non ob eam causam tantum, quam Anato-  
mici tradunt, ne si partes illius omnes in unum  
coactæ unicum os efficerent, parte una laboran-  
te labor in uniuersam maxillam diffundi posset:  
verum etiā ut ex eis futuris prodirent ligamen-  
ta musculorū constructionem ingredientia, per  
quæ illi firmiter principiis suis inhererent. Neg-  
id observatu est difficile, quando ex ipsa sectione,  
si musculos ita persequare, ut eorum ortū inue-  
nias: cum ad principium ventum fuerit, non ob-  
scure tibi erunt ligamentorum propagines ex me-  
diis futuris prodeuntes, in musculorum substan-  
tiam dispergēda, quarum beneficio cum musculi  
tenacius ossi & parti, unde ortum ducunt, alligā-  
tur: tum etiā validiores fiunt, ut supra dictum  
est in appendicū usu. Cum igitur ex pluribus of-  
sibus construi maxillam superiorem necesse fuerit:  
videndum est, quot ea sint, & quibus finita ter-  
minis. In variis Galeni locis varius horū nume-  
rus

*rus traditur: nā libello de ossibus quindecim e-*  
*numerat: xi. de Partium Vsu nouem: in Intro-*  
*ductorio siue Medico, Galeno adscripto, duode-*  
*cim, cui numero Vesalius subscribit: at ego trede-*  
*cim semper esse obseruauī. Nam quinq; in utraq;*  
*parte perspectis vnum sine pari adinueni; quod*  
*ultimo loco explicabitur. Ossa igitur hæc tribus*  
*suturis a capitis ossibus separantur: sexta, quæ ab*  
*extremitate coronalis deorsum subiugali ad dē-*  
*tes extremos delata ad palatum terminatur: o-*  
*ctaua, quæ a cauis temporum principium sumēs*  
*fursum repit transuersim faciem in summo naso*  
*intersecans; demum ea sutura breui, atque obli-*  
*qua, per quam duo processus committuntur tem-*  
*porali musculo superpositum os, quod ubique iu-*  
*gale dicimus, constituentes. Hæc itidem ossa pri-*  
*uatim suis terminis ad hæc modum circumscri-*  
*buntur. Primum, cuius figura varia est, quatuor*  
*habet ossa contigua, quibus committitur. nam*  
*posteriore parte processum emittit; alterā iugalis*  
*portionem efformantem; atque ibi cum altera e-*  
*iusdem portione, hoc est, cum temporis processu*  
*per obliquam suturam coniungitur: deinde in ca-*  
*uis temporum cuneiformi committitur sexta su-*  
*tura beneficio, ubi sese illa reflectit, ut deorsum*  
*ad postremos dentes feratur. Siquidem descri-*  
*ptione nostra sexta sutura totum illud os ambit,*  
*quod est veluti cuneiformis brachiū in utrūque*  
*latus subiugali extensum per quod ipsum cunei-*

Gal. lib. de ossibus.

Gal. ii. de Vsu Part.

Gal. in Introduct.

Contra Vesal.

Ossa maxillæ superioris sunt tredecim.

Ossium maxillæ superioris descriptio in vniuersum.

Primum os maxillæ superioris.

Sexta sutura quid sit.

forme tēporali musculo in mediis canis subsidet, ac fere ad coronalē vsq; protenditur. Huius igitur particula ad oculum: vergens tantum cum primo maxilla superioris osse cōtinetur, quātum futura ipsa recta descendit. Parte autē superiore iuxta superciliū extremitatem idem os cum frontis osse coalescit per octauam futurā, quæ per mediā oculi cavitatē ducta, trāsuersum summū nasum ab ima fronte secat: inferius a tertio mala osse disiungitur quadam sutura, quæ sub tēporis cauo a sexta recedens sursum ad faciem repit: ac per mediam ipsam ductu sinuoso lata in oculi orbitam intrat: per quam ascendit, donec octauum attingat, ibiq; desinens exteriorem oculi angulum circumscribit, quē totum os istud in se com-

Secūdi ossis  
maxillæ su-  
perioris de-  
scriptio.

Gal. opinio  
de medica-  
mentis in o-  
culos im-  
missis ad na-  
res refluxen-  
tibus repro-  
batio.

Vbi fiunt æ-  
gilopes.

Ægilopæ si  
negliguntur,  
transiunt in  
fistulas.

prehendit. Secundum omnium minimū in ma-  
gno oculi sedis angulo iuxta nasum asidet, ac sta-  
tim eiusdē anguli initio sese offert, vbi foramē est  
in nares peruiū, cui præsidet caruncula glandule

vice pituitā a cerebro manantem ad oculos exci-  
piēs, ut illa ad ipsas nares exprimat. Quā rē ut

apertius cōprobaret Galenus, addidit medicamē-  
ta in oculos immissa per nares effluere solere. Id

quod hætenus mihi experiri minime licuit. Et  
mirū profecto est quomodo mēbranā, quæ ibi as-  
sit, ocularia hæc medicamēta penetrare possint.

Animaduertēdū tamē est hoc loco abscessus illos  
feri, quos Græci αἰγίλωπας nomināt: qui si negli-

gantur, in fistulas lachrimales abeunt ad os vsq;  
penetran-

penetran-



penetrantes. Osficulum id superiore parte octaua sutura terminatur, quia saepe iam dictum est, os frontis a superiore maxilla diuidere. Idem quoque ab illo diuidit, & simul etiā a tertio, quibus pari ratione commissum est. Tertium, quod a Galeno os male dicitur ceteris longe maius, varium est, ac variis suturis definitur: illud autem est, quod omnes sui lateris dentes cōtinet: quāquā Galenus incisorios excipiat: cū suturā ponat inter caninum, incisoriosque dentes: quā licet in hominibus nusquā reperta sit, in simiārū tamen, canumq; maxillis conspicua est: distinguitur autem id os tertium a primo maxillae osse communi sutura per mediā faciem sub genis in oculi orbitā repente, qua itidem diximus primū os huic ipsi tertio committi. Superius per octauam suturam ab osse frontis terminatur: in interno oculi angulo a secūdo dissidet linea totum id osficulum ambiente. Quā vero nasum spectat, ab eius ossibus per suturā ab octaua descendente disjungitur sub palato ab eo osse, quod quintū numerabimus insigni sutura, quae transuersim per palatum incedit: ubi quoque lineam reperiās per palati longitudinem deductam, sursumque inter incisorios dentes vsq; ad imum nasum assurgentem, cuius operatur tertium os in dextrū, sinistrumque diuiditur. Illud praeterea notare libet, aliam suturā transuersā sub palato in pueris.

Os male est  
tertium os  
maxillae superioris.

Galeni error in osse male.

Gal. dictum verū est in simiis & canibus.

Finis ossis male.

Sutura transuersa sub palato in pueris.

in pueris conspicua est, in adultis autem sic aboletur, ut nullum sui vestigium relinquat. Postremo sphenoidi finitimū est os istud, ubi sexta sutura, postea quam diremit primum a temporum ossibus, in amplam cavitatem discedit, ibique disperditur, usque dum extremis dentibus appropinquat. hoc insuper de tertio hoc osse adnotate, illud præter quam quod multis partibus perforatum est ac etiam spongiosum, amplam in se cavitatem continere intus, extraque ab osse veluti ampullosa, attenuatogue obtectam: quod fortassis a natura lenitatis gratia factum fuit. Ex his ossibus, quæ hætenus descripta sunt, omnia colligere potes, quæ ad oculi sedem constituendam necessario concurrunt. Nam partem superiorem, atque etiam interni anguli dimidium os frontis: reliquum tertij ossis portio, quæ cum nasi ossibus committitur, inferiorem, ac simul externum angulum totum primum os struit. Quod autem ad interiorem ipsius sedis partem attinet: secundum os ithmoides, & demum cuneiforme suam operam, materiamque subministrat, quam oculi sedem, quod in orbem exculptam cernerent, ideo posteriores orbitam nuncuparunt, eaque ab omnibus in magnū angulum interiorem nimirum, & in paruum, qui exterior est angulus, nec non etiam in superiorem partem, quæ superciliis subiacet, atque inferiorem diuisa est, quæ genis supereminet. Verum ad reliqua maxilla superioris ossa, unde digressa est

Ossis mala  
substantia  
qualis.

Sedes oculi  
ex quib. os-  
sibus constat.

Orbita cui  
dicitur oculi  
sedes.  
Orbitæ di-  
uisio.

est oratio, reuertatur. Quartum itaque sequitur os, quod alterum ex duobus nasi ossibus Vesalio est. Nos vero nostrum ordinem sequentes, quartum illud esse dicimus, quod ille pro sexto, atque ultimo accipit. Idque repositum est iuxta palati extremum, cuius non minimam portionem occupat, distinctum ea sutura, quam dictum est transuersum palatum secare, terminatur qua nares in fauces pertinent. Dirimitur praterea sphenoidis processibus, quos alis vespertilionum comparauimus, sextæ suturæ beneficio ad intimos dentes decurrentis. Quintum os partem nasi superiorem, quæ vere ossea est, geminum existens constituit. Inferior vero nasi pars cartilaginea est, ut cum ictibus, casibusque maxime exposita foret, non ita facile frangi posset, quemadmodum asidue contingeret, si ossea facta esset. Quod igitur osseum est nasi, cum duplex sit communi sutura in dextrum, ac sinistrum distinguitur, ac frontis ossi inter supercilia committitur per octauam suturam, de qua sæpe meminimus. In descensu autem ab utraq; parte cum osse tertio per suturam communem utriusque coniungitur. At in interna parte, ubi ambo hæc ossicula communi linea iunguntur, adherent septo illi, quod ossis cribri specie referentis partem esse diximus. Et hæc dicta sint de maxilla superioris ossibus: quæ cum in utroque latere quina sunt, omnia simul erunt decem. Ceterum his unum mihi addere libet undecimum,

Quartum os maxillæ superioris quod sit Vesalio.

Quid sit quartum os maxillæ superioris & eius termini. Sphenoidis processus similes alis vespertilionum.

Quintum os maxillæ superioris. Cur nares sint cartilaginosa. Terminus ossis quinti.

Vndecimi ossis descriptio.



Vndecimi ossis descriptio. quod supra medium, intimumque palatum, intra nasi fauces positum est: atque ab ea parte, qua caput pertingit a lata rimula secundum totam longitudinem dissecatur, cuius bifurcata basis, quæ crassior est, in cuneiforme incumbit, extenditurque per nares septi partem imam constituens: quod tamen ab altera parte leui momento diuellitur, huius formam aratri vomer imitatur, quod imaginem cultri seruat, præter quam quod & manubrio caret, & sinuosa, atque in aquali existit acie. Præter vndecimum addi potest duodecimum, & tertiumdecimum. Duo scilicet ossa spongiosa in naso facile eroduntur in morbo Gallico.

De inferiore maxilla. CAP. IX.

Epilogus præcedentis capituli.

**P** Ræcedenti capite maxillam superiorem in animantibus omnibus, Crocodilo excepto immobile esse dicebamus: addidimusque, inferiorem in homine solam moueri, in psittaco utraq. Causa vero, quamobrem hominis ac brutorum maxilla figura non eadem sint, ea esse potest: quod animalia cetera manibus destituta inclinari oportebat ad cibum ab humo capiendum: proinde sapientissimus rerum opifex Deus maxillis oblongis, ac prominentibus illa munivit, quibus manuum vice uterentur. Ceterum homo cum manus obtinuerit, quarum opera ori cibum admouere potest, breuiorem

Cur brutis sint maxille oblongæ.

Cur homini sit rotunda facies.

rem ac pene orbicularem maxillam est adeptus:  
itaque elegantio rem, venustio remq. cui maxil-  
larum figura, & elegãtia simia proxime accedit,  
quippe quæ non multum ab humana facie rece-  
dat, cum manibus & ipsa quodammodo vtatur.

Verum inferior maxilla ex durissimo osse, ma-  
gnaque ex parte pene solido constare debuit, vt  
validior esset, ac variis, fortissimisq. motibus in-  
mandendo, mordendoq. sufficeret, & in arcum  
veluti obducta amplũ sinum reliquit, vt leuio-  
rieret, minusq. incommodi mouentibus musc-  
ulis præberet. In hominibus simplex, atque ex vnico  
osse constructa, quamuis duplicem esse Galenus  
scripserit, eamque in summo mento laxari. Ta-  
lem sane reperias in canibus, equis, bobus, atque  
id genus animalibus, quando longo ductu adha-  
rere possunt. Hominis vero maxillam biparti-  
tam nusquam reperias. At Galenus hoc, vt alia  
etiam multa, ex simia simulacro in hominem nõ  
transtulit. Et enim nullum inuenias discrimen  
inter humanam, simiaq. maxillam inferiorem.

Verum sane oportet in pueris lineam a summo  
mento protendi, ac mediam quodammodo ma-  
xillam superficie tenus peruadere, quæ non mul-  
to post tempore cum prorsus aboleatur: ideo huic  
geminum esse maxilla os coniici non potest. Hac  
autem linea futura rationẽ interim habet, dum  
ex ea producuntur, atque exeunt ligamẽta, qua  
musclos ibi existentes ingrediuntur. Inferior

Simiæ fa-  
cies similis  
humanæ.

Simia mani-  
bus vtitur.

Maxilla in-  
ferior cur  
ex osse duro  
constat.

Sinus ma-  
xillæ infe-  
rioris cur.

Os maxillæ  
inferioris  
non est duo  
decimũ cõ-  
tra Galen.

Simiæ ma-  
xilla infe-  
rior vnico  
osse cõstat.

Ex quo cõ-  
iicerint ma-  
xillæ infe-  
rioris os ef-  
se bifidum.

Lineæ in  
mento pue-  
rorum vsus.

Processus  
duo inferio-  
ris maxillæ.

60 REAL. COLUMBI CREM.

Acuti pro-  
cessus vñs.

Alteri<sup>o</sup> pro-  
cessus, ma-  
xillæ infe-  
rioris descri-  
ptio.

Cartilag. in  
sinu & pro-  
cessu secun-  
do maxillæ  
inferioris  
vñs.

Gal. error in  
sinu maxil-  
læ inf.  
Cur maxil-  
læ inferior  
sit aspera  
ante.

Foraminū  
vñs.

Alueoli dē  
tium.

Quādo al-  
ueoli den-  
tiū in seni-  
bus obse-  
rantur.

maxilla in duos processus utrinque desinit, quo-  
rum prior in mucronem tendit, posterior vero  
capitulum, ceruicemque habet. Acutus processus  
factus est, ut excipiat temporalis musculi tendi-  
nem, qui in illum validissime implantatur. Al-  
ter autem, qui oblongo transversim capite dona-  
tur, in sinum sibi proportionem respondentem in-  
seritur: atque ita cum temporum osse inter iuga-  
lis radicem, auditoriumque foramen articulatur.  
Hunc sinum, & capitulum maxillæ processus car-  
tilago crustæ modo obducit: sed inter sinum, ac  
processus caput intercedit quadam cartilago mol-  
lis & mobilis, quæ non modo ligamenti munere  
fungitur, ad continendum in suo sinu processum:  
verum etiam lubricum magis eius articulatio-  
nis motum reddit, ac simul efficit, ne assiduo mo-  
tu confricata ossa vel rumpantur, vel saltem at-  
terantur. hunc sinum Galenus posuit sub mam-  
millari processu, cum tamen amammillari distet.  
Maxilla inferior parte anteriore aspera est atq;  
inequalis, ut ibi inserti musculi tenacius here-  
ant: suaque habet foramina, per quæ arteriæ, ve-  
na, ac nervi transmittuntur, de quibus in capite  
de foraminibus capitis agemus. Præter hæc fora-  
mina sunt quæ plurimi sinus tamquam alveoli, in  
quibus dentes insident: ita in maxilla inferiore  
infixi, quemadmodum in superiore, quos aliquan-  
do cernimus in seniorum maxillis pene deperditos:  
cū scilicet erutis, aut delapsis dentibus maxilla ea

par-



parte comprimitur, vsque adeo vt os ipsum vndique cohareat, constipetur, ac tandem uniatur. Id quod prater cetera mihi obseruare contigit in vetula cuiusdam caluaria, in cuius maxillis vix bini, aut terni dentes prodiisse videbantur: adeo erant oppleta alueolorum vestigia, & in vnum solide coiuerant. Quot autem esse debeāt alueoli in vtraque maxilla, sequenti capite de dentibus planum fiet.

## De Dentibus. CAP. X.

**Q**UEMADMODVM reliqua ossa omnia minime sentire, ita dentes ipsos sensus participes esse, rerum magistra experientia docuit. Vtriusque autem causam perquirētibus facillime constare potest, ex neruorum id propagatione euenire. Etenim molles quosdam, ac tenues neruulos a tertia neruorum cerebri coniugatione ad dentes deriuari, ac per ipsorum radices ingredi, liquido apparet: quicum per interna dentium disseminantur, ita eorum substantiā efficiunt, vt notatu dignam sentiendi facultatem inuehāt. Verum ad cetera ossa nulla neruorum portio pertingit, per eorū substantiā transfundenda, quanquā per illa nonnunquam, quē admodum per capitis, ac vertebrarum ossa nerui transeunt, sed aliorum tamen sensum laturi. Quamobrem sensus omnino expertia esse fatendum est. In quo familiaris meus ac ciuis I. Bap. Mazzolarius, egregius sane iuuenis, morib. ac li. Cremonensis opinio, quod dentes sentiant experientia cōfirmata.

Dentes sentiunt.

Cur dentes sentiant.

Tertiæ coniugationis nerui ad dentes.

Curo ossa non sentiant.

Nerui transcurrentes per caluariæ ac vertebrarū ossa alio sensum deferunt.

Io. Baptistæ Mazzolarij

cōfirmata.

teris perornatus, vix satis mirari poterat illorū  
amentia, qui aut ossa cuncta sentire aiebant, aut  
ne in dentibus quiddē sensum inesse oportere, quos  
aut sensum negātes indignos penitus iudicabat,  
qui audirentur: atq; ipsis precabatur, quod ipse  
per multos annos summo cum suo malo expertus  
fuerat, quādo a septimo atatis suae anno ad vige-  
simum sextum vsque dentium dolore adeo gra-  
uiter laborauit, ut cum frustra reliqua medica-  
menta adhibuisset, ad ignem saepe confugere sit

Dentis quae coactus: addebatque quod pars illa dētis, quae ex-  
prominet tra gingiuas extaret, nihil pene sentiret: pars ve-  
pars nō sen- ro, quae in alueolis delitesceret, atque a gingiuis  
tit: sed quae tegetetur, acerrimi esset sensus; cum scilicet ner-  
iacet in al- uis, neruiq; virtus ad eam vsque regionē exten-  
ueolis, & deretur, ubi cavitās dentis interna desinit, &  
cur.

Probatio gingiuarū terminus est. Quod autē pars dentis,  
quod dētis quae nuda cernitur, atq; a gingiuis prominet, in-  
pars denu- sensibilis existat, ex eo probari potest, quod dētes  
data gingi- in ea parte secātur, limis atteruntur, equari, de-  
uis non sen- curtari, ac laeuigari solent: necnon etiam candem  
tiat. tibus ferris uri, & tamen vix sensus indicia de-

Gal. dētium prehēdūtur: quamquam ab iis animus adhor-  
dolore labo rere videatur, qui aliquam inde lesionē non po-  
rauit. teste prima facie nō pertimescere. Dentium do-  
Dentiū do- lore Galenus & ipse vexatus diligentius inuesti-  
lorē pulsa- gans num dētes dolerent: nō modo eos ipsos dōle-  
tilem senti- re, verum etiam pulsare deprehēdit: nec meher-  
ri posset cum cule iniuria, quando certum est, sicuti ego in pu-  
Gal. proba- blicis  
tur.

blicis dissectionibus ostendere solitus sum, una cum nervo venā, atq; arteriā valde exiguas ad singulos dentes perferri: quo factum est, ut quemadmodū per nervos sentire dētes cognoscimus: ita quoq; credamus per arteriam pulsare, & per venam nutriri. Vnde alterum inter ossa, & dentes nō leue discriminē habetur, quod scilicet dentes perpetuo aluntur, & augētur, ossa vero alia non secus ac reliquæ corporis partes ad statū vsq; annorum numero augentur: ad quem ubi deuentum fuerit protinus consistunt, atque ab auctione ipsa cessant. Quamobrem videas dentes exemptis oppositos crescere, & aliis qui in eadē sunt serie, prominentiores, exertosque magis fieri: ceteri nanque oppositorum e regione mutuo congressu, atque attritu, quantum augentur, tātum pariter imminuuntur, id quod leuigandis cibis potissimum euenit. Dentes, etsi numero euariant cū modo plures, modo pauciores reperiantur: at tamē triginta duo plurimū sunt, nam sexdecim in utraque maxilla continentur. Atq; hi tres in partes diuidi solent, in molares, seu maxillares, caninos, atq; incisorios: quatuor primi anteriores incisori dicuntur, propterea quod ea figura præditi sunt, ut incidendi munere fungi possint: latii enim sunt, & acutam aciem præ se ferūt, ut cibum oblatum cultri modo secant, quod facillime præstant, cum in totidem sibi aduersos, & ad eundem vsum fabricatos impinguntur, ac com-

Per arteriā  
dentes pul-  
sant.

Dentes sem-  
per crescūt:  
ossā nō sem-  
per.

Cur exēpto  
dēte, qui illi  
a regione re-  
spōdet alios  
sui ordinis  
excedat.

Dentiū nu-  
merus va-  
riat.

Dentes plu-  
rimum tri-  
ginta duo.  
Dentium di-  
uisio.

Incisori j dē-  
tes qui &  
curit adisti.



- Canini dē-tes qui & eo-  
rum vsus &  
etymolo-  
gia. *primuntur: iuxta hos molares versus tendenti-  
bus canini occurrunt, qui utrinque singuli pares  
sibi, ac respondentes habent, ampli ea parte, qua  
gingiuis proxima est, in apice vero acuti sunt: ut  
ad frangendum quam maxime idonei reddan-  
tur. Itaque fit, ut cum incisoriis aliquid offertur,  
quod prae eius duritie ab iis diuidi nequeat. tunc  
caninis traditur ita dictis, quoniam exertis can-  
nū dentibus quam simillimi existunt. Postremo*
- Dentes mo-  
lares quot. *succedunt maxillares quini ab utroq; latere tam  
superioris, quam inferioris maxilla, qui & mola-  
res nuncupantur, quoniā facti sunt ad terēdos,  
Molarium  
vsus. *leuigandosque cibos molarum exemplo, quibus  
cereales fruges moluntur. Itaq; ampli, duri, ma-  
gni, atque asperi constructi sunt, alioqui commi-  
nuendis cibus ineptiores futuri. Cur enim asperi  
esse debeāt, mola ipsa satis demonstrāt; quae cum  
diu molendo asperitatē deposuerint; rursus arte  
Cur dentes  
durissimi. *solent exasperari. Iā vero durissimos fore dentes  
necesse fuit: ut cibus conficiendis sufficerent, ne-  
que ab iis contererentur: ampli quoque, & ma-  
Cur mola-  
res magni. *gni facti sunt: ut diutius, & commodius munus  
suum obirent. Dentes in maxillis per Gompho-  
Dētes arti-  
culātur ma-  
xillis per  
Gōphosim. *sim veluti clani infixi inhaerent, dentiumque  
sinus in maxillis tamquā alueoli interstitiis suis  
distincti sunt, atque ita praeseptiola quadam esse  
videntur. Ideo Graci φάρυα dixere. Sciendum  
φάρυα quid  
Græci vocēt.  
De dētiū  
radicibus. *in super est nō paribus omnes radicibus implan-  
tari: siquidem aliqui una tantum, aliqui dua-  
bus,******

bus, nonnulli tribus, quidam etiam quatuor radicibus inferuntur. Anteriores dentes, ut canini atq; incisorij vna tantum radice donantur, molares autem pluribus. Verum ex iis, qui inferioris maxilla sinibus continentur, binas; qui in superioris, ternas radices possident. Nonnumquam etiam videre est & inferiores tribus, & superiores quatuor radicibus donatos: sed id rarissimum est. Ad hac quandog; inuenias molares duos superiores canino denti proximos ex binis radicibus constare: inferiores autem illis vtiq; ipsis respondentes singulis. Ex quibus varietatum formis in vniuersum percipito, molares inferiores vna semper radice a superioribus sibi oppositis superari, radicesq; ipsas inferiorib. breuiiores esse: superioribus autē longiores, neq; id sine consilio. Quando quæ pendent, cum facilius labi ac discuti possint, quā quæ in imo quasi solo insident: iccirco illa tenacius atque altius insigi debent, ut firmitus validiusq; hæreant. Obseruatu quoq; dignum est, intimos, atq; omnium postremos maxillares breuissimas radices obtinere, tū quia minimum cæterorum in leuigandis cibis exerceantur. Adde etiā quoniā illa maxilla portio profundiorē insertionem non admittit. Hos genuinos appellari libuit, qui plerumque in causa sunt, cur varius dētium numerus habeatur: modo enim vno super addito triginta tres constituuntur: sicuti mihi sæpe videre contigit in

Caninis & incisoriis dixi vna.

Molares dētes maxillæ inferioris habēt plures radices quam superiores.

Dentes superiores quatuor radicib. præditos videre rarum est.

Curradices dētiū maxillæ superioris sint longiores.

Molaribus postremis breuissima radix & cur.

Molares postrema pubertate enasci solent.

Molares postremi genuini dicuntur.

Dētes quādoque triginta tres.

Dentes viginti octo.  
Cardinalis Ardinghelli dētes viginti sex.

Radices dētiū perforatæ.

Vfus foraminis radicis dentiū.

Mēbranula ex vasis in radicē dentiū.

Cur dolores vehētiſſimi ſint quādoque in dētib.

Dentes in matris aluo gigni, licet nō prodeat.

viro quodam nobiliſſimo: modo duobus detractis, aut vno, numerum decreſcere: in aliquibus etiam viginti octo, quod minimum eſt, inueniti ſunt. Licet ego obſeruauerim Nicolaum Ardinghellum Cardinalem, quem honoris cauſa nominō, in ore ſex tantum ſupra viginti dentes habere, neg, tamen vllus deſiderabatur. Præterea animaduertendum eſt dentiū radices omnes eſſe perforatas, quæ foramina deducuntur ad ipſorū cavitates, quas intus habent, exiguas quidem, verū notatu dignas, vt ſcilicet leuiores ſint, & commodius nutrimentum ſumant. Admittunt autem foramina hæc venā, arteriā & neruum, de quibus ſupra dictū eſt. Quæ tria vaſa ad cavitatem illam, uſque ad dentis baſim penetrant, ibi cōplicantur, & ex ſe membranulā quandam gignunt, qua imbibi nōnumquā ſolet materia a cerebro defluente, vnde pariuntur dolores illi ingentiſſimi, qui perſeuerāt, quouſq, humor in mēbranula detinetur, vel purgato cerebro fluxionis cauſa tollatur. Quod autem ad dentiū generationem attinet: ſcito non paucos putare eos tunc gigni, cum ex gingiuis prodeunt, qui manifeſte errant. Nam dentes in ipſo matris utero eſſe formari certo comperi, ſicuti ego perſape oſtendi magna aſtantium admiratione, dum ex demortuorū infantium in matris aluo gingiuis ex ſuis alueolis per exiguos dentes eruerim. Idem in nuper natis, quod in extractis ex utero, atq, etiā in abor-



abortibus septem & octo mensū explorare mihi licuit. Ea autē diligentia rem hanc perquisiui, quod de his pleriq; ne verbū quidem, re nondum illis fortasse cognita, aut perquisita. Puerorum dentes appendices habent, quæ temporis processu, quamquā non omnes laxari, ac vacillare solent: itaq; vel sponte decidunt, vel unguibus, aut filo non difficili negotio eximuntur: quæ autem manent, ut in molaribus frequēter accidit, ita cum dentibus cōmittuntur, atq; coherent, ut in ipsorum partes esse videātur, nec ita facile demi possint. Dempta itaq; appendice cum seruata sit radix: non mirū est, si nō multo post tempore dens denuo crescit, & deperdita appendicis locū occupat. Quamobrē cauendū est, ne cum pueris dentes casu aut aliquo ictu effringūtur, quæ reliqua sit portio, eruatur. Sed accuratissime radix ipsa, quoad eius fieri potest, seruari debet. In ea enim veluti in semine quodam, ipsius dentis regenerādis spes residet; eaq; radicitus euulsa, dentes nō amplius vel rarissime renascuntur. Dentes humani ordinē unicum seruant, et si aliquādo duplex ordo inueniatur: licet raro in hominib. triplex tamen in puero meo Phæbo conspicuus, qui rarus est, quemadmodum & ipse rarus est ordo.

Dentes in utero matris gigni.

Dentes habent appendices quæ decidunt.

Molariunt appendix non decidit frequentet.

Radix dentium in pueris nō eximenda.

Radice dentium euulsa raro emergunt denuo. Phæbus filius habet triplicē ordinem dentium.

Phæbus puer rarus. Gal. nō scripsit quod extet de foraminibus cap.

### De capitis foraminibus. CAP. XI.

DE foraminibus capitis acturi Galeno duce uti non possumus: nam cum in libello de

Ex hoc pos-  
set aliquis  
cōiicere de  
neuorum  
dissectione  
librum non  
esse Gal. Ve-  
sa. scripsit de  
foraminib.  
capitis.

Tractatio  
de forami-  
nibus capi-  
tis quam sit  
vtilis.

Ossa sunt fa-  
cta gratia a-  
liarum par-  
tium.

Ossa sunt  
partes igno-  
biliores.

Ossa cur per-  
forata.

Foraminū  
ossium vsus.  
Prima ner-  
uorum cō-  
iugatio ocu-  
lis deseruit.  
De forami-  
nib. seruiē-  
tibus prime  
cōiugatio-  
ni neruorū.

ossibus tractationem hanc consulto pratermissit: deque huiusmodi foraminibus in libro de nervorum, ac reliquorum vasorum dissectione acturum polliceatur: in libello de nervorū anatome, qui Galeni nomine circumfertur, nihil de his scriptum reperitur. Quamobrem hic foraminum descriptionem cum Vesalio instituemus, ut cum hac ipsa fuerint explicata, faciliorem nobis viam relinquāt ad ea scribenda, quæ tradere opus fuerit de venis scilicet & arteriis, ac nervis per caput ipsum meantibus. Cum igitur natura reliquarum corporis partium gratia ossa cōstruxerit, sicuti primo capite adnotatū fuit: ita illa efformavit, ut non modo illis adhærescere partes aliæ, verum etiam per eadem sine lesione transire possent. Iccirco ossa tamquam infimas nostri corporis partes aliis cedere necesse fuit, alioquin sua duritie multa incommoda allatura, & quod proposito nostro nūc deseruit, vasis trāsmittendis perforata sunt, ac præcipue ossa, quæ vndique foraminibus scatent: per quæ tum nervi a cerebro demittuntur, tum venæ atque arteriæ sursum feruntur ad cerebrum, partesque atias in capite positas: ea primum commemorabimus, quæ septem nervorum cōiugationibus famulantur: quarum coniugationum cum nobilissima illa sit, quæ opticos constituit: non immerito ab eius foraminibus exordiemur. In interna itaque calvaria sede, quæ cerebri est basis, ubi exculpū est

est os cuneale in sella modum iuxta processus ipsi  
 sella supereminentes: ad sunt duo foramina in eo-  
 dem cuneali, dextrum scilicet ac sinistrū rotun-  
 da, & in oculorum sedem tendentia, quæ ad ipso-  
 rū radicē iuxta latus interni anguli penetrant:  
 ibique oculi orbitam introspecienti primo occur-  
 rent. Per hoc foramen a cerebro nervus insignis  
 emanat, & in mediū oculum radicis instar im-  
 plantatur opticus, & visorius appellatus: siqui-  
 dem ad oculum ipsum virtutem visilem defert.  
 Post hæc ad fines dictorum sinus est semicircula-  
 ris perfectū aliquando orbem efficiens, per quem  
 fertur secunda nervorum coniugatio. Atque in-  
 de per magnam rimam, quæ mox describetur, in  
 oculos deducitur ad motū ipsorum musculis lar-  
 giendum. Rima vero hæc ea est, quæ in ima oculi  
 orbita aperte perspicitur: ac versus externi an-  
 guli regionem inferne foraminis rotundi formā  
 imitatur, quod tamen superiore parte effractum  
 in longam, amplamque cavitatem extenditur,  
 ut non solum aditū præbeat secunda nervorum  
 coniugationi, quæ per oculorum musculos disper-  
 gitur ad ciendum motum: sed etiam aliis nervo-  
 rum ramulis, qui a tertia proueniunt, & ad fa-  
 ciem per id foramen exeunt, quod est in superci-  
 liis supra internum oculi angulū. Itemque rima  
 hæc musculis oculorū cedit, qui inde ortum du-  
 cūt, ac demū admittit & venas, & arterias trās-  
 missas ad oculos, oculorūq; musculos exutriēdos,

Sphenoides  
 instar sellæ  
 in basi capi-  
 tis excaua-  
 tum.

Foramē ner-  
 uorū opti-  
 corum.

Opticus ner-  
 uus cur di-  
 catur.

De forami-  
 nibus deser-  
 uientib. se-  
 cundæ con-  
 iugationi  
 nervorum.

Secundacō-  
 iugatio ner-  
 uorū mouet

musculos  
 oculorum.

Rimæ ma-  
 gnæ in ima  
 orbita de-  
 scriptio &  
 vsus.

Ramuli ater-  
 tia cōiuga-  
 tione.

Fora. quod  
 est in super-  
 ciliis, vsus.

Oculorum  
 musculi vn-  
 de ortum  
 ducant.



& fouendos. In hac itidem ampla rima parte inferiore, ubi rotunda est, versus internum angulū latitat foramen, quod caco quasi ductu ad palatum, naresq; tendit, per idq; a cerebro per glandem suscepta pituita naturaliter ad ipsas nares, atq; ad palatū descendit. Et quoniam pituita hac in rimam illam prius decedit, quæ ad oculos pertinet: hinc fortassis via est gignendis lachrymis,

Quomodo  
gignantur  
lachrymæ,

Foramen in  
sphenoide,

Masseteris  
ortus ubi,  
Ramus octauæ  
coniugationis  
ad musculos  
masseteras.

Ramus  
tertiæ coniuga-  
tionis ad fa-  
ciem per o-  
culos,

Foramen a-  
liud in sphe-  
noide,

Ramus ter-  
tiæ coniuga-  
tionis ad  
dentes &  
musculos temp.

Quarta  
coniugatio

cum scilicet fluidus ille humor excernitur in oculos emanans, & ab oculis postmodū in genas delabitur, sub eadem rima in decliuore sphœnoidis regione modico intervallo discernitur foramen in utraque parte, ubi a sella decliuis fit recessus, quod orbiculare est, ac longiusculum, idq; in oculi sedem recta tendere videtur, sed tamen flectitur ad latera, ubi temporalis est musculus, ac masseteris ortus, quādo per hoc foramen ramus octauæ nervorum coniugationis ad hos ipsos musculos trāsit: quem pariter comitatur tertiæ coniugationis ramus, qui ad faciē per oculos parte inferiore fertur, & cum musculis temporum, atque etiam cum massetere permiscetur. In ipsomet sphenoide aliud est foramen, quod ad extremitatē alarum vespertilionis pertinet, pene ouale: per id portio tertiæ nervorum paris ad dentes transmittitur, atq; etiam cum temporali musculo miscetur; per idem foramen, unā cum illa portione quarta nervorum coniugatio cum ad palati tunicā, tum etiā ad superiorem linguæ partem gustus gratia demittitur.

Quarta coniugatio nervorum ad palati tunicam & supremam partem linguæ,

demittitur. Iuxta foramen iam cōmemoratum ad radicem tēporis ossis, quod iugi modo eminere diximus, auricularis labyrinthi efformandi gratia aliud residet maius quidē sed perfractū, atq; inaequale recta deorsum tendens, per quod tertiae neruorum cōiugationis portio permeat, quodque non minus patet iugularis venae ramulo ad partes anteriores repenti. At ubi a superiore foramine paululum versus temporis os recesseris, tibi occurret foraminulū, quod propter sui paruitatem in nonnullis caluariis, vel altera saltem parte deficit, peruiū exiguae arteriola, & venula per crassam meningem disseminanda: verum ubi obitum est ac prorsus deletū, arteriola haec, & venula viam sibi struit per foramen amplū, & inaequale, quod paulo ante descriptum est. Non procul ab amplo illo foramine aliud videre est, interna calvariae parte vix cōspicuum, ac rotundatamen cavitae, oblongaq; in supra dictum foramen desinente notatur, & sub interiore styloidis radice insigniter apparet: obliquum versus anteriora ductum praeseferens, qualis debebat esse soporalis arteriola progressus, cui foramen id natura parauerat. In eodem temporis osse, quia occipitiū versus declinat, foramen inest, quod in superficie oblongum, ac veluti ouale visitur caco ductu in labyrinthū: ac demū ad extremā auris regionē finitur, iccirco cecū appellatū, aditum praestat quinto neruorū pari, facultatē sensificā audi-

Foramē tē-  
tia neruorū  
coniugatio  
portioni &  
iug. antero-  
ris ramo ser-  
uiens.

Foramē pat-  
uum quod  
quandoque  
deletur.

Vide natu-  
rae industri-  
am.

Foramen so-  
poralis arte-  
riae.  
Foramē cœ-  
cum.  
Quinta ner-  
uorū cōiu-  
gatio sensuū  
auditus or-  
gano defer-  
uit.

tus organo suggerenti, sub quo foramine inter os temporis, atq; occipitium abrupta sedes conspicitur, magnum item & inaequale foramen consti-

Sexta cōiugatio ad viscera.

Quintū par neruorū efficit neruos recurrētes.

Nerui reuerfiui formāt vocem.

Iugularis interna vniuersum cerebri enutrit.

Vbi cedat os cranci crassæ meningi.

Septimacōiugatio neruorum per quod foramen feratur.

Septimēcōiugationis neruorum Foraminis in occipite max. vñs.

tuens, per quod deducitur sextū neruorum coniugium, qui ad viscera tendunt, atq; interim recurrētes cognominatos efficiunt, unde formanda vocis virtus pene omnis depromitur. Hoc item foramen interna iugulari venæ famulatur, dum per idē ingressa ad vniuersam cerebri molem enutricandam conscendit, simulq; meningi crassæ insidet gemino sinu euecta: ac deniq; in partem posteriorem delabitur, osse illi plurimum cedente: in eo siquidem profunda est cavitās in hac formam & curuata versus lābdalem occipitis suturam. In occipitis osse prope foramen omnium internorum capitis maximum unū adest, haud amplum oblique ad interiora vergens, per quod defertur septima neruorū coniugatio, quorū partē laryngis, & linguae, partē temporū musculi sibi vendicant. In eodem occipitis osse inest foramen illud, quod paulo ante diximus interna omnia capitis foramina magnitudine superare, cum tamen externa oculorum orbita sit minus capax. quod cum sit sine pari, mediā occipitis regionem occupauit: spinaliq; medulla a cerebro defluenti destinatum fuit. Ex reliquis foraminibus in anterioribus spatiis primum illud est, quod cum vnicum, paruumque sit, neq; admodum penetrās, sinus fortasse potius quam foramen dici debet:

inter



inter os frontis, ac mediū ithmoidis interuallum  
 iacet, quo terminatur, ac pertinacius incumbit  
 tertius dura cerebri mēbrana sinus, de quo alias  
 dicetur. In ithmoide ad utrunq; dicti interualli  
 latus iuxta frontis os assident duo lōgiuscula fo-  
 ramina rimula speciem referentia, qua odoratus  
 organorū terminis opplentur. Caterum ithmoi-  
 des quamplurimis foraminulis in cribri morem  
 effingitur, qua odorumne, an aeris, an superflui-  
 tatum causa facta sint, non est nostri instituti  
 disputare: sed ubi opus fuerit non pratermitte-  
 mus. In osse frontis in regione superciliorum duo  
 foramina utriq; unū, per quod tertia portio ner-  
 uorum cōiugationis ad musculos frontis, & pal-  
 pebrarum disseminatur. Foramina hæc tamen  
 semper sunt orbicularia, sed aliquando sunt me-  
 dia, ac si quis unguis in cerā immitteret, detra-  
 heretque. Media fronte supra nasi summitatē co-  
 nempe spatio, ubi spōgiosum interstitium gemi-  
 na caluaria tabula disūgitur, cavitates reperiū-  
 tur, qua in nares penetrāt, antiquis (ut opinor)  
 prorsus ignoratæ, illæque nunc bina, nunc ternæ:  
 in quibus cum nihil unquam præter membra-  
 nam reppererim, licet aliquando & mucus repe-  
 riatur, aerem tātum per nares attractum deti-  
 neri existimaui, de cuius usu quid sentiamus, ali-  
 bi planum fiet. Os mala, quod tertium diximus,  
 sub regione inferiorum palpebrarum, quatenus  
 in genas dilabitur, foramen habet rotundum

Vfus fora-  
 minis inter  
 os frontis &  
 ithmoidis.  
 Ithmoidis  
 foramina.

Ithmoidis  
 figura.

Tertiæ con-  
 iugationis  
 portio ad  
 musculos  
 frōtis & pal-  
 pebrarum.

Cavitates  
 in fronte a  
 veteribus  
 ignoratæ.  
 In cavitati-  
 bus media  
 frontis plu-  
 rimum aer,  
 solus quan-  
 doque mu-  
 cus reperi-  
 tur.  
 Foramina  
 ossis malæ.

Tertiae cō-  
iugationis  
portio ad  
nasi muscu-  
los & labri.

Vnde humi-  
ditas ad na-  
res & oculos  
descendit.  
Glādula ex-  
cipiens hu-  
miditatē o-  
culorum.  
Gal. error.  
Locus in  
quo egilops  
nascitur.

Cur oculo  
laborante  
afficiatur  
musculus  
temporalis.  
Orbita ocu-  
lorū sedes.

quod ab interna, inferioreq; parte orbitæ oculo-  
rum principium sumit ex rima lōga, profundaq;  
in foramen ipsum desinente e regione primi mo-  
laris dentis, per id transmittitur tertiæ nervorū  
coniugationis portio, quæ ad nasi musculos, & ad  
eos pariter, qui labrum constituunt defertur. In  
oculorum angulo maiore parte inferiore, quæ in-  
ter tertiū & secundū os maxillæ superioris inter-  
cedit, non modicum inest foramen, cui sinū facit  
secundū os, ut illi quodāmodo cedere videatur;  
hinc descendit ad nares humida materia inter-  
nam oculorū partē obsidens, cui excipiendæ præ-  
sto est glandula quædam instar spongiæ ad ipsum  
foramen assidens. Vnde Galenus falso arbitratus  
est, medicamenta oculis apposita, tum in nares,  
tum in palatum defluere, uti supra attigimus, v-  
bi de maxillæ superioris ossibus loqueremur. Hoc  
loco egilops gigni solet, quam lachrymalem fistu-  
lam Latini vocarunt. Verum in exteriori angu-  
lo, qui minor dicitur, parte item inferiore am-  
pla rima sita est, quæ partem ossis temporū, par-  
tem etiam maxillæ superioris perforat, cui adfi-  
gitur temporalis musculus, qui cum maximam  
cum oculo affinitatem habeat, non mirum est, si  
laborante oculo temporalis iste musculus sæpe af-  
ficiatur, quemadmodum crebro experti sumus,  
cum ratione experientiam coniungentes. Faciei  
foraminibus si oculorū sedes, orbitas dictas an-  
numerare libeat, scito illas temporum, frontis,  
maxil-

maxilleque superioris osse conflatas. Inter eas si descenderis, duo reperiens nasi foramina ad palati fines, & ad fauces penetrantia. Iugale etiam os ex duobus veluti ossium processibus potius instar constitutum, magnum foramen, oblongumque efficit, in quo temporalis ipse musculus residet. In anteriore palati regione inter incisorios dentes medium est foramen, per quod vena, arteriaque pertransit: & descendit pituita ad humectandam palati membranam, qua in eo ipso foramine illigatur, non secus quam duram cerebri membranam, paulo supra ethmoidis interstitium foramini modico innecti dixerimus. In extremo palato non procul a postremis dentibus utrinque foramen videre est in eo quinto osse, quod quartum maxilla superioris fecimus. Id autem foramen in geminos, acutosque angulos producit: admittit cum venulam, atque arteriolam, tum vero quartae nervorum coniugationis portionem, qua palati tunica gustandi sensus particeps redditur. Inferior maxilla binis utrinque foraminibus donatur, totidem intus, quot extra: verum interna foramina maiora multo sunt externis, per quae vena, arteria, nervus demittuntur ad singulas dentium radices nutrimentum, vitam sensumque illis adferentes, ut supra Cap. De Dentib. memorauimus. Nervi tamen eiusdem portio extra membrum egreditur, & ad musculos inferioris labii permeat, cui aditum praebent bina illa foramina

Nasi foramina.

Iugale instar pontis.

Temporis musculorum sedes.

Palati foramina.

Qua descendat pituita ad humectandam membranam palati.

Quartae coniugationis portio tunica palati gustandi sensui donat. Foramen maxillae inferioris.

Ad singulas radices dentium fertur vena, arteria & nervus.



Quintę ner-  
uorum cō-  
iugationis  
portio ad  
musculum  
temporalē.

externa iuxta circularia. In capitis basi, in ea tē-  
porum ossis parte, quę cuneiformi proxima est,  
datur geminū foramen, unde quinta nervorum  
coniugationis portio ad temporalem musculum  
transmittitur: ad posteriorem styloidis processus  
radicem, quę os mamillare respicit, foramē in-  
tueberis, per quod vena, & arteria antrum in-  
greditur ad auditus organū nutriendum. Iux-  
ta processum mamillarem partē posteriore ali-  
ud foramen est, aditum venę & arteriolę prę-  
bens, ossa nutriendi gratia. Tam superiori, quam  
inferiori maxilla insunt foramina multa, quę

Alueoli den-  
tium respō-  
dent nume-  
ro radicum.

pręsepiolis alias comparauimus, in quibus den-  
tes fixi sunt, quę non solum dentium numero re-  
spondent, verum etiam pro eorundem radi-  
cum diuersitate variant. Ideo certus eorum nu-  
merus vix assignari potest. Habes insigniora fo-  
ramina capitis: alia vero per quę venula, atque  
arteriola ad internam ossium capacitatem, & ad  
membranam crassam pertranscunt: quoniā ne-  
que firmam sedem habent, neq; ordinem vllum  
obseruāt, minime digna nobis visa sunt, quę de-  
scriberentur: aliquando nonnulla reperies, quę  
a latere ad latus perforant ossa sincipitis.

Quę fora-  
mina neq;  
sedem ne-  
que nume-  
rum seruēt.

Quandoq;  
foramina  
os sincipitis  
penetrant.

Ossium v-  
sus.  
Lingua vocis  
articulande  
pręcipue v-  
tilis.

#### De Osse Hyoide. CAP. XII.

SATIS constare arbitror ob hanc pręcipue  
causam genita fuisse ossa, vt super his muscu-  
li consistere possent. Quamobrem cum in ore  
linguam natura formasset organū apprime ne-  
cessarium

essarium tum voci articulandæ, tum aliis quoque functionibus, opus erat os aliquod parare, in quod ea cōmode infereretur: nam cum sit corpus molle, facile cōcideret, nisi ab aliquo duro, stabilitq; sustineretur. Proinde os conditum est, quod lingua peculiare esset, illiq; vni deseruiret, quādo nō potuit neque in occiput, neque ad dorsum, neque ad latera vtriusque maxilla implantari, quin aut fauces tegeret, impediretque: aut certe magnam suarum utilitatum partem amitteret.

Hyoides id Latini cum Græcis appellant: idque voce contractiore ὑψιλοειδής siquidem dicendum esset, quod ὑψιλον littera formam exprimat: a nonnullis quoque vocatum est λαβδοειδής, sed quoniam ubi coniunctum est, ac sinum facit, non ita acuto angulo terminatur, rectius illud figura quā simile dicemus: quod si quis os istud maxilla inferioris imagini cōparare velit, non male fortasse fecerit, cum non modo in arcum eiusdem maxilla more curuetur, verum etiam in duos, sicuti illa, processus desinat: quanquam hi non omnino eandem cum illis speciem seruent.

Hyoides os ita hac figura fuit a natura excultum, ut quamvis faucibus, ac laryngi præpositum esset, liberum tamen cum inspirationi, tum etiam cibo, potuique transitum relinqueret.

Quocirca medium ipsius ossiculum aliud mains anteriore parte, qua os respicit, connexum est: & in valde obtusum angulum coit: posteriore au-

Hyoides os  
linguæ pec-  
culiare.  
Causa situs  
hyoidis.

Hyoides os  
& hypsilo-  
ides & lab-  
doides idē.  
ὑψιλοειδής  
rectius dici-  
tur os lin-  
guæ quam  
labdoides.  
Ossis hyoi-  
discum ma-  
xillæ infe-  
rioris figu-  
ra collatio.

Curea con-  
tigerit figu-  
ra ossi hyoi-  
di.

Hyoidis os-  
sis descrip-  
tio.

tem, quæ interna magis, & ad fauces vergit, cō-  
cauum, superiore item gibbum, inferiore vero si-  
mum: pars anterior ac superior lingua insertio-  
nē suscipit ex duobus musculis cōstructam, quo-  
rum discrimen exiguum quodam processu termi-  
natur, qui in superiore huius ossis regione ad fle-  
ctionis medium eminet: at posterior inferiorque  
eiusdem ossiculi portio caua, & in sinu adducta  
fuit, ut cederet aperiēti, ac sese attolenti lingu-  
la, quæ tanquā claustrum laryngi supereminet,  
atq; ob id Epiglottis Græce est appellata. ad late-  
rum fines huiusmedij ossiculi duo alia cōmittun-  
tur in duos longiusculos processus diducta, qui ex-  
tremas appendices habent, atque ij cum superio-  
ribus laryngis laterib; suis ligamenti innectun-  
tur, ab horum processu appendicibus enasci so-  
lent musculi, qui lingua motib; deseruiunt, quæ-  
admodum in libro De musculis dicetur. Iam ve-  
ro cum os istud veluti pensile existat, satis firmi-  
tudinis, ac roboris habiturum non erat, si vnā  
tantum quam diximus, in ipsam laryngem in-  
sertionē habuisset. Ideo natura duos alios eidem  
ossi processus addidit: non ita prolixos tamen, ut  
qui iam descripti sunt: iuxta quos hi pariter ex-  
urgunt: at superiore parte, quæ maius ossiculum,  
quod in medio situm est, hinc inde terminatur:  
nam per hos processus os hyoides processui stylum

Epiglottis  
cur ita dici-  
tur.

Musculi lin-  
guā mouē-  
tes vnde o-  
riantur.  
Cur hyoi-  
des habeat  
plures pro-  
cessus.

Quādo hy-  
oides lige-  
tur styloidi.

referenti, qui temporum ossi utrinque affigitur,  
insigni ligamento connectitur, atque ita firmat,

ut in



ut in medio facile consistat, ac neutram in partem distrahatur. Ad hunc itaque modum ex quinque ossibus hyoides constructum habes, quod tamen aliquando priuatum inuenies processibus: tunc vero altero tantum, quorum locum tunc subeunt ligamenta longius a medij ossiculi finibus ad processus styloformes prætensa. Et hac de Hyoide sat sint, quod in libello De ossibus missum facit Galenus, forte eius descriptionem parum necessariam arbitratus. Nihil igitur mirum est, si quidam de hoc ipso nihil meminerit, quem sicuti certo affirmare ausim cuncta, quæ de Anatome scripsit, ex Galeno transtulisse: ita dubito nunquam humanum corpus secuisse, aut aliorum sectionibus minime interfuisse. Galenus tamen de Hyoide lib. XI. De Partium Vsu nonnihil meminit, huius dicta excipiens Oribasius suo de ossibus libello in proprium caput redegit.

De Larynge.

### CAPVT XIII.

SCIO non paucos admiraturos, quod in hoc libro, uti de ossibus duntaxat agere instituimus, laryngis explicationem interferrimus: de qua in tractatu de cartilaginibus ceteri Anatomici meminere, a quibus cartilagineum corpus describi solet. Ego vero cum in his anatomicis nomen meum profitear, qui in nullius placitum iurauerunt, licere mihi arbitror, meam, quacunque fuerit, sententiam

Hyoides et quinque processibus. Sagacitas Naturæ deficientibus processibus hyoidis. Gal. in lib. de ossibus non descriptos hyoides.

Gal. in de V. su Part. meminit de hyoide. Oribasius caput habet de hyoide.

Cur in Tractatu de ossibus tractetur de larynge. Anatomici complures describunt laryngem tanquam corpus cartilagineum.

Larynx hominis senis ossea est.  
Larynx in tenella etate cartilago videtur.

Gal. reprehenditur.

Gal. simias fecuit non homines.

Larynx simiae ossea est.

Vesalius fecabat laryngem bruti non hominis.

Laryngis descriptio.

Larynx ossea est.

Larynx est caput tracheæ.

Laryngis situs.

Laryngis usus.

in medium proferre, ut vobis cum re ipsa licebit cōferre. Cum igitur ex innumeris propemodum sectionibus obseruauerim humanam laryngem in prouectioris ætatis corporibus osseam esse, non cartilagineam: (quanquam a teneris annis cum nondum ad suam duritiem, soliditatemque redacta est, ex cartilaginea substantia constructa esse videatur) non possum non opinari eam magis ex ossea natura, quam ex cartilaginea constare. Hoc igitur in causa fuit, quam obrem in osseum numero laryngē adiudicantes de illa in osseum tractatu agamus. Ut igitur alios nunc omittam anatomicos, ac de Galeno, & Vesalio tantum dicam, ambo sunt accusandi. Galen. quidē primo, quod neglecto humano corpore simias disseccandas curauerit: deinde quod vel in simiis ipsis laryngis substantiam osseam prorsus nō animaduernerit. Vesalius autem, quod cum humanorum corporum sectionem profiteretur, non humanam tamen laryngem, sed bruti secare semper solitus est: idque publicis theatris, quibus ego persæpe interfui. Nos igitur laryngem inter ossa connumerantes, dicimus eam esse asperam arteria caput, quod ad os, atque ad fauces pertingit: in cuius postremam superficiem præcedenti capite diximus, Hyoides os duobus processibus oblongis implantari, atque ita cum larynge ipsa committi. Organum est, per quod spiritum admittimus, ac eundem reddimus, nec non etiam vocis formandæ, quemad-

quemadmodū ex eius descriptione patefiet, quam licet osseam dixerimus, ad eius tamen compositionem concurrunt non ossa tantum, verum etiam cartilagine, ligamenta, muscoli ac membranae: ut interim missas faciā venas, arterias & nervos. Caterum ossa ex quibus larynx præcipue conficitur, quinque sunt; ex quibus duo maxima corpus fere ipsius laryngis cōstituunt. Pars posteriore late disiuncta sunt, anteriore vero testudinis ritu per acutum angulum uniuntur; cuius imaginem scuto, quod fortasse veteres in præliis gestabant, assimilantes, Anatomici scutiformem cartilagine, siue scutalem, siue peltalem, Græce *Superoidiā* vocarunt. Eius posterior pars supra in frag, processus habet, quos ex suis utrinque lateribus singulos educit superioribus processibus, qui inferioribus longiores esse solēt. Præmi committuntur hyoidis processus, ac membranis vinculis inuicem firmantur: Inferiores autem, scutiformis processus posterioribus lateribus eius nempe partis quam reliqui secundā cartilagine in nominatā appellant; nos vero tertium os innominatum facimus: cuius forma circularis est similitudine referens illos Parthorum anulos, quibus pollicem muniunt, ut validius sagittas ei aculentur. nam parte posteriore gulam, seu stomachū spectante latius est, & in acutum pīna modo extenditur. Deinde quo magis ad anteriora pergit, magis extenuatur, donec quam

Quot concurrant ad laryngem componendam.

Ossa laryngis quinque.

Scutalis cartilago ab Anatomicis dicta quæ pars sit laryngis.

Quomodo processus hyoidis & laryngis committantur.

Tertium os innominatū quod alii secundam cartilagine innominatam appellant. Tertiij ossis innominati figura.



Asperitas in  
osse pro in-  
sertione mu-  
sculorum.

Cur tertium  
os circulare.

Quartum &  
quintum os  
laryngis ap-  
pellatur ter-  
tia Cartilago  
ab aliis, &  
cur.

Rima qua  
vox modula-  
tur.

diximus figuram, effingat. Unde quaque teres  
est, nec ullam asperitatem praefert, praeterquam  
quod posterius nonnihil eminet: ut duorum ibi  
existentium muscutorum insertioni subseruiat,  
qui ab hoc tertio osse in quartum, ac quintum re-  
cto ductu feruntur, ut in libro De Musculis do-  
cebimus. Id autem os perfecte circulare natura  
fabricauit, ut esset basis, ac firmamentum laryn-  
gis, nec non etiam quoddam asperae arteriae pro-  
pagnaculum, cuius est initium: nam nisi interna  
parte coalesceret, neque ea duritie praeditum fo-  
ret, periculum immineret, ne deglutiendo re ali-  
qua crassa vel dura, arctius respirationis via co-  
primeretur, unde fieret suffocatio. Undique igitur  
continuum os istud factum est, ut asperam  
arteriam validius tueretur. Quartum, quintum-  
que os laryngis nobis erit, quod alij vnam, ac ter-  
tiam cartilaginem numerarunt: nam si partem  
hanc membranis, quibus obtegitur, liberatam  
sedulo intueberis: & laxari deprehendes, & in  
duo diductam cognosces. Quamobrem visum est  
nobis in duo partem hanc ossa distinguere, quae ab  
apice tertij ossis intro spectantis exurgunt. Huic  
enim tuberculo inarticulantur, atque inde a sua  
basi duas veluti pinnas emittunt, quae ad imam  
scuiiformis regionem parte anteriore copulan-  
tur, ac rimam constituunt modulanda voci quam  
maxime accommodatam: sursum vero in duos  
processus tendunt, qui mutuo dexter cum sinistro

uniun-

uniuntur, & vasis cuiusdam imaginem præ se  
ferunt, quo abluendis manibus aquam affundi-  
mus. Iccirco Græci partem hanc laryngis <sup>ῥύται</sup>  
<sup>var, ἀρὸ τοῦ ῥυεῖν</sup> vocarūt. Hæc duo ossicula in aqua-  
lia sunt, atq; inuicem per ligamentum, ac per  
cartilaginem uniuntur: & superna membra-  
na ibi copiosissime assidentis beneficio molli-  
scala esse videntur, ubi in duos processus desi-  
nunt, quibus scilicet natura veluti lingulis qui-  
busdam uti voluit, non modo ad claudendum  
laryngis amplitudinem, & asperæ arteriæ me-  
atum, ne quid, ex vomitu præsertim, quod ledat,  
in internam illius capacitatem decadat, atq; ad  
pulmones deferatur: sed etiam ut rimam illam  
moderetur variarum vocum efformandarum  
gratia, non secus atq; in fistulis, aut tibiis lingu-  
la quædam imponi solent, ex duabus arundi-  
num laminis compactæ. Propterea istorum pro-  
cessuum id genus lingulam constituentium <sup>ὀνιδ</sup>  
<sup>ἰστωτὶς</sup> nuncupatur. Quod autem ossa hæc sint, <sup>ἴστωτὶς</sup> quid  
quæ hætenus exposuimus, non diu anceps ille  
fuerit, qui eorum ipsorum colorem, duritiem-  
que considerarit, ac præterea medullosam sub-  
stantiam conspexerit, qualem ego sæpenumero  
deprehendi, quo vno potissimum cartilagine  
ab ossibus differunt. Siquidem cartilago om-  
nis ex omnium sententia medulla penitus ca-  
ret. Adhæc succedit cartilago una, propter  
ea illa quoque explicabitur. Hanc <sup>ἐπιγλωττις</sup>

Quid signifi-  
cet ῥύται,  
ῥυεῖν.

Duorum pro-  
cessuum quarti  
& quinti os-  
sis laryngis  
usus.

ἴστωτὶς quid  
vocetur.  
Quomodo  
ossa esse non  
cartilagine  
quæ laryngē  
constituunt,  
cognoscas.

Differentia  
præcipua os-  
sis & carti-  
laginis.

ἐπιγλωττις  
quid significet.  
Epiglottidis  
vius.

Epiglottidis  
figura.

Cur de mem-  
bris & mu-  
sculis laryn-  
gis nunc non  
doceatur.

ἡ δὲ Græci vocant, quod lingula modo enarrata  
superemineat, atq; operculi vicem gerat, ne quid  
cibi potusve in laryngem defluat, nec non etiam  
vicissim clauditur, ac referatur ob mutuam in-  
spirationis, & expirationis operam. Hæc modice  
curuati scuticuli formam imitatur; superiore  
parte ampla est, ac sensim arctatur in mucro-  
nem desinens, quo anteriori ac superiori scuti-  
formis parti, unde ortum habet, inseri videtur.  
Reliquum esset, ut describerem, quibus mem-  
bris, & quomodo larynx intus, forisq; inue-  
stiat: ac præterea quot, quivæ sint muscoli mo-  
tum hisce ossibus largientes: verum ne doctrinæ  
ordo inturbetur, congrue magis alibi hæc  
declarabuntur.

## De Dorsō in vniuersum.

## CAPVT XIII.

Dorsī structu-  
ra admiratu  
digna.

Vertebrarum  
compositio  
instar carinæ.

Dorsum dat  
robur corpo-  
ri.

**N**IL in vniuersi corporis humani fabri-  
ca, quo ad ossa pertinet, magis quam dorsī  
contextus admirabilis parentis nostræ industri-  
am attestatur, in quo vix satis mirari possumus  
quam incredibili usæ sit artificio, ubi tot ver-  
tebrarum situm, varietatem, ordinemq; intue-  
mur, quarum compositio instar carinæ cuiusdam  
esse videtur. Etenim si oculos in nascentis na-  
uis exordium conieceris, facillime percipies, cum  
navis fundo recte dorsum comparari posse, ad  
quod ipsæ costæ veluti curuatae trabes affixæ ad-  
hærescant:



hærescant: atq; ita corpus efficiant: quo fit, vt dorso corporis ipsius stabilimentum, & robur non immerito tribuatur. Dorsum autem totam regionem interim nobis significet, quæ a basi occipitis vsq; ad extremum coccygem pertingit, quæque triginta quatuor vertebris perficitur. Vertebrae vero siue spondyli nobis erunt ossa quædam egregia, formæ varietate distincta, ex quibus tamquam partibus dorsum conflatur, quem admodum infra plenius demonstrabitur. Dorsi beneficio præsertim humani (hoc enim dumtaxat describendum suscepimus) recti stare, rectiq; ambulare possumus, qui legitimus est hominis motus; ac præterea ante, retro, ad latera, & in gyrum quoquo modo flectere corpus valemus.

Quamobrem ex vnico, integroq; osse constare minime debet: quamuis enim ita promptius dorsalem medullâ ab externis iniuriis vindicasset: homo alioqui diuinum animal quoddâ velut lapideum, ligneumve animal, neq; sese erigere, inclinareq; potuisset, neq; tam varios motus edere, qui ad multos vitæ vsus maxime sunt necessarii. Iam vero minus debuit ex paucioribus, vt quatuor, aut quinq; ossibus constare. Nam licet motus idem fierent, difficilius tamen fierent, ac deinde dorso luxando occasio præberetur, id quod citra vitæ periculum vix vnumquam euenire posset: quod luxationis genus animaduertens diuinus Hippocrates lib. de Articulis inquit: Si

Dorsi significatio.

Dorsum 34. vertebris. Vertebra quid.

Dorsum hominis describitur. Dorsi vsus.

Ambulatio est legitimus motus homini.

Cur dorsum constet ex pluribus ossibus,

Cur dorsum ex paucioribus ossibus non constet. Dorsi vertebrarum luxatio quam per timiscenda. Hippocratis locus lib. de Art.

plures vertebrae, quae ordine se consequerentur luxari contingat graue quidem: sin vero unam, exilire, & a reliquarum compage dimoueri, perniciosum fore. neque id iniuria. Nam si una vertebra luxetur, spinalem medullam ita secum diuellit, ut in acutum pene angulum illam cogat. Itcirco vel frangatur ipsa, vel comminatur necesse est, id quod lethale est: siquidem medulla hac cerebri natura praeitata est, sin autem plures vertebrae simul luxentur, in angulum obtusum, vel magis in semicirculum diduci eandem oportet, ex qua distractione patitur quidem, verum non adeo, ut mors necessario consequatur. Ergo ex pluribus ossibus veluti crebris, breuibusque intermediis constructum est dorsum: ut, quoad eius fieri posset, immune redderetur ab eiusmodi luxatione: nec non etiam ut vertebrarum corpora sic affabre facta in quemcumque motum procliuia forent. At haec vertebra spinalem medullam, quam intus habent, mirum in modum tuentur. hinc non spinam modo tot processibus conspicuam habuere, qui mediam dorsi regionem extrinsecus occupant, quod praecipuum est medullae propugnaculum, unde a potissima dorsi parte totum Graeci ἀνὰ δὲ, hoc est, spinam vocarunt: verum etiam ex lateribus hinc inde processus alios producant promptioris maiorisq. tutamen gratia, quos interim tamen musculorum implantationibus subseruire natura voluit:

qua

Luxata una  
vertebra spi-  
nalis medul-  
lae redigitur  
in acutum an-  
gulum.  
Spinalis me-  
dulla sapientia  
naturam cere-  
bri.

Pluribus ver-  
tebris luxatis  
spinalis me-  
dulla redigi-  
tur in semi-  
circulum.

Cur dorsum  
constat ex tot  
vertebris,

Vertebrae tu-  
entur medul-

Spinæ situs  
& causa.

Cur spina ita  
dicta.

Cur vertebrae  
dorsi habent  
processus in  
spina & late-  
ribus.

quæ aque sollicita fuit de spinali medulla, ac de cerebro muniendo. quoniam huic ex cerebri substantia producta, & oblongo tanquam cerebro, gignendi erant nerui. In medijs vertebriis foramen extat, in quo dorsalis medulla sedet. ipsæ vertebrae quo magis a ceruice recedunt, eo magis augescunt, & processus longiores, ac robustiores habent: sustinent enim superiores. Quæ igitur in imo posita sunt, aliarum maxima corpore constiterunt: ut vniuerso oneri ferendo sufficerent. Nam rationi consentaneum est, ut quod gerit, re lata maius existat. Præterea vertebrarum, processuumque magnitudo conferre plurimum videtur ad tuenda maxima vasa, venam scilicet concavam, arteriamque magnam, quæ sub earegione resident. Dorsum quinque in partes diuiditur: in ceruicem, collumve, thoracem, lumbos, sacrum os, & coccygem. Quinque hæc suis vertebriis constituuntur, quæ in vniuersum triginta quatuor numerantur. Nam collo septem tribuuntur, thoraci duodecim, quinque lumbis, sex sacro ossi, postrema quatuor coccygi. Cæterum ex his viginti quatuor iure optimo vertebrae nuncupantur: quippe quarum munere corpus in varias partes vertatur, & hæc ad sacrum terminantur. quæ autem ad os sacrum cum coccyge attinent, potius à similitudine, quam cum superioribus aliqua ex parte obtinent, quæ quod vertebrarum munere fungantur, vertebrae sunt

Processus laterales vertebrarum musculis etiam seruiunt.

Natura est sollicita de spinali medulla & de cerebro & cur.

Spinæ medulla est cerebri productum.

Locus medullæ spinalis.

Cur vertebrae inferiores habeant corpora maxima.

Vertebrae corpora & processibus magnæ melius tumentur venæ cavæ & arteriæ magnæ.

Dorsi diuisio.

Colli vertebrae 7.

Thoracis vertebrae 12.

Lumborum vertebrae 5.

Ossis sacri vertebrae 6.

Coccygis vertebrae 4.

Vertebrae propriae quæ & quot.



Differentia  
vertebrarum  
ab iis quæ per  
similitudine  
ita dicuntur.

appellata, quæ pariter alio articulationis genere a superioribus inuicem componuntur, illa namque Artbrodia articulantur, hæ vero postrema per Symphysim uniuntur. Sed clarius hac in priuata singularum tractatione sequentur quatuor capitibus.

De vertebrais ceruicis, & capitis motibus.

C A P V T X V.

Quæstiones  
quas omittit  
dedita opera.

**A**C primum ab illis vertebrais supremis dorsis exordientes illud disputare omitemus, cur omnibus animalibus ceruix non conueniat: Et an illam pulmonum, vocisve gratia natura finxerit, quando hæc, atq; id genus problemata ex Aristotelis, aliorumq; rationibus abunde discussa sunt. Quod autem ceruix ex vertebrais constare debuerit: rei natura nobis apertissime demonstrat. nam cum emanet a cerebro spinalis medulla in vertebraisq; contineatur, capiti vertebrais contiguas esse oportuit, totum id spatij occupantes, quod a capite ad summum thoracem interest, colli siue ceruicis nomine donatum. Caterum hæc vertebra septem numero sunt, non solum a cæteris, verumetiam a se inuicem differentes: prima namq; a secunda, & hæc rursus a subsequenter diuersa sunt. At quatuor a secunda ad septimam vsq; sibi similes in figura conspiciuntur, verum septima ab omnibus distincta est, sicuti ex singularum descriptione patet. Ceruix autem non modo hunc

Cur ceruix  
constet ex  
vertebrais.

Septem ver-  
tebrae colli  
seipsis diffe-  
runt & quo-  
modo.

Ceruicis v-  
sus.

usum

usum præstat, ut caput fulciat, sed etiam ut eius motibus potissimum conferat. Quamobrem operæ pretiū est cognoscere, quinam sint capitis motus, quog<sup>3</sup> illi ipsi modo fiant. Nam quod Galenus de us scripsit, prorsus a veritate alienū existimatur, quemadmodum summus Anatomicus Vesalius longe hac in parte Galeno diligentior, ex rei natura deprehendit: neq<sup>3</sup> vero Galeni error librariorum incuriæ, aut inscitia ascribi potest, cum pluribus in locis idem repetat, ut in XII. de Part. Vsu. in lib. De ossibus, & IIII. de Aggressibus Anatomicis, quos mira diligentia se conscripsisse profitetur. Cum itaq<sup>3</sup> caput pluribus motibus moueatur: cum illud Galeno teste XII. de Vsu. Part. nullo motu careat, scire oportet illud partim suos ac proprios motus edere, partim ad alienos motus consequi. Peculiares capitis motus duos esse non semel eodē lib. Gal. asseruit; vnum, cum caput ante retroq<sup>3</sup> flectitur annuendo reuendog<sup>3</sup>; alterū cum ad latera circumducitur, hosq<sup>3</sup> fieri manente ceruice: cum autem caput valde in prouum ac supinum demittitur, atque etiam ad humeros vehementer adducitur, tales motus non sunt ipsius capitis proprij, siquidem cum tota ceruice fiunt, neque vllō modo ea quiescere cieri possunt; & ceruix moueri nequit, quin simul etiam caput ipsum mouetur, nimirum qui est proprius ceruicis motus, hunc pariter capitis communem iudicamus. Iam vero proprios

Gal. errauit in capitis motibus.

Ves. in describendis capitis motibus Gal. diligentior.

Gal. errores de capitis motibus nō possunt excusari.

Gal. est sibi similis in doctrina de motibus capitis, libro de Vsu Part. de oss. & quarto de Anat. Aggref.

De motibus capitis.

Gal. 12. de Vsu Part.

Diuisio motuū capitis.

Proprij motus capitis qui.

Quod motus Gal. fiant manente ceruice.

Motus capitis & ceruicis communis.

Quomodo motus ceruicis proprius fiat capiti communis.

Motus proprii capitis  
fiunt super  
prima, & se-  
cunda verte-  
bra.  
Prima & se-  
cunda verte-  
bra cap. alli-  
gantur.  
Cur occiput  
in pueris sit  
ex pluribus  
ossibus.

Caput cerui-  
ci firmissime  
iungitur.

Articulatio  
occipitis cū  
primis dua-  
bus vertebri-  
s colli quomo-  
do habeat.

Gal. error.

Quæ circum-  
aguntur axi  
iunguntur.

motus super primam, secundamque vertebram tantum fieri certum est, cum hæc duæ cum capite potissimum colligentur. Ab occipitio enim multis partibus ligamenta fluunt. Propterea destitutum est in rimas ab initio, adeo ut puerorum occiput ex pluribus ossibus constructum sit, quæ postmodum at ætatis processu ita coalescunt, ut ne ulla quidem diuisionis nota appareat; atque ideo unicum ab omnibus censeatur. His ligamenti undique annectuntur occipitio primæ duæ vertebrae, ne caput huc atque illuc temere delabi possit, quo sit, ut firmissime cū ceruice cohæreat. At suos ut motus commodius efficere queat, pereleganti artificio cum primis duabus vertebri occiput articulatum fuit, quæ articulatio ad hunc habet modum. Ad eam occipitij partē, ubi amplum est foramen, per quod in dorsum spinalis medulla descendit, anteriora versus duo assident prominentes, & in longum ducti processus, utrinque, videlicet unus qui primæ vertebrae sinus subeunt, quos in superiore sui parte ascenditum processum media sede excultos cernimus. Huius articulationis ope Galenus falso putauit caput in gyrum verti posse. Nam huic sententiæ aduersatur eiusdem articulationis forma, quando quidem illa, quæ verti, ac circumagi debent, rei vni veluti axi inniti solet, non autem duabus oppositis partibus insigi. Nā si caput moueretur, ut cœsui Galenus, circumduci non posset, nisi alteruter process-



processus semper e sua sede exiliret: unde luxari caput perpetuo necessum esset, quod nunquam sine vitæ dispendio accidit. Ergo solum ex hac articulatione colligere possumus eū motū, quo caput modo inclinatur, modo reclinatur. Circumducitur autē ad latus altera articulatione, quæ in secunda vertebra cū prima cōpositione miro modo celebratur. Exurgit enim e medio corpore vertebra secūda processus quidā rotūdus, ac longus crassitie mediocri, quē non inuenuste Græci *ὀδοντοειδὴς* & *ὀδὼν*, nuncuparunt, quoniā caninū hominis dentem quodāmodo referat. Propterea Hippocrates huius patris gratia totum secundam vertebrā dentē nominauit, quod perperā intelligens quidā processum posteriorē huius dentis loco accipit. Huiusmodi itaque dens primæ vertebra sinu suscipitur, qui eo exculptus est loco, qui vertebra corpori destinatus fuisset: nisi eius ipsius sinus gratia corpore priuatum iri oportuisset. Quo itidem loco teres, ac solidum hinc atque hinc ligamentum ducitur, dentem adeo claudens, ut ne ibi dorsalem medullam appositam conuulneret, aut certe comprimat, & tamen laxam articulationem illam relinquat, cuius beneficio circumagi vertebra superior possit, inquam infixum, ac persistens eo quo diximus modo caput simul ad latera circumuertatur. Qua in re Galenus quoque reprehensione non vacat: quippe qui non animaduertit eiusmodi esse hanc articulationem,

Caput sine vitæ discrimine non luxatur.  
Caput inclinatur & reclinatur ope articulationis eius cum prima vertebra. caput circumducitur articulatione secundæ vertebrae cum prima.

Quid sit processus odon-  
toides.  
Cur Hippocrates vocat secundam vertebram dentem,  
Error cuiusdam.  
Describitur articulatio secundæ vertebrae cum prima.  
Ligamentum processus dentis dicitur.

Gal. error.

Valuarū car-  
dinibus arti-  
culationem  
comparat.  
Epilogus.

Primæ verte-  
bræ cum aliis  
comparatio.

Vertebra di-  
uiditur in cor-  
pus & pro-  
cessus.  
Corpus in  
vertebra  
quid.

Processus in  
vertebra  
quid.

Primæ verte-  
bræ antero-  
ris figura.

Tuberis pri-  
mæ vertebræ  
usus.

Sinus primæ  
vertebræ  
usus.

quarum in valuarum, ostiorumq; cardinibus  
intuemur, quibus ostia ipsa, valuaq; sustentur,  
& tamen non sursum, neq; deorsum mouentur,  
sed solummodo circumaguntur. Ex his iam tan-  
dem constare puto qui sint proprii, qui ve com-  
munes capitis motus, & quomodo cum hi, tum  
illi fiant: quanquam ad hos sciendos necessaria sit  
vertebrarum cum capite coniunctio: ac demum  
veritatis cultoribus cum Galeno errandi occa-  
sionem sustulimus: nunc reliquum est, ut ad ver-  
tebrarum colli descriptionem redeamus. Prima  
cervicis vertebra aliis quidem tenuior, verum  
densior, ac solidior existit corpore: processus su-  
periore caret. Etenim sciendum est vertebra  
in corpus, ac processus multiunges diuidi solere,  
corporis nomine partem magnam, ac veluti cor-  
pulentam intelligimus. reliquum vero, quod a  
corpore superat, partim foramen dorsali medul-  
la paratum constituit: partim in processus absum-  
mitur. Processus autem cum dicimus, eas verte-  
bræ partes intelligimus, quæ ex iis qualibet sede  
protuberant. Parte igitur anteriore primæ ver-  
tebræ, ubi corpus esse debuit, adest portio quædā  
pertenuis, quæ intrinsecus, quæ respicit foramen,  
per quod spinalis medulla pertransit, in sinū ex-  
cauatur; extrinsecus vero in œsophagū pertinens  
tuber quoddā emittit, quo tanto crassior firmior-  
que redditur, quanto ob posteriorem dictam caui-  
tatem gracilior, ac imbecillior facta fuerat. Hoc

sinu

sinu (sicuti paulo supra dictum est) dentem a secunda vertebra corpore productum excipit, cui crusta modo cartilago innititur, cuius beneficio & lubrica magis in edendo motu fit articulatio, & cauetur ne nimio motu atteratur ossa, id quod in omnibus aliis vertebrarum articulationibus obseruatum cernimus. Præterea operæ precium est, ut diligenter annotes ascendentes, ac descendentes processus, quibus æque omnes vertebrae donatae sunt. Nam in aliis altera tantum parte sinus habentur, quemadmodum suo loco dicam. In prima vero utrinque sunt excauati: ut superne quidem admittant occipitij processus, inferne autem superiores secundae vertebrae, unde colligere potest primam vertebram nullam ex parte suscipi: sed utrinque, tam superiorum, quam inferiorum osium insertionem suscipere. Item e lateribus eiusdem primae vertebrae versus anteriora erumpunt duo alij processus prælongi, ac perforati, qui & maiores sunt, quam in cæteris vertebris, & foramen quoque maius habent, per quod vena, arteriaque transeunt ad caluariam, & ex se propagines aliquas ad medullam dorsalem transmittunt. Ad processus superiores & inferiores, quos ascendentes & descendentes nominauimus: versus posteriora, si primam spectes, sin autem reliquas, anteriora versus sinus utrobique singuli iacent: quibus effingendis non modo vertebrae os, quod ambit foramen dorsali medulla paratum, sed postre-

Cartilaginis in primæ vertebrae articulo cum secunda visus.

Obseruatio in omnibus vertebrarum articulationibus. Omnes vertebrae habent processus ascendentes & descendentes.

Cur primæ vertebrae processus sint utrinque excauati.

Prima vertebra utrinque suscipit non suscipitur. Processus laterales primæ vertebrae quales.

Foraminis processuum lateralium visus.

Processus superior & ascendens idem, & processus inferior & descendens.



Vertebrae pene omnes dorsi incisae sunt ubi committuntur. Sinus inter primam & secundam vertebra ab aliis differentia. Thoracis vertebrarum ubi committuntur sinus qualis. Sinuum vertebrarum ubi committitur, usus.

Congiugia nervorum tot sunt quot vertebrae.

Primi nervorum coniugij & vertebrae ortus.

Secundi coniugij nervorum ortus.

Vena & arteriae ortus in finibus nervorum coniugij communibus.

Secunda vertebrae descriptio.

Dentoritur in secunda vertebra ex corpore ipsius.

Dentis superficies curaspe-  
ra & acuta.

Tuberculi asperi in secunda vertebra  
usus.

ma quoque processuum portio cessit: id quod commune est omnibus fere dorsi vertebrae, quas incisae esse comperies, ubi inuicem committuntur, ita ut tam superioris, quam inferioris vertebra substantia participant. Hi sinus in prima & secunda vertebra oblongae rimae speciem servant; in reliquis orbiculari sunt figura, praeterquam in Thoracis vertebrae, ubi in longum excavantur. Per hos sinus effluunt nervorum coniugia numero distincta, quemadmodum & ipsae vertebrae distinguuntur. Quamobrem e sinibus superioribus prima vertebrae producit primum nervorum coniugium: ab inferioribus autem, qui nihilominus sunt secunda vertebrae communes, exeunt secunda coniugationis nervi, ex aliis vero alia paria pro vertebrarum situ, ac numero. Hi vero sinus, quos diximus, non modo nervis, verum etiam venarum atque arteriarum ramis aditum praebet: unde nutrimentum tam dorsali medulla, quam vertebrarum ossibus suppeditetur. Secunda vertebra praeter ceteras dotes; quae prima tribuuntur, & corpus, & processum posteriore habet. Ex summo corpore dentem illum promit, de quo satis supra dictum est, cuius superficiei asperam quoquomodo, acutamque natura construxit, ut inde commodius vinculum prodiret, quo occipiti alligaretur ea parte, quae ab utroque occipitij processu memorato aequae distat, ubi adnatum est exiguum asperumque tuberculum, cui tenacius adherescat,

scat. Processu item posteriore insignita est, ut inde nasci possint musculi duo in occiput inserendi, quibus musculis sursum petentibus nequicquam posterior primæ vertebrae processus officeret, illum prorsus natura ademptum voluit: posterior autem secundæ processus in extremitate scinditur, ac ut ita dicam, bifurcatur: ut commodiorem musculorum nexū efficeret, quam bifurcationem in reliquis etiam colli vertebris observabis. Hæc Galenus ignoravit suis delusus simis in quibus integri sunt: & si postrema nonnuncquam illum integrū, nec bifidum gerat. Præterea secunda vertebra laterales processus longe breviores obtinuit, quam prima, in quibus peculiare illud est, quod foramen oblique, non autem recte ut in aliis exculptum est. Dantur item huic & ascendentes, & descendentes processus: sed ascendentes leuiter extuberant, ideo in humiles inferiorum primæ vertebrae processum sinus immittuntur, ac descendentes exilibus pariter sinibus præditi sunt, ut sequentium processuum insertionem admittant. Iuxta hos processus adstant illi sinus, siue illa foramina, de quibus antea dictum est, quæ transmittitur secundum nervorum coniugium a spinali medulla descendētium. Iam vero scire oportet cernicis vertebrarum corpora, prima tamen excepta, quam corpore destitutam esse diximus, in longum aliquo modo extendi, ac partem anteriorem planam exigere: cum illi

Cur secundæ vertebra habet processū posteriorem.

Cur prima vertebra careat processu posteriore. Cur posterior processus secundæ vertebrae sit bifidus.

Processus posteriores vertebræ. Colli omnes sunt bifurcati contra Galen.

Processus laterales secundæ vert. sunt breviores & foramine obliquo.

Processus ascendentes. Processus descendentes.

Sinus per quos exeunt nervi, vena & arteria sunt iuxta processum.

Corpora vertebrarū colli qualia.

Cur anteriora corpora vertebræ colli sunt plana.

Œsophagus  
definit in ven-  
triculum.

Aspera arte-  
ria tendit ad  
pulmones.

Committun-  
tur corpora  
vertebrarum  
colli pene vt  
ossa tempo-  
rum.

Prima verte-  
bra caret ap-  
pendice.

Omnes vert.  
colli præter  
primam habent  
appendices.

Cartilago  
crassa & mol-  
lis cur sit in-  
ter appendi-  
ces vertebra-  
rum.

Cur proces-  
sus laterales  
vertebrarum  
colli post se-  
cundum sunt  
bifidi.

Septima ver-  
tebra colli  
qualis.

Posterior pro-  
cessus septi-  
mæ vertebrae  
non est sem-  
per bifidus.

Cur plana sit  
inferior pars  
posterioris  
processus se-  
ptimæ verte-  
brae.

Thoracis ver-  
tebrae 12.

substratus sit Œsophagus in ventriculū desinens,  
ac simul asidet aspera arteria ad pulmonēs ten-  
dens. Harum itaq; committendis corporibus a-  
liam a ceteris rationē natura excogitauit: nam  
precedentis pars inferior declinē sensim excidi-  
tur, superior vero sequentis modice quoq; decli-  
uis est, vt portio illius portionem excipiat modo  
haud absimili a temporū ossium cōmissura. Colli  
vertebrarum corpora prima tamen excepta, ap-  
pendicibus vtrinq; decorantur: inter quæ locum  
habent cartilaginee crassæ ac molles, vt flectendi  
munere in quamcunq; partem liberius fungan-  
tur. Ceterum vertebrae, quæ secunda succedunt,  
propriū id habent, quod earum laterales pro-  
cessus bifidi sunt, quod ob musculorum implan-  
tationē factum fuit, vt etiam in posteriore pro-  
cessu supra adnotatū est. Septima vertebra, cum  
finitima sit thoracis vertebrae, non nihil est ea-  
rū naturæ particeps: itaq; a superioribus distin-  
guitur. Aliquando enim illius posterior processus  
integer est, non bifidus. Præterea inferior huius  
corporis pars, quæ spectat primam thoracis ver-  
tebram, non oblique, nec declinē extenditur, sed  
plana est aliquantulum: quò sequentis corporis  
parti aequaliter cohereat.

#### De Vertebrae Thoracis. CAP. XVI.

THORACI deseruiētes vertebrae duo-  
decim numero sunt, quibus singulis binæ  
costæ articulantur, ita vt numero sint viginti-  
quatuor.



quatuor. Tamen si quandoq. superesse una, quandoq. deesse inueniatur: rarissimum quidē utrunque est, verum rarius multo est, ut desit. Variāt haec a cervicis vertebrais: si quidem maiore sunt corpore, quāquam ab illis densitate, ac soliditate substantia superantur: & profecto maius corpus sortiri debebāt, quando maiores non esse non poterant superioribus sustinendis addicta: verū obseruabis ea, quo magis mole augentur, eo rariore, ac fungosiore substantia praedita esse, ac praeterea foraminibus quamlibet exiguis referta, vasorum nutrimentum deferentium excipiendorum gratia. At corpora haec, praeterquam quod & rariora, & fungosiora sunt: figura & situ a cervicis vertebrarum corporibus non parum discrepant. Etenim minime lata sunt, nec depressa, qualia illa esse dicebamus: sed in medio protuberant, & in rotundum adducuntur: praeter duas primas, quae ob colli vicinitatē quoquo modo corpore sunt depresso, ac lato. Horum itidem corpora supra infraque plana existunt, & multam cartilaginem interiectam possident. In eo praeterea ab iisdem cervicis vertebrais diuersa sunt; quoniam posteriores processus nec bifidos, nec rursus lateros, atque in extremitate rotundos gerunt: sed oblongos, & acutos quadrangularis pyramidis ritu, ac deorsum declinēs, neque transuersis sunt processibus bifurcatis, sed longis & magnis, nec non in rotundum, & crassiusculum

Costae quādoque 24.  
Costae quandoq. etiam 23. vel. 25.  
Rarius est vt ex costis vna desit quam super sit.  
Differentia vertebrarū thoracis a vertebrais colli.  
Cur corpus vertebrarū thoracis sit maius corpore vert. colli.  
Corpora vertebrarū quanto maiora eo fungosiora.  
Forā. in corpore vert. v. sus.  
Figura corporum vertebrarum thoracis lata.  
Plana.  
Processus vertebrarū thoracis quales.

caput desinentibus, qui primo exortu sursum feruntur; inde vero flectuntur deorsum tendentes, parteque interna excavati costarum tuberculis commodam articulationem præbent, quæ cavitates in tribus primis inferiorem regionem, in tribus autem postremis superiorem occupant, adeo ut illa deorsum, hæ vero sursum respicere videantur: at quatuor mediæ medio se habent.

Thoracis ver. tres: primæ deorsum, tres posteriores suis respiciunt, mediæ medio modo. Caterum transversæ undecimæ, ac duodecimæ processus non sunt eiusmodi: namque istas costas veluti breviores atque intumescitibus intestinis plerumque cessuras, tam valide alligari minus expediebat. Quamobrem unica illa, & mediocri articulatione vertebrarum corporibus dumtaxat committuntur. Reliquæ omnes validissimis ligamentis nectuntur: atque ut firmior sit huiusmodi nexus, ad latera corporum vertebrarum sinus ad sunt costarum capitula excipientes, qui tamen non in omnibus eundem servant situm. Nam præter primam, undecimam, ac duodecimam sinus isti communes sunt, siquidem ad corporum extremitates, quæ vertebra mutuo uniuntur, iacent iuxta foramina transmittendis nervis parata: sed prima, undecima, & duodecima hos sinus in suis ipsarum corporibus exculptos habent, quos omnes cartilaginea crusta obritos liceat animadvertere. Iam vero thoracis vertebra aliis quoque nominibus inuicem distinguuntur. Etenim posteriorio-

Processus transversæ undecimæ & duodecimæ ver. quales.

Costæ nonnihil cedunt quandoque intestinis tummentibus.

Quomodo vertebræ costis validissime alligantur.

Prima vertebra undecima & 12 quales sinus habeant.

steriores processus, qui spinam constituunt, neque ita longi, neque acuti in tribus postremis conspiciuntur: sed lati quodammodo sunt, & in extremitate in orbem circumscripti, nec absimiles vertebrarum lumborum processibus in eadem serie constitutis, ubi adnotare operae precium est, posteriorem duodecima processum omnium breuissimum, & minus aliis deorsum spectantem.

Hic non est pratermittendum, quod quia nos cum recte sentientibus duodecima tribuimus, ea Galenus decima ascribit: verum illi canes & simia imposuere, in quibus decima est dorsi vertebrarum medium ac veluti punctus & axis quidam quo omnino quiescente cetera hinc inde moueantur. quod in duodecima hominis verum deprehendes, quae parem articulationis speciem ab utraque parte est consecuta: infra namque supraque processus mediae extuberantes habet, ut utrinque suscipiatur, contra quam prima cervicalis vertebra usu venit, quam utrinque suscipere capite superiore demonstraui. Quod si quis huius articulationis varietatis diligentius rationem requirat, animaduertere oportet eandem motus rationem in superioribus vertebris ad duodecimam usque seruari: inde vero a subsequentibus nempe lumborum vertebris contrariam. Quocirca contrarius quoque in illarum superioribus, inferioribusque processibus articulationis modus reperitur, & forte praecedentium

Processus  
posteriores  
vertebrarū  
thoracis  
quales:

Decima vertebra in cane & simia est medium vertebrarū dorsi, sed in homine 12. Gal. error. Duodecima vert. v. fus & figura.

Duodecima vert. v. tringue suscipitur. prima verte. v. tring. suscipit.

Cur non sit eadem in omnibus thoracis vertebris articulationio.



Dorsū quo-  
modo in an-  
teriora fle-  
ctatur.

Qua ope  
dorsum ad  
posteriora  
curuetur.  
Vertebrae  
thoracis ha-  
bent quin-  
que proces-  
sus & quos.

*articulatio aptissima est ad dorsum in anteriora  
flectendum: cum vero illud ipsum ad posteriora  
totopene corpore curuatur, id muneris tunc lum-  
borum vertebrae praestiterint. Thoracis verte-  
brae illud postremo commune habent, in quo a su-  
perioribus maxime differunt, quod quinque appen-  
dicibus sunt donatae, binis ad ipsorum corpora su-  
pra infraque, totidem ad transversos processus, ac  
demum singulis ad extremitatem spinæ.*

### De lumborum vertebribus.

#### CAPVT XVII.

Vertebrae  
lumborum  
Substantia  
vertebrarum  
lumborum  
qualis.  
Processus  
superiores  
& inferiores  
quales.  
Cur verte-  
brae lumbo-  
rum com-  
mittantur  
diuerso mo-  
do.  
Processus  
transuersi.  
Prima &  
quinta ver-  
tebra.

**E**X iis, quæ supra de colli, ac thoracis verte-  
bris dicta sunt, non pauca eliciuntur, quæ ad  
vertebrarum lumborum explicationem attinent,  
quæ repetere nullo pacto est opus. Lumborum igitur  
vertebrae quinque numero sunt, atque hæc superio-  
rum omnium maxima: verum substantia rari-  
ssima, & foraminibus crebris peruiæ constant.  
Harum superiores processus sinus specie referunt,  
inferiores autem in hos immittendi paululum e-  
minent, atque ita sua & ipsi cartilagine tecti com-  
mittuntur, contra quàm in superioribus fiat: quo-  
niam hæc articulatio oppositam motus rationem  
praestat. Transuersi processus longiores multo his,  
quam thoracis vertebribus, attamen tenuiores, atque  
inter se dispares. Prima enim & quinta lumbo-  
rum vertebrae breuioribus illos habent, quam  
mediae: qui a se inuicem præterea disident, quo-  
niam

niā superiores deorsum, inferiores sursum, unus vero, quæ media est transuersi processus, nec sursum, nec deorsum vergunt: quicquid de his senserit Vesalius. Tales autem processus costularum vicem quodammodo gerunt peculiare maximis vasis propugnaculum allaturi. Non enim eo loco iustæ magnitudinis costæ produci potuere: siquidem non conducebat eam intestinorum regionem ossium mole, ac duritie comprimi, quam ad immodicam extensionem nonnumquam deuenire oportet, præsertim in fæminis, quādo uterum gestant. Cui rei natura consuluit accuratius: cum duas postremas costas, & breuissimas efformarit, & sensim a pectoris osse abduxerit: satis fore existimans si transuersos lumborum vertebrarum processus tantum porrigeret, quātum venæ cauæ, magnæque arteriæ muniendis opus foret. Non præcul ab his processibus duo alij, utrinque singuli, exoriuntur exigui admodum iuxta nerui exortum, quos Vesalius in homine numquam, in canibus vero, ac simiis se animaduertisse asseuerat. Cui ego hac in parte subscribere nullo pacto possum, & verissimam esse sententiam Galeni cogor fateri, cum sæpe in cadaueribus publice sectis Patauī, Pisis, Romæque eius generis ossa animaduertim: & pleno theatro attrectada proposuerim, quæ haud dubie nuper dictis processibus abundabant. Quid? quod apud me sceletos adhuc perstat, in cuius lumbo-

Transuersi  
processus  
mediæ vertebræ lumborum quales.  
Error Vesalij. Transuersorum processuum  
usus.

Cur in loco processuum transuersorum costæ nō sint productæ ad maiorem longitudinem.

Productio transuersorum processuum vertebrarum lumborum quāta sit.

Processus alij duo.

Contra Vesalium pro Galeno.

Professus est anatomem, Patauij, Pisis, Romæ.

Sceletō habet domi.

rum vertebris tales processus insigniter apparet. Hi tamen non in omnibus apparent. Aliquando inveniuntur vertebrae, in quibus obscurissimi sint. Atque haec prolixius dicta sint, ut omnibus perspicuum sit, me in rebus Anatomicis non

Galeno & Vesalio in rebus Anatomicis veritate praefert.

Processus posteriores lumborum quales.

Vertebrae lumborum habent appendices.

Cartilago inter corpora vertebrarum qualis.

Ufus foraminum ante processus inferiores ac superiores.

Differentia foraminum vertebrarum lumborum ab aliis.

tanti Galenum & Vesalium, quos plurimi facio, quam veritatem ipsam facere: veritatem appello, ubi cum rei natura oratio maxime concordat.

Dantur praeterea lumborum vertebris posteriores processus, neque longi, neque acuti, neque ita deorsum tendentes, quales in superioribus vertebris visuntur: sed validi sunt, crassi, ac lati, & in extremitate circulari linea definiti. Haec tandem vertebrae aliarum more appendicibus exornantur, quae quanto ceteras magnitudine antecellunt, tanto etiam cartilaginem, quae inter ipsarum corpora molliissima intersidet, maiorem, & crassiorem adeptae sunt: neque foraminibus illis destituuntur ante inferiores, superioresque processus exculptis per quae tam patet ingressus vasis nutrimentum afferentibus, quam exitus nervis ex dorsali medulla progredientibus. Haec autem foramina a superioribus differunt: non enim vere orbiculata sunt, neque magis in vnius, quam alterius vertebrae parte excavantur, sed parem utriusque portionem exemptam postulant, quemadmodum videre est in quibusdam cervicis vertebris: id quod si minus observatum videris, non magni referre putato, si humilior



istorum foraminum sedes inferioribus vertebra-  
 tribuatur. Illud autem omnium vertebra-  
 rum dempta ceruicis prima commune fuerit,  
 quod in posteriore corporis parte, quam utique  
 spinalis medulla parte sua anteriore attingit, ad-  
 sistit foramen patens, ac peruium subintransi-  
 bus venis, atque etiam arteriis; ut alimentum  
 abunde suggerant. Atque hæc hæcenus de cer-  
 uicis, thoracis, ac lumborum vertebrais: quarum  
 descriptio a Galeno tradita, omnino reiicienda  
 est, quando cum brutis potius, quam cum huma-  
 nis conuenire videtur. In sacro item, & coccygis  
 ossæ Galenum eadem ratione non sequemur, ut  
 sequenti capite palam erit. Illud insuper adnota-  
 bis posteriorem processum, quem spinam vocari  
 diximus, deorsum tendere a secunda ceruicis  
 vertebra usque ad ultimam lumborum, quam-  
 uis secus Galenus senserit, qui dixit processum sub  
 decima sursum vergere.

Commune  
 omnibus  
 Vertebrais  
 præter pri-  
 mæ ceruicis.

Gal. errat in  
 vertebra-  
 sacri & coc-  
 cygis descri-  
 ptione.

Spina ten-  
 dit deorsum  
 a secunda  
 vertebra  
 colli ad vlti-  
 mam lum-  
 borum.

Gal. error,

De sacro, & coccygis ossæ.

# CAPVT XVIII.

**D**Orsi duas iam postrema partes restant,  
 quarum alteram sacrum, alteram vero coc-  
 cygis os nuncupamus, utroque a Græcis sumpto  
 vocabulo: siquidem illi hoc ἱερόν, illud autem  
 κόκκυρα dixere, nonnumquam etiam sacrum  
 πλατὺ vocarunt: latum id, amplumque intelli-  
 gentes: superat enim non modica amplitudine  
 reliquas omnes vertebrae, quibus veluti basim

ἱερόν,  
 κόκκυρ.

Cur πλατὺ  
 vocat os sa-  
 crum.

*Substratum animaduertimus: idem vero apud veteres id est, quod magnum sonat. Illud de hoc osse satis absurdū est, atque a rei natura maxime abhorrens, quod nonnulli magni etiam nominis authores commentī sunt: os istud fœminis, dum pariunt, ita dilatari, ac retrocedere, ut percommode fœtus edi possit: ac propterea sacrum appellari. Neq; mihi adducenda videntur, quæ Galenus varie de hoc osse tradidit, cum satis constet, non humanum os sacrum, sed belluinum, quale est canum, ac simiarum, ab eo fuisse descriptum, quemadmodum pluribus verbis quam fortasse necesse fuit, Vesalius ostendere conatus est. Verum enim vero, hæc atque alia quādoque in medium afferri debent, ut nonnulli discant legendis authoribus iudicium adhibere, neque Pythagoricorum more satis est ducere, quod ipse dixerit, cuius tantum opinio præiudicata poterat, ut etiam sine ratione valeret authoritas. Quis enim non videt magnum Galenum quandoque dormire, cum ossa non distinxerit, quantum a brutorum ossibus humana distarent? Illud enim ne a sacro osse discedamus, quod scripsit Galenus in sacro esse tria tantum inueniri foramina, quæ in osseum, ex quibus id ipsum constat, compage exculpta sunt: videre non possum quo pacto verisimile sit tribus foraminibus donari posse, cum duas tantum commissuras obtineat: quandoquidem vult ex tribus id ossibus*

*in p̄v.* id est, magnum. Etymologia sacri ossis quod ita vocetur qui a in parietibus dilatatur absurdissimū est. Gal. descripsit os sacri belluinum.

Vesalij sermonis prolixitas.

Authorib. legendis iudiciū adhibendum. Pythagoricis satis erat *αὐτὸς ὁ α.* Gal. quandoque dormitat. Gal. error.

constructum, quem simia, vel canis, vel leonis, os sacrum inspicienti nō obscurum erit, minus vero tria haec foramina sacro ossi humano tribuentur: quod videlicet non ex tribus, neque ex quatuor (ut ille arbitratus est) verum ex quinqs, & sex plurimum ossibus cōflatum est. Quae tamen si in aetate adhuc tenera laxari, ac separari possunt, neque tunc multum a reliquis vertebrae differre videantur: tamen cum facta sint, ut consistant, ita coalescunt, ut nisi interna parte, quae anterior est commissurarum nota seruantur, vix quisquam crederet ex pluribus illud ossibus consistare. Caterum ossa haec non secus inuicem commissae sunt, atque superiores vertebrae, praterquam quod interstitio cartilagineo carent, quo minime opus erat immobilibus futuris. Quamobrem in vertebrarum numero habentur, non quia vertebrarum usum praestent, cum nulla ratione moueri possint, verum quia similitudinem quandam retinent, per quam cum illis conuenire videntur. Nam si a tenera aetatis corpore sumpta haec ossa decoxeris, & a se inuicem diuulsa consideraueris, & corpus in iis, & processus, ac demum eandem pene figuram obseruabis, quam vertebrae ipsae praeseferunt. Porro non aliam ob causam os istud a natura paratum fuit, quam ut super eo quiescente reliqua ossa inferiora, aequae ac superiora mouerentur: licet enim ad ossa partes corporis vniuersae adhaerescant, atque iis motis ca-

In simia, cane & leone verum est, quod scribit Gal. de osse sacro.

Os sacrum hominis ex quinque vel sex ossibus.

Os sacrum in aetate tenera laxatur & separatur.

Vbi seruetur vestigiū commissurae in osse sacro.

Quomodo intelligatur os sacrum haberi in numero vertebrarum.

Ossis sacri vsus.



Os sacrum  
cur vnum.

Cur in me-  
dio sitū est.

Cur in me-  
dio ipsius  
sunt: fora-  
mina.

Spinalis me-  
dulla tran-  
siciens per os  
sacrum ner-  
ui naturam  
sapit.

Nerui a sa-  
cro osse ad  
nates & ali-  
quot musc.  
femoris.

Os sacrum  
ad latera an-  
te & retro  
est perfora-  
tum.

Si ossa sacri  
sunt sex fo-  
ramina, v-  
tring: sunt  
quinque &  
qualia.

Foramina v-  
tring: in of-  
se sacro ex-  
traminora,  
intro maio-  
ra sunt.

dem simul moueantur, ex natura tamen lege v-  
num precipuum os esse debuit, ad quod reliqua  
ossa stabilirentur: quod profecto commodius ali-  
bi, quam in medio pene corpore locari nō potuit:  
ut tam superioribus, quam inferioribus mouen-  
dis assisteret. At quoniam dorsalem medullam  
admittere debebat, transmittendisq; ab illa ner-  
uis vias recludere: iccirco in eo foramina sunt in-  
cisa, per quorum medium spinalis medulla descē-  
dit, quæ adeo dura solidaq; existit, ut nerui ma-  
gis, quam medulla naturam sapiat. Quapropter  
in nervos plures, ceu in ramulos desinit, qui ex-  
tra fines sacri ossis parte posteriore progressi ad na-  
tes, & aliquot viriusq; femoris musculos deferū-  
tur: ad latera item ante, retroque perforata sunt  
ossa ista, qua scilicet inuicem committuntur: fo-  
ramina vero rotūda sunt, & æque superioris, ac  
inferioris ossis portionem occupant, unde nerui  
fluunt. Cum autem sex ossa (totidē. n. illa sepe nu-  
mero esse solent) quinque necessario commissuris  
vniantur, quinque etiam vtrinque foraminibus  
donari oportet: quorum duo prima maxima  
sunt omnium: reliqua vero quo longius a primis  
abscedunt, eo minora fiunt: verum extrinseca  
omnia si cū intrinsecis conferantur, minora cer-  
nūtur. Quod si etiam addas partem illam, qua  
cum postrema lumborum vertebra superior pri-  
mi sacri ossis portio cōiungitur, cū illic extēt duo  
alia foramina: dicendum est sacrum iis pariter  
forami-

foraminibus abundare. Ex quibus omnibus qui  
 nerui transmitti soleant, suo loco docebimus.  
 Huius ossis figuram non video cui rei conferre  
 possim, nisi protuberantis propugnaculi formam  
 imitetur. Etenim superne planum habet corpus,  
 cui incumbit quinta nervorum vertebra, & se  
 in bina latera protēdit, crassa illa quidem, ac ge-  
 minis processibus parte posteriore munita, atque  
 ita respondet secundo: postmodum descendens  
 semper fit angustius, quousque in acutum fere  
 tendat, ubi primum os coccygis coalescit. Prater-  
 ea parte anteriore leue est ac simum, ut organis,  
 quae subsunt, cedat, neque abesse ullo pacto possit:  
 posteriore vero parte gibbum est, ut firmitus ha-  
 reat, ac eas partes, quae munire debet, validius  
 tueatur: nec minus asperum quoque est, multo-  
 que sinus, ac processus facit, quae potius tubercula  
 quadam mihi esse videntur. Posteriores item  
 processus breuiiores sunt, nec secus atque ossa, vn-  
 de prodeunt, inuicem committuntur, ac vnā  
 veluti spinam constituunt quod tamen in qua-  
 tuor, vel tribus primis ossibus obseruabis. At  
 quae sequuntur posteriores processus in duas quo-  
 dammodo partes diducunt: ut exerenti sese  
 medulla, ac in plures, ut dictum est, pro-  
 pagines diuise sinum parent; qui tamen hinc  
 inde prominentes aliquantum illam tueri vi-  
 dentur. Primum os sacri hoc habet peculi-  
 are, quod superiores emittit processus leui-

Nervorum  
 descriptio-  
 ne alio rei-  
 ciendam.  
 Figura ossis  
 sacri.

Os sacrum  
 cur antero-  
 re sit leue ac  
 simum.  
 Cur posteri-  
 ore gibbū.  
 Cur asperū.

Sinus ac  
 processus  
 ossis sacri.

Os primum  
 sacri quid  
 habeat pe-  
 culiare,

Tres sinus  
in intimis  
lateribus  
triū ossium  
superiorum  
sacri.

Connexio  
iliorū cū sa-  
cro qualis.

Ossa iliorū  
& sacri neq;  
mouentur,  
neque mo-  
ueri possūt.  
Decoccyge.  
Coccyx.  
Cauda.  
Os caudæ.  
Coccyx os  
cur ita di-  
ctum.  
Descriptio  
coccygis.  
Coccyx ali-  
quem quā-  
doque mo-  
tum edit.  
Parturiētes  
cruciantur  
cum coccyx  
flectitur.

ter cauos, quibus immittuntur inferiores postre-  
mae lumborum vertebrae processus modice pro-  
tuberantes. Demum notandi sunt tres sinus in  
extimis trium superiorum ossium lateribus, quo-  
rum medius maior est, ac profundior ceteris; in  
hōstenacius inseruntur prominentes iliorū par-  
tes, atque ita cum transversis processibus eorun-  
dem cartilaginis, ac ligamenti interuentu coha-  
rēt, ut vix diuelli possint: quin etiam videre est  
iliorum ossa adeo sacro ipsi connexa, ut connata  
quandoq; videantur. Nec mirum id cuiquam  
videri debet, quando hisce oculis vidios sacrum,  
cui sinistrum os ilij connatum erat deficiente de-  
xtro, ac illud ne ferro quidem cōuelli poterat. Un-  
de firmiter redditur sententia, neque ossa iliorum  
neque sacrum moueri vllō pacto posse. Quinta,  
& ultima dorsi portio ex quatuor ossiculis con-  
structa, ab ossis sacri extremitate veluti cauda  
quadam pendet: ideo caudam recentiores, siue os  
caudæ dixere, Græce autē coccyx nūcupatur; quo-  
niā cuculi auis rostro persimilis apparet: rubescit  
enim os istud præsertim in iunioribus, & ductu  
ad interna obliquo in mucronem tendit. Pri-  
mum coccygis ossiculum, quod ceteris latius est,  
ac maius, superne sinum habet, quo imā postre-  
mi sacri ossis partem media cartilagine excipit,  
atq; in eo vertebrarum inter se compagem imi-  
tatur ad aliquem forte motum, cum tempus po-  
stulat, edendum. Quocirca vero simile admo-  
dum



dum videtur, os istud a sacro laxari, ac versus posteriora flecti, cum mulieres fœtum emittunt: id quod non sine aliquo parientium cruciatu cōtingit. Huic primo osiculo dantur quatuor processus, duo e lateribus, ac totidem posteriores acuti, & superiora spectantes, reliqua vero tria osicula rotunda quodammodo sunt, ac sensim in acutum tendunt: ut rostri illius, quod referunt, mucronem constituent. Hæc inter se adeo recte compacta sunt, ut unicum os esse videatur, nonnullis foraminibus peruia: fungosa tamen existunt, qualia sunt ossa pectoris.

## De Thorace. CAP. XIX.

**A** Vertebrae descriptione ad explicandum thoracis naturam aliorum exemplo aggredi decet: quãdo illæ duodecim, quæ inter ceruicem, ac lumbum locum habent, ad thoracis constitutionem necessario concurrunt. etenim costæ præcipuæ thoracis partes, cum exactiorem illius figuram efficiant, maiorem firmitudinem, ac robur a vertebra, quam ab osse pectoris sortiuntur, quibus omnes gemino fere nexu copulantur. Quamobrem si pectoris os thoracis partem censemus, multo certe magis fatendum est, vertebrae iam commemoratas ad thoracem pertinere. Non immerito igitur ex vertebra, costis, ac ite ex osse pectoris integra thoracis constructio constat, quod descripturi, de costis, pectorisque osse tantum agemus. Nã satis superg, de vertebra meminimus.

Processus  
quatuor pri  
mi ossis coc  
cygis.

Figura triū  
reliquoꝝ  
ossium coc  
cygis.

Ossa coccy  
gis sunt fun  
gosa ut ossa  
pectoris.

Quæ verte  
brae concur  
rant ad cō  
stitutionem  
thoracis.

Thoracima  
ior a verte  
bra quam  
ab osse pe  
ctoris inest  
robur.

Thorax ex  
quibus cō  
stat.

Tractatio  
de vertebra  
prolixa est.

Cor mem-  
brum prin-  
ceps in tho-  
race.

Pulmonum  
 situs, & vsus.

Cur thorax  
modo attol-  
latur modo  
comprimatur.

Occurrit  
•biectioni.

Cur thorax  
nō est totus  
offeus.

Cur nulla  
parte of-  
feus.

Cur ex co-

*Caterum in thorace cor princeps membrum contineri nemo est qui nesciat, cui veluti calidissimo, & assiduo pene seruire astuanti partē aliquā adesse oportuit eius refrigerandi gratia. Propterea in thorace geminos pulmones natura fabrefecit, ut hinc inde asideant ceu cor ipsum medium complexuri: quorum perenni motu, atq; agitatione tamquam flabello ventiletur, ut ita dicam, & astus ille ingens mitescat: cum vero pulmones per aerem vicissim inspiratum, atque expiratum continenter moveri necesse fuerit: Thorax modo attolli, modo comprimi debuit, prout respirationis beneficium postulabat. Quamquam dixerit aliquis, thoracem commodissime huic necessitati obtemperare potuisse, si musculis tantum, ac pelle abdominis more tegeretur. Verum enimvero salutis pariter ac tutelae tam nobilis, & principis membri consulendum fuit. parandumq; etiam, unde musculi eiusmodi motui famulantes exoriri, aut quo inseri quā appositissime possent. Sapientissima ergo rerum cunctarum genitrix natura eam constructionem molita est costis tali figura, atque in articulatione conflatis, ut leui momento contrahi ac rursus dilatari possent: nec non etiam per commodam pulmonibus, & cordi sedem struerent: hinc facile sibi quisque rationes comparare potest, quo satisfaciat sciscitantibus cur Thorax non totus offeus, aut nulla ex parte offeus: vel denique cur ex costis, ita*

*per*

per intervalla distinctis fuerit efformatus. Verum costæ viginti quatuor numerari solent: quando utrumque latus duodecim admittit, qui tamen numerus non semper idem reperitur: in aliquibus enim aliquando tredecim, aliquando undecim costæ insunt: multo tamen rarius deesse videas, quam superesse. Abundantem una tantum costula mulierem Sanctam nomine, a me publico Pisarum Theatro dissectam, ac demum ad sceleti formam compositam, apud se detinet familiaris meus Bartholomæus Stratēsis, Medicinæ Pisis publice professor, quam aliquando expositam memini cernentes idiotas pene iurciurando affirmare solitos, illam ipsam costam esse qua femina viros superant: cum tamen idem sit numerus costarum in viris pariter & mulieribus. Quod si quandoque aut in his, aut in illis vel deficiunt, vel superant: id nimia materia copia, vel eiusdem inopia certum est provenire: quem admodum contingit, cum natura aberrans plures in manu, paucioresve quinque digitis producit. Verum quod de thoracis vertebrae superius dictum fuit, idem quoque de costis affirmandum est. Cum enim singula vertebra geminas costas excipiant, & illa, si modo variari numerum contingat, rarius pauciores, quam plures duodecim existant, ita rarius imminuitur costarum numerus, quæ quidem varietas, æque in maribus, ac feminis deprehendi solet. Quamobrem non

stis per intervalla distinctis superioribus patet.

Costæ non sunt semper 24.

Costæ 13.

Costæ 11.

Sæcta habebat viginti quinque costas.

Sceletus Bartholomæi Stratēsis.

Tot costæ sunt in mulieribus. quot in viris.

Cur costæ quandoque deficient vel superent numerum.

Costarum numerus proportionem respondet vertebrae.



Aristoteles possum satis mirari Aristotelem alioqui præcipuum naturæ filium, scribere ausum esse octo costis homines constare, atque apud aliquas nationes septem solummodo costis donatos esse. Undecim mihi semel tantum dinumerare licuit, cum primum Patauij Anatomicã administrationem publice profiteri cœpi. Etenim cum Vesalius abesset, ac diutius in Germania detineretur, ut opus suũ de Humani corporis fabrica imprimendum curaret: metũ Venetiis primario Chirurgo, ac præceptorĩ meo Ioanni Antonio Leonico, graui morbo laboranti, omni officio, ac potius pietate assistentem, vniuersa Schola Patauina dignum iudicauit, quem in Vesaliũ locum sufficeret, ac non contemnendo præmio accersiuĩ. In ea igitur dissectione cadauer vnũ undecim costis munitum forte fortuna obtigit, cuius deinde ossa decocta, & æneis vinculis cõpacta, ad præstantẽ medicum Ioãnem Baptistam Picinarũ Cremonam missi. Verum enim uero ad ea, quæ fere semper talia sunt, respicientes dicimus duodecim vtrinq; costas thoraci constituẽdo adesse oportere, quarum aliæ veræ sunt, ac legitima nominata, aliæ vero nothæ, ac spurie: septem superiores veræ ideo dictæ sunt, quoniam vere pectoris ossi media cartilagine per Arthrodiam uniuntur. Quinque vero aliæ sequentes nothæ sunt: quãdoquidem cum esse pectoris non coniunguntur: nam suis cartilaginibus ad os pectoris non pertingunt, sed superior-

veriorum verarum cartilaginibus committun-  
 tur, ac eo pacto inter se iunctæ uniuntur, præter  
 duodecimam, quæ omnino ab undecima, sicq; a  
 cæteris abscedit: neq; tamen proprio adminiculo  
 destituitur: nam cum septo transuerso colligatur,  
 id quod interdum undecima contingere solet. Costæ  
 cum vertebris etiã duplici (vti antea diximus)  
 nexu coarticulantur, vt validius ibi inhereant:  
 tamen si non omnes duplicem hunc articulum  
 obtinent, quando postrema duæ, undecima scilicet  
 ac duodecima vno tantum loco suis vertebris  
 committuntur. Desinunt omnes posteriore par-  
 te in processum quendam capitatum, sed acutum  
 potius, quam rotundum, quod caput in verte-  
 brarum corpus immittitur, quæ latera sinus quo-  
 dam habent, sed diuerso modo celatos: non enim  
 admodum alte excauati sunt illi sinus trium in-  
 feriorum costarum in articulationi subseruien-  
 tes. Habent præterea non longe a capite proces-  
 sum alterum: si quidem illæ vbi a capite progre-  
 diuntur, non parum excauantur, eo præcipue late-  
 re, quo protuberare rursus incipiunt, atq; alterum  
 hunc processum emittere, qui cum transuersis  
 vertebrarum processibus validis vinculis alli-  
 gatur. Quæ nihilominus vniendi ratio minime  
 omnibus est communis, nam undecima, & duo-  
 decima hac secundo articulo priuantur: id quod  
 etiam in prima costâ frequentius observatur: &  
 quoniam huiusmodi processus, tam qui ad extre-

Costa duode-  
cima vbi alli-  
getur.

Costa 11. quã-  
doque colli-  
gatur cum se-  
ptimo transuer-  
so.

Costa quò  
modo vertea-  
bris articulæ-  
tur & cur.

Vertebra vñ-  
decimæ &  
duodecimæ  
cum verte-  
bris articula-  
tio qualis.

Processus co-  
starum poste-  
riore parte.

Sinus in late-  
ribus costarum.  
Processus al-  
ter.

Costa vñde-  
cimæ & duo-  
decimæ pe-  
tullare.

Processus ca-  
pitati.

mitates costarum prominent, quam qui trans-  
uersis processibus vertebrarum inhaerent appen-  
dicibus sunt pramuniti. Vbi etiam cartilago po-  
sita est, excipienda erunt, quae unico articulo cō-  
mittuntur. singulos enim appendices haec tantum  
habent. Constant costa omnes partim ossea, par-  
tim cartilaginea substantia: nam totus earum  
ductus a vertebris versus anteriora prope os pe-  
ctoris offensus est, quā vero cum osse pectoris legiti-  
me, aut cum aliarum cartilaginibus notha cō-  
iungi debent, cartilaginem multam producant,  
ut ne dura cum mollioribus immediate compo-  
nantur. Iam vera substantia illa ossea non usque  
quaque est persimilis, aut equalis: siquidem costa-  
rum extrema tenera quodammodo sunt, ac et-  
iam fungosa: media vero ipsarum regio durior  
est, ac intus medullosa. Porro ab ea parte, qua  
vertebris vicinior est, graciliores existunt, ac ve-  
luti teretes: quanto autem magis ad pectus ad-  
ducuntur, tanto quoque latiores fiunt. Præterea  
pars superior crassior est inferiore: unde certam  
propemodum notam colligito, qua dextras a si-  
nistris secernas: hanc vero tenuitatem, ac lati-  
tudinem in omnium fere animalium costis de-  
prehendere licet leone excepto: cuius quidem co-  
sta crassiores, ac prorsus teretes visuntur, quae ni-  
hilominus insignem cavitatem habent, in qua  
nisi medulla contineatur, inanem omnino eam  
ipsam fore necesse est. Quod eo dictum est, ut  
obiter

Costarum  
substantia.

Cartilaginis  
in costarum  
coniunctio-  
nis usus.

Costarum ex-  
trema.  
Media.

Costa latior  
res pectus  
versus.  
Quo signo  
distinguitur  
costa dextra  
a sinistris.

Leonis coste  
quales.



ibiter animaduertant operum naturæ studiosi,  
 quam vere dicat Aristoteles leonum ossa penitus  
 esse solida, nec medullam intus continere: ut sci-  
 licet incredibile horum animalium robur hoc ar-  
 gumento probaret. Equidem dum Florentia cum  
 Mazzolario Academia Pisana moderatore  
 ad visendos leones adducti essemus, quos floren-  
 tissima illa ciuitas suis claustris, & publico loco,  
 publico etiam sumptu alit, idque in signum ma-  
 iorum suorum, ac perpetui cuiusdam hominis er-  
 go: in eum sermonem deuenimus, an verum id  
 esset, quod Philosophus de hisce animalibus, ac  
 praesertim de ipsorum ossibus tradidit: cumque  
 ille me dubium, ancipitemque cerneret, quid  
 (inquit) obstat cur id oculis nostris non explore-  
 mus; quando hic demortuorum leonum sepul-  
 chra adsunt? Itaque custodie praefectum rogavi-  
 mus, ut per illum liceret ex leonum sepulchris os-  
 sa tantisper effodere, dum quod maxime cupie-  
 bamus intueremur. ille comiter non modo eru-  
 endi sed exportandi etiam quotquot volumus  
 copiam fecit: quamobrem nostro illa arbitrata  
 regimus, ac medullosa conspicati sumus. quid  
 quod non modo grandiora ossa amplis caui-  
 tatibus praedita, sed minora etiam caua offen-  
 dimus? Tales ergo leonum sunt costae, quales  
 antea diximus: cartilagine item in quas costae  
 ipsa parte anteriore desinunt, diuersae sunt. Et-  
 nim verarum cartilagine non adeo molles

Ossa leonum  
 non sunt so-  
 lida contra  
 Arist.

Mazzolarius  
 Praefectus a-  
 cademiæ Pi-  
 sanæ.  
 Florentiæ al-  
 luntur leoa-  
 nes.

Florentiæ ad-  
 sunt sepul-  
 chra leonum.

Leonis ossa  
 maiora omni-  
 no infregit  
 medulloiaque  
 reperit.

cognoscuntur, quales sunt spuriarum: quod non sine consilio factum intelliges si prius considera-

**Cur cartilagi-  
nes costarum  
que cum osse  
pectoris con-  
iunguntur  
sint duriores.  
Cartilagine  
costarum no-  
tharum qua-  
les & cur.**

ueris illarum cartilagine duriores fore, quæ cum duriore substantia, nempe cum osse pectoris coniungenda fuerint: inferiorum vero, quæ notha dicuntur, ideo molliores; quoniam cum cartilaginibus copulari debebant: id quod nobis res confirmat: cum in senio affectis corporibus intuemur superiores illas cartilagine, quæ cum pectoris osse coherent, iam pene totas in osseum naturam abiisse.

**Cartilagine  
costarum ve-  
rarum in val-  
de se. ibus pe-  
ne osseæ.  
Cartilagine  
costarum cõ-  
parantur in-  
ter se.**

Ad hæc costarum sexta, septima, octaua, nona cartilagine cæteris sunt longiores, at spuriarum tenuiores, angustiores, & in mucronem tendentes. Postrema tamen cartilago breuissima est, quemadmodum esse solet prima, ac legitima: quamquam in eo differunt, quod acuta illa est, & gracilis, hæc vero lata, & ampla: sicuti etiã ipsæ reliquas omnes costas latitudine superat: quæ amplior etiam redditur, quo propius ad os pectoris accedit; secus autẽ aliis contingit: nam earum cartilagine initio sunt, quam in

**Cur costę ha-  
beant tã lon-  
gas cartilagi-  
nes.**

**Cartilagine  
costarum li-  
gant costas  
osse pectoris.  
Intervalla  
costarum.**

progressu ampliores. Costis autem tam longæ cartilagine appositæ fuerunt, ut ex assiduo motu minus laderentur, ac vel dormientibus sursum attolli, itemque deprimi pro pulmonum naturali agitatione possent. Quæ quidem cartilagine cum sint veluti vinacula, quibus pectoris ossi costæ alligantur: non immerito costarum intervalla constituunt, quæ tamen inter se positione

tionem, ac situ variant: nam sex superiorum costarum cartilaginee aquis a pectore spatii debiscunt, atque eo modo aequalia costarum intervalla efformant. Sexta autem parte solummodo inferiore, qua septimam respicit, & septimae, octavae, ac nonae varius est ductus, & earum cartilaginee sic adherent, ut continuae fiant, nec quicquam spatij, quo separentur, relinquunt. Praeterea costarum verarum cartilaginee in tuberculum, seu capitulum quoddam terminantur, quo pectoris ossi ubi sinus est, committi atque in articulo debuerunt. Costarum figura semicircularis esse videtur, ut duplici veluti medio, hoc est, continuo duodecim vertebrarum ductu, ac pectoris osse circularem formam thoraci suggerant; quae cum validior est, & constantior, tum ad plura continenda accommodatior: prima superiores, ac postremae inferiores, cum breviores sint mediis, hanc sphaericam thoracis non minimum adiuvant: in quo illud observatu dignum est, quod superiores curvae magis, postremae autem lentiores, ac minus gibbae sunt. Iam vero tam superiores, quam inferiores arctiores existunt: mediae vero longiores, ac latiores: primam tamen excipito, quae utique omnium latissima est, ac brevissima; verum quia costa interna sui regione membrana succinguntur, quae Graecis *μεινερ* dicitur, non decebat partem illam asperitatem ullam obtinere, quae membranam hanc sensu non modi-

Quomodo  
verae costae  
articulantur  
ossi pectoris.

Figura costarum.

Vnde adueniat circularis figura thoraci.

Cur thorax sphaericus. Costae superiores sunt magis curvae. Mediae costae quibus sunt latiores & longiores. Prima costa latissima & brevissima est. *μεινερ* succingit costas.



Interna pars  
costarum cur  
non sit aspe-  
ra.

Vena, arteria,  
neruus quo  
sinu costarū  
suscipiat.

Nature indu-  
stia.

In empyema-  
tibus ubi sit  
secundum.

Cur costę sint  
asperę extrin-  
secus ubi ver-  
tebris iun-  
guntur.

copraditam ledere potuisset. Ea igitur parte le-  
uissima sunt, quamuis sinus ibi adsit, qui ad imā  
earum regionem secundum longitudinem iacet,  
ut susciperet venam, arteriam, & neruum il-  
lac vnā repentes: hac autem interna cavitās co-  
stis omnibus aequaliter haud inest. ea enim lon-  
gius protenditur, ac profundior est in mediis co-  
stis: in primis vero ac extremis paruus inest si-  
nus: quoniam admittere debuit vasa, quę mino-  
ra essent pro costarum paruitate. Quamquam  
iste sinus non ita conspicuus est in duabus vlti-  
mis costis, atque etiam in prima, cuius locum in-  
terdum maior subit costarum tenuitas. Ut vasi-  
ipsis cecisse quodammodo videatur. Huiusmodi  
vasorum ductus maxime animaduertendus est  
propter affectum quem Graci *πνεύμα* vocant: in  
quo si quando per musculorum intercostalium  
incisionem pus exhauriendum fuerit, sectio ad  
ministranda est ad supernam costę regionem  
non autem subima eius parte ubi resident vasa  
ipsa, quę facile incidi possent: nam maximū in  
commodum consequeretur. Caterum costas ex-  
trinsecus parte posteriore, quę vertebris alligan-  
tur, asperas esse, ac inaequales necesse fuit, ut ind-  
commodius prodeant ligamenta, quibus verte-  
brarum corporibus, ac earundem transuerso  
processibus alligantur: nec nō ibidem tubercul-  
emittunt, quę vertebrarum sinibus articulatio-  
nis gratia uniuntur, ac postquā a vertebrarum  
proce-

processibus non procul recedunt, tuberculo alio donantur, qui musculo dorsalium longissimo est destinatus: eadē item costarum sede, qua distant ab iisdem vertebrarum processibus trium prope digitorum intervallo, asperitatem ac propemodum extuberantiam habent, quo ibi aptius inseri posset musculus thoracem mouentiū quintus. Illud addendum ab ea parte, ubi costarum radix est, atque illa in vertebrarum corpora implantantur, usque ad transversorum processuum nexum costas superiora petere; inde vero deorsum flecti, ac tendere, atque ad pectus conuersa cartilagini appropinquare, rursus sese attollere, & ita ad medium os pectoris, atque ad anteriora ferri. Sed haec haec tenus de costis.

## De Osse Pectoris. CAP. XX.

**P**ECTORIS OS, quod Graecis στήν, <sup>σῆν, id est,</sup> <sup>pectus.</sup> <sup>σῆν regio</sup> nuncupatur; quamquam σῆν ea regio protius intelligitur, quam ipsum os unā cum costarum cartilaginibus circumscribit, quam partem proprie pectus appellamus: in humanis latum est, ac breue, ex paucioribusque os constructum, quam Galenus sensit; quando ille putauit tot in eo ossa esse oportere, quot essent legitima costae, ut singulis esset, cui adharescerent. Septem igitur illa sanxit: cum tamen plurimum sint quatuor, minimū vero tria: quod in simiis, & canibus falsum non est; in quibus verum & illud est, quod Aristoteles ait: cor mediam om-

Insertio musculi dorsalium longissimo

Insertio quinti musculi thoracem mouentis.

Qua parte costae superiora petant, qua deorsum ferantur, cum qua rursus attollantur.

Gal. error de numero officum pectoris. Ossa pectoris plurimum quatuor, minimum tria Gal. sententia de ossibus pectoris verificatur in simiis & canibus.

Aristot. opinor cor esse in

medio pectoris vera est de canibus & finis.  
Substantia ossium pectoris qualis.  
Ossa pectoris uniuntur per symphysem.  
Ossa pectoris moventur ad motum costarum.

Sinus cedens asperæ arterie.  
Quibus finibus costarum iugulorum capita excipiuntur.  
Cur asperum sit superne os pectoris.

Sinus excipientes cartilagine costarum.  
Cur cartilagine costarum in superficie protuberent.  
Figura cartilaginis quæ est in imo pectore.  
Nomina cartilaginis imi pectoris.

nino pectoris regionem tenere, quasi rectam in medio positionem habeat. Sed de hoc infra, ubi de corde agemus. Pectoris ossum substantia minime solida est, qualis est reliquorum, verum molli, & fungosa: attamen ipsa ossa inuicem cartilaginis ope uniuntur per symphysem, cum nullumne obscurum quidem motum edant: licet costarum elationem, & depressionem sequantur. huius pars superior cum ceteris amplior est, tum etiam crassior: ubi parte interna, quæ in medio residet, sinus exculptus est, ut cederet asperæ arterie illac descendenti: eiusdem partis superioris latera sinibus pariter duobus abundare oportuit, extrinsecus tamen celatis, quibus exciperent iugulorum capita quæ cum iis articulantur. Pectoris os intus, extraque laue deprehenditur, præterquam superne, ubi asperitas quadam existit, unde nascitur, detineturque musculus longus & validus, tendens ab huius ossis summitate ad mammillarem processum, in quem utrinque implantatur: habet præterea alios sinus ab utraque parte descendentes, quos subeunt costarum cartilagine, modice quidem illæ in superficie protuberantes sicuti supra diximus, quod sic circumfactum est, ut aptius, ac tenacius inhererent. Ad imam eius partem extat cartilago quadam longa, & triangularis, nunquam bifida, aliquando etiam leuiter mucronata, quæ ideo plura obtinuit nomina, nam Græcis Xiphoides dicta est, a Latinis autem clypealis, gladialis,



dialis, ensiformis, & mucronata nominatur. Alij malum granatum appellant, propterea fortasse quod vnus balauſty formam referre videtur. Hanc nonnulli credidere pro ventriculi oris munimento stare, & illud ab extrinsecis tueri, cum tamen os ventriculi ab ea regione multū distet: quod ad dorsum vergit, ac iuxta illud prorsus situm est. Cum ergo mucronata hac cartilago vsum hunc prestare nequeat, dicerem subditorum propugnaculum esse, ac precipue septi transuersi, quod eo loco maxime nerueum est, siue tendinosum: cuius partis lasio ad cor ipsum ibi pene substratum penetrare potest: namque humani cordis inuolucrum, quod pericardion Græci vocāt, diaphragmati adnexum est, pectoris ossis figura gladij, vel pugionis imaginē retinet: ideo non defuere, sicuti Galenus libro de ossibus testatus est, qui totum id os gladiale nuncupauerint.

## De scapulis. CAP. XXI.

**A**NTE QVAM ad scapularum enarrationem aggredieremur, dicendū nobis esset de cordis ossiculo. Caterum quando in humanis id minime reperitur, nihil huius interesse negotij arbitrati sumus, cuius tamen si quis nimium curiosus fuerit, illud in grādiōribus animalibus querere poterit, nempe, bobus, equis, elephantis, ac fortasse etiam in ceruis senioribus, & si quidam negant, atque illud, quod pro ceruini cordis osse venale circumfertur, bubulum di-

Cur malum granatum appellatur cartilago imi pectoris.

Cur Xiphoides non potest tueri os ventriculi.

Os ventriculi sitū est iuxta dorsum.

Verus vsus Xiphoidis.

Lasio septi transuersi potest penetrare ad cor.

Pericardion, id est, inuolucrum cordis.

Pericardion est annexum cum septo transuerso. Gal. lib. de ossibus.

In corde hominis non est os.

Numero animalium in quorum corde est os.

Os de corde bouis pro ceruini ſeditur.

Saleni error.

cant: mirari profecto licet Gal. VIII. de' Administrat. Sectio. lib. &amp; VI. de Part. Vtilitatibus,

Cor simiarū  
caret osse.  
Simia quid  
habeant in  
corde loco  
officuli &  
vbi.

ac demum in fine libelli De ossibus mentionem huius ossis fecisse, cum nec in simiis quidem, quas crebrius secare solitus fuerat, os istud cernas: cuius loco membranas duas prope cartilagineas offendes, quæ inter arteria magna, &amp; vena arterialis radices instar firmameti iacent, sed de his alibi. Cordis itaque osse dimisso, ad scapularum explicationem deueniamus. Scapulae quas

σκαπὸν λέγουσι, ἢ ἄλλοι Græci vocant, geminae sunt; altera dextram, sinistram altera parte obsidet; ambaque posterius in superiore regione summis costis adherent propugnaculi vicem gerentes, non secus ac si tergum aliquod hinc inde porrigatur ad extraneos ictus propulsandos. Propterea scapula scutatam formam obtinere: ac roboris maioris gratia interna parte, qua costas respiciunt, con-

Forma.

Cur concaua  
intro.  
Spina scap.

caua sunt, externa vero prominent, &amp; spinam quandam veluti iugum producunt, quod eminet, inque superiorem partem assurgit ad earum

Scapulae articulantur cum iugulis &amp; humero.

Nexus scapularum cum aliis partibus.

Scapularum necessitas.

validitatem augendam: cum iugulis, atque humero aliorum ossium more articulatur: verum ad thoracis, cervicisq; vertebrae, ad os hyoides, ad occiput, ac tandem ad costas musculorum, de quibus postea dicemus, interuentu adnectuntur. Ex quibus omnibus colligitur necessaria scapularum constructio, quæ non modo posteriorem partem muniret, sed musculorum etiam tum ortum, tum infer.

infectionem susciperet, ac denique quod caput est, brachij articulationem exciperet, qua apprimē infirma, imbecillisque futura erat, nisi scapularum nexum, compositionemque habuisset. Scapula triangularem figuram præ se ferunt, nō tamē aequilateram: pars enim super a longe breuior est duabus hinc inde ad inferiora tendētibz, quæ pariter in angulum obtusum desinunt: ita quod ima hæc portio tantum spatij occupat, ut ego magis eam pro basi accipiendam putem, quam latus illud, quod ad spinam vergit: tribus processibus donata sunt, quorum vnus breuissimus est in caput latum, sinuatumque desinens, excipiendo summo humero paratus. Propterea cum hic sinus longe minor sit, ac depressior, quam altum, & rotundum humeri caput requirat: operæ pretium fuit, ne humerus quocumq; leui momento exiliret, huiusmodi sinum adaugeri. Neq; enim magis scapula substantia poterat excuari. Ergo cartilago crassior ad internam sinus labiorum partem obducta, atque ex porrecta magnam, & idoneam profunditatē constituit. Id vero sinuatum scapula caput sua ceruice non caruit, quamuis ea modica, & brevis appareat. Ab hoc processu non longe alter est coruini rostri, aut anchoræ persimilis, quem ideo anchyroides, aut coracoides appellant, per quem brachium a costis diducitur, ac distat: hic os humeri in sua sede cōtinet, atq; ad eius partis validitatem cōfert, in hunc tã

Brachij articulus absque scapulis infirmus esset.  
Scap. figura.

Quid sit basis in scapulis.

Processus scapularum.

Quomodo natura augeat sinum scapulae excipiendo humero dictum.

Ceruix capitis scapulae.

Processus anchyroides sinus & vsus.



dem inseritur musculus, qui ad anteriora scapulam trahit, & qui cubitum flectit. Tertius processus ille est, quem ingi, seu spina speciem referre diximus: longior ac prominentior: quocirca dictum fuit a Gracis ἀκρόμιον, quasi humeri apex, & summitas. Atque ita ab Hippocrate superior hęc articuli sedes perpetuo nuncupatur: cum hoc processu clavicula coniungi debuit: quamobrem illo fere omnia animalia carere videas, quę claviculis privantur. Inter acromion & claviculā Galenus voluit quoddam os dari, idque in solis hominibus, addens acromion a nonnullis & ὀστέον vocari, quod mihi adhuc non est compertum, nisi si quis Galenum Hippocratis auctoritate tueatur, qui lib. de Articulis idem sensisse videtur: quem tamen fortasse non inepte dixerimus per tertium illud os appendicem quādam intellexisse, quę ad Acromij extremitatem asidet, & in iunioribus facile deprehenditur. Quod & si detur, nescirem tamen cur Galenus asserere potuerit solos homines eo ipso osse abundare: cum nihilominus in simiis reperiatur. Caterū, acromion scapulam validiorem reddit, & locum clavicula constituit, cui commodē annectatur, nec minus etiā tutam, atque aptam musculis inserendis sedem parat. Scapula non undique sunt æquales, nam toto eo ductu, qui ab anchyroide processu versus spinam flectitur, ac descendit ad basim usque, tenuissima sunt, ac multo etiā in medio

Processus acromion dicitur.

Hippocrates

quid vocet

Acromion.

Clavicula ien

gitur cum a

acromio.

Claviculis ca

rentia nō ha

bent acro

mion.

Opinio Gale

ni de osse in

ter acromion

& iugula.

ὀστέον

quid vocet

Gal. Hippoc.

lib. de Artic.

Galenum ex

cusat.

Galenus in

excusabilem

reddit.

Usus Acro

mij.

Scapul. in

qualitas in te

nuitate &

crassitie.

medio tenuiores. At in ipsis processibus, atque eo latere, quo brachium respiciunt, insignem crassitudinem ostendunt: ubi eorum substantia medullosa, fungosaque conspicitur. Neque etiam desunt foramina venarum, arteriarumque, ingressui destinata, quae ipsis scapulis nutrimentum deferant. Interna scapularum regio sinus transversim oblique tendentes habet, longo temporis progressu ad crebrum costarum motum, quibus adhereret, celatos Extra tamen si gibba sunt, ac protuberant, non minimos tamen sinus obtinuerunt, quatenus musculos excipiunt, quamquam iis ipsis cedere illos omnino oportuit. Vbi animaduertendum est prudentissima naturae artificium. Etenim ne propter istos sinus scapula nimium tenues fieret: cernere est ab altera parte os succreuisse ad augendas, firmadasque partes huiusmodi sinibus e regione subiectas. Iam verò in scapulis appendices quing, sunt. Appendices vero discernuntur. Tres enim ad latus internum iuxta spinam deductum, atque ad basin adherescunt, unde musculorum quorundam origo trahitur: reliqua duo ligamenta suggerunt, quibus vinciuntur humerus acetabulo clavicula acromio, nimirum acromion harum duarum appendicum alteram sibi vendicat, alteram acetabulum. Præterea in summitate, nempe inter acromion, & supremam scapula partem cōcauitas non minima reperitur, facta ut musculus cōmode cūctos circumactionis humeri motus

Scapulæ ubi fungosæ & medullosæ. Foramina venarum & arteriarum. Interni sinus scapulæ.

Naturæ artificium, in sinibus externis scapularum.

Appendices quinque scapularum.

Appendicum scapulæ vsus.

Cauitatis inter acromion & supremam scapulæ vsus.

Foraminis orbicularis v-  
sus.

efficiat. In ea item regione foramen fere orbiculare vasis cesserum reperitur.

## De Claviculis. CAP. XXII.

Cut tractan-  
dum erat de  
iugulis post  
os pectoris.  
κλειδεις id est  
claviculae.

Claviculae he-  
rent superio-  
ri pectori.

Alios sequi-  
tur in ordine  
tract. de cla-  
uiculis.  
Iugulorum  
descript.

Cur dictae cla-  
uiculae.  
Vsus.

**D**IGNVM profecto nobis videbatur, vt ab eo capite in quo de osse pectoris egimus, statim illa ossa explicaremus, quae a Graecis κλειδεις, a nostris autem claviculae, siue iugula dicuntur: propterea quod illae ad superiorem pectoris partem adherent, & cum primo eius osse utrinque coarticulantur: scapulae vero nullum peculiare munus habent cum pectore: neque nisi median- tibus claviculis eidem uniuntur: verum quando id parum refert: neque rei naturam hic ordo tra- ctationis immutat, ab aliorum institutio mini- me recessimus. Scapularum itaque praemisimus de- scriptionem, quam nunc iugulorum enarratio sequetur. A supremo pectoris osse singula hinc in- de ossa discedunt flexuosa, & rotunda, quae trans- uersim delata sensim supra summum humeri ca- put ad scapulae processum ascendunt, quem acro- mion vocari diximus. Hec ossa clavicularum no- men obtinere: quoniam humerum cum scapu- la coarticulatum ita claudunt, vt ne ad thora- cem, pectusve brachium delabi possit: atque adeo dehiscat, distetque, vt ad pectus manus ad moueri, suasque innumeras propemodum actiones edere valeat. quod quam utile, atque necessarium sit, v- nicuique constare potest, si vel ab humano pectore claviculas demerit, vel bruta claviculis priuata



accurrate fuerit contemplatus: quo factum est, ut vulgares furculas appellent ad egregium hoc ipsarū munus alludentes, cum veluti fulcra quaedam ab osse pectoris deducendo, sustinendoque humeroparata sunt; alterum eisdem iugulorum nomē Latinis inditū est: quia fortasse iugi, quod bouum collis alligatur, similitudinē referat. Vnde iugulari animal tunc dici solet, cum venae, atque arteriae dissecantur, quae sub his iugulis posita sunt. Clauicularum j: substantia intus fistulosa, fungosaeque tenui crusta ossea obtegitur: maxime reliquorum ossium frangibilis est, earum figura non multum differt a nostro sita delineato; bis enim clauicula curuantur, bis gibbae, bis etiam simae fiunt: nam ab eo ductu, qui a pectoris osse incipit, ad mediam vsq; regionem intrinsecus cauae sunt, extrinsecus vero conuexae tuberis in morem. At a media regione ad Acromion opposito se habent modo, ubi latiores apparent, & capite sunt depressiore, quo cū acromij summitate coniunguntur. Verum alterum caput rotundum quodammodo existit, & magis ea parte, quae sterni sinu excipitur. ad vtrumq; caput appendices assident suis obductae cartilaginibus: adnotareque oportebit alteram superaddi cartilaginem illi capiti tantū, quod in summo pectoris osse residet: quam vterq; articulus ad Arthrodiā sit referendus. Cū autē ex clauiculis muscoli partim exoriantur, partim ad eas terminentur: idcirco nō

Cur furculae dicuntur clauiculæ.

Iugula cur dicuntur.

Iugulari.

Substantia clauicularis qualis. Clauifigura.

Clau. appendices.

Articuli clauicularum referuntur ad Arthrodiā.

Cur ante, quā  
retro promi-  
neant magis  
claviculæ.

Clavicula tu-  
etur arteriam  
venam axilla-  
rem cephalicam,  
& quæ  
que nervos.

Manus quid  
fit Hipp.

Humerifitus.  
Cubitus con-  
stat ex ulnæ &  
ratio.  
Brachiale.  
Postbrachia-  
le.  
Summi digi-  
ti.

Brachiū quid  
vocetur.

nulla in eisdem tubercula, nonnullas lineas, atq;  
asperitates cernimus inferiore præsertim parte,  
qua costas respiciunt, atque hæc omnia musculo-  
rum gratia. Quod vero parte anteriore potius,  
quam posteriore extrorsum promineant, summo  
consilio factū intelliges, si diligentius inspexeris  
ea regione subiecta esse nō minimi momenti va-  
sa: nempe arteriā insignem, ac venas cum axil-  
larem, tum etiam cephalicam, quas comitantur  
nervi quinque ad manum progreßuri, quibus o-  
mnibus incurvata clavicula pars non incōcinne  
cedere, ac simul propugnaculi vicem præbere vi-  
detur, clavicule suis foraminib. nō caruere: ut il-  
lac penetrarēt vascula nutrimentū trāsmitterētia.

#### De Humero. CAP. XXIII.

**M**ANVM Hippocrates totum id appellat,  
quod a scapula ad extremitatem usq; di-  
gitorum porrigitur: quod ex pluribus ossibus  
constat: primum inter scapulam, & cubitum re-  
sidet, humerum omnes vocant: deinde cubitum  
constituunt ulna & radius; his succedit pars  
illa, quam proprie manum dicimus, quæ bra-  
chialis, post brachialis ossibus, ac summis digitis  
construitur. Verum a summo humero ad extre-  
mam usque manum, totus ille ossium ductus hu-  
meri scilicet radij atque ulnæ, brachium nuncu-  
patur. His hoc modo distinctis ad singulas par-  
tes explicandas accedamus. Ergo humerus illud  
os erit, quod parte superiore cum scapula, in-  
feriore

feriore cum radio, vlnaque coniungitur: unicū  
 est, teres, longum, ac manus ossum maximum,  
 non tamen omnium femore excepto, maximū,  
 vti Galenus scripsit: quandoquidem neque ma-  
 gnitudine sacrū, neque latitudine iliorum ossa,  
 neque longitudine tibiā superet, à qua ceteris  
 quog, dimensionibus facile vincitur: & quam-  
 uis teretem figuram ostendat, tamen sinibus non  
 est expers, quasdam planities, ac summitates in  
 longum producit, & inaequalis est ob musculorū  
 nexum, vt alii inde ortum ducant, alii ibidem  
 implantentur. Pars superior in caput magnum,  
 rotundumque desinit, cui adnata est appendix  
 nō exigua, ex ea parte maximè cartilaginea cru-  
 sta oblita, quæ in scapulæ acetabulum inseritur.  
 Quoniam vero caput id altum necessario pro-  
 fundum sinum postulabat, quod in scapula fieri  
 minime poterat: ideo circa scapulæ sinum natu-  
 ra addidit alteram cartilaginem, atq, eminen-  
 tem, quæ sinum ipsum maiorem efficit, & arti-  
 culationem hanc in omnem fere motum pronio-  
 rem reddit: supra id caput rotundum duo proces-  
 sus eminet, qui oblongo, insignique sinu dirimū-  
 tur: ex his anterior posteriore minor est: amborū  
 maxima portio in appendice cōtinetur: illa vero  
 inter ipsos interiecta cavitās musculo cedit, qui  
 à scapula duplici principio fluens hac iter habet  
 deorsum ad cubitū flectēdū delatus: inferior hu-  
 meri pars capite haud rotundo sua appēdice do-

Humeri de-  
 scriptio.  
 Teres, longū.

Galenī error.  
 Sacrū os est  
 humero ma-  
 ius.  
 Ossa iliorum  
 sunt latiora,  
 humero.  
 Tibia est lon-  
 gior humero.

Sinus.

Cur humerus  
 est inaequalis.

Humeri ap-  
 pendix.

Cartilago au-  
 gens sinum  
 scapulæ exci-  
 pientem ca-  
 put humeri.

Processus.

In appen-lice  
 processus hu-  
 meri.

Caput inferi-  
 us humeri ha-  
 bet appēdi-  
 cem.



Gal. & Vesalij  
error.

Inferioris hu-  
meri descri-  
ptio.  
Trochlearum  
forma.

Ulna & cubi-  
tus quomo-  
do articulen-  
tur humero.

Vbi sit exca-  
uatum caput  
inferius hu-  
meri & coti-  
laxatio cu-  
biti.  
Flexio.

Sinus utilitas.  
In magna u-  
lnei contracti-  
one quo per-  
tingat secun-  
dus vlnę pro-  
cessus.

Alius sinus.

Ufus propriæ  
articulatio-  
nis radij cum  
humero.

*natur, quicquid sentiat tum Gal. tum etiam Ve-  
salius, qui opinatus est hanc humeri partem ap-  
pēdice omnino priuatā esse: at mihi semper cōspi-  
cua fuit in natu minoribus. Caterum pars hac  
inferior ampla est, in tria veluti capita exur-  
git, uel inæqualibus, ac distinctis: quæ ideo tro-  
chlearum formā effingunt, quod a lateribus emi-  
nent duobus sinibus leniter cōcauis apposita: ter-  
tio, quod est in medio, eosdem sinus diuidente, in  
quorum sinuum alterum incumbit ulna, & cir-  
ca eundem flectitur, extenditurq; cubitus: qui  
motus ut commodius fieri possit, pars huius hu-  
meri capitis posterior ampliter excauata fuit: ut  
superior ulnæ processus ibi consideret, ut absolu-  
ta fieri posset cubiti extēsiō: sicuti cum flectimus,  
ne quicquam impedimento esse possit: sinus quoq;  
paratus in anteriore, atque interna eiusdem ca-  
pitis sede, quo pertingit secundus ulnæ processus,  
dum cubitus ita contrahitur, ut extrema manus  
fere humerum contingat: externo humeri capite  
assidet sinus, qui positus est in superficie radij, cui  
inheret multa obductus cartilagine: at eius ca-  
put, cum sit depressum, & expansas oras habeat,  
interna ora sinum alterum obsignat, circa quem  
& ipse agitur: ac demum ulna validitati cōfert,  
quando illi ita annectitur, ut sinū quendā subeat  
in interna secūdi eius processus regione. At pro-  
pria radij cum humero articulatio maxime spe-  
ctat, ut manū oblique ad latera deducere valeat*

*mus*

mus: cum vero una cum brachio extenditur, aut flectitur: talis utique motus ab una prouenit sequente radio: hanc humeri cum cubito conjunctionem non bene Aristoteles nouisse videtur: quādo existimauit articulum illum, quo cubitus cum humero connectitur, contra se habere in quadrupedibus, atque in humanis habeat. Si quidē affirmauit homines antrorsum, quadrupedia retrorsum cubitum flectere. At non recte animaduertit, quem sitū hae partes in brutis teneant: non enim cubiti, atque humeri illa est articulationis, quam ipse putat: sed cubiti, ac brachialis compositio, de qua sequenti capite dicemus. Latet autem in brutis ipse humerus, quem si recte consideres, non aliud tum articulationis, tum motus genus in brutis reperiēs, quam in hominibus: aut statuendum erit eiusmodi animalia humero destituta esse, quod omnino falsum est. Hae tria humeri capita sua cartilagine crusta et ritu munita sunt: quorum protuberantius est internum, ac externum maius quodāmodo cernitur; praeter haec extāt duo processus ad utrumque latus, quorum internus longe maior est. His haerēt principia musculorum tendentium ad extremā manum: quod autem humeri os tota sui longitudine modo gibbum, modo sinum conspiciatur: talem formae varietatem varius musculorum usus postulauit, sicut clarius ostēdemus, ubi musculi manū mouētes explicauimus: os idē intus ca-

Qui motus ab una prouenit ciscatur.

Aristotelis error.

Cubiti flexio diuersa in homine. & brutis Arist. Cubiti & brachiali compositio est quā Arist. esse cubiti & humeri.

Humerus in brutis latet.

Trium humeri capitū in interiore humeri descriptio.

Processus duo & eorum usus.

Cuius humerus in longitudine sua modo sit gibbum modo sinum.

Humeri cauitates in medulla.  
Foramina per quæ venæ.

Cubitus quid significet.

Structura cubiti qualis.

Cubitus habet appendicem & utrinque.  
Superior appendix cubiti breui fit ossis. Gal. & Vesalii error.  
Appendix inferior cubiti & radii diu durat.  
Vlna dicitur etiam cubitus.  
Radius.

Vlna & radius committuntur inter se, & cum aliis.  
Vlna inferius committitur radio.  
Superior vlna qualis.  
Galenii error in processibus vlnæ.

Sigmoidis vlnæ.

uum est, ac medulla refertum quam pariunt venæ per foramina in eo sita subeuntes.

# De cubito CAP. XXIIII.

**C**UBITI nomine totam illam partem intelligimus, quæ inter humerum & brachiale ex duobus ossibus constituta est, longis illis quidem, sed humero minoribus: appendicibus utrinque donatur: verum parte superiore, quæ cum humero articulantur, appendices breui coalescunt, atque in osium portiones transmutantur. Tam hic, quam in ima humeri parte Vesalius Galenum sequutus perperam putauit appendicem non adnasci: parte autem inferiore diutissime in ambobus appendices seruantur. horum os alterum, quod est inferius, vlnam, quod etiam cubiti nomine sæpenumero donatur: alterum, quod superius existit, radium appellamus. Hæc cum inter se, tum maxime humero, ac brachiali iunguntur: quamquam vlna parte inferiore radio tantum committitur. sicuti mox dicemus. Superior ergo pars vlnæ crassior in duos processus oblongos triangulares: sed obtuso potius, quam acuto angulo, tametsi Galenus acutos eos accipiens coronas appellauit, terminatur. Hi processus ita prominēt, atque attolluntur: quoniam sectum est id spatium, quod in medio residet, ac in semicirculi speciem excavatum, qui sinus protuberantibus hisce processibus conclusus C Latinum refert, quod non absimile est, C Græco: propterea Galenus Sigmoides nuncupauit.



pauit. Factus autem fuit iste sinus, ut aptissime  
 processus ipsi sinum imi humeri complecti, &  
 circa illum verti possint. Quamobrem cernere  
 est in medio Sigmoidis lineam prominentem,  
 quae funiculi modo, ut in trochleis contingit, ri-  
 mam insistit, ne huc illuc ve vlna dilabatur, vn-  
 de mutuus exoritur utriusque partis ossium in-  
 gressus: ita quod huiusmodi articulatio Gingly-  
 moure tribui potest: ad priorem processum, qui  
 posteriore minor, interna parte, qua radium re-  
 spicit, sinum offendimus, in quem incumbit ra-  
 dii caput: verum cum ab his processibus recesser-  
 is, vlna sit acclinis, ac sensim attenuatur: usque  
 dum in caput desinat, quod ad internā partē ma-  
 gis aliquātulo propendet, ubi leuem radii sinum  
 subiens cum ebdē articulatur. Quod autem Ga-  
 lenus senserit eiusmodi caput cum brachiali con-  
 iungi: id ego nullo vñquam modo assequi potui,  
 cum videam nullam brachialis portionem ad in-  
 fimum vlnae caput adherescere. Præterea cum ex  
 hoc ipso capite extrinsecus producaturs processus  
 quidam tenuis, oblongus, & acutus, quem i-  
 deo styloidem Anatomici vocarunt. Hunc Ga-  
 lenus iudicauit in extremum brachialis os insigi,  
 atque ea ratione conferre ad manum in obliquū  
 agenda. Quod a veritate alienum esse omnino  
 experimento cōprobatur. Hic enim processus tā-  
 tū abest, ut hūc vsum praestet, ut impedimēto sit,  
 ne manus ad eū modū moueri queat: sicuti opti-

Lineae in me-  
dio Sigmoidis  
vlnae vñus.

Humerus &  
vlna articulā-  
tur Gingly-  
mo.

Sinus excipi-  
ens caput ra-  
dii.

Quomodo  
vlna cum ra-  
dio parte su-  
periore arti-  
culetur.

Galeni error.

Styloides  
processus nō  
agit manum  
in obliquum.

Vesalius lau-  
datur in ex-  
plicatione v-  
sus styloidis.  
Dicitum Gale.  
in simiis ve-  
rificatum.  
Cartilaginis  
crassa, & mo-  
bilis utilitas.

Pr. Mus vl-  
az utilitas,

Vlna exterius  
qualis.

Sinus ex qui-  
bus musculi.  
De Radio.

Radius, id est, ra-  
dius.

Radius situs.

Capitis supe-  
rioris & infe-  
rioris in radio  
comparatio.

Caput supe-  
rius cubiti ar-  
ticulatur cū  
humero, in-  
ferius cū bra-  
chiali.

Radius agit  
manum in  
prorum &  
supinum & obli-  
que.

me Vesalius probauit, ubi cubiti historiam recē-  
set: neque non hic processus a quarto brachialis of-  
se multum distat, licet Gal. octauum innuere vi-  
deatur, quod in simia veritatem habet: at in ho-  
mine tertium quoque brachialis os respicit. In-  
tersidet tamen quedam crassa, mobilisq; cartila-  
go, quæ cum spatium id repleat, quod interpositū  
est vlnæ cum brachiali coniungi innuere videtur,  
cum tamen minime coniungatur. Verum his  
processus nonnihil roboris ipse brachiali addit, ne  
prorsus in eam partē decidat: quando tantum ab  
ipso vlnæ capite dehiscit. Iā vero vlna parte ex-  
teriore leuis est, & admodum teres, parte vero,  
quæ radio respondet, in tenuem asperamq; lineam  
secundum suū ipsius longitudinem extenditur, &  
humiles quosdam sinus habet: ex quibus locis na-  
scentur musculi pollicis famulantes, necnon mu-  
sculus ille, cuius beneficio indicem a pollice ab-  
ducimus. Alterum sequitur os superius, quod  
Græcis *ῥαδιος* dicitur, nos radium vocamus, ex-  
teriolem fere totam cubiti partem occupat, in ca-  
pita crassiora desinit, sed superius minus est, ac  
rotundius inferiore: inferius autem & maius est,  
& latius: quod non temere factum intelligitur si  
perpēdatur, quomodo superius cū humero, inferi-  
us cum brachiali articuletur. Nam cum humerus  
ibi desinat in caput quodammodo rotundum, de-  
pressus, ac sinu præditum radij caput exegit, qui  
quoniam in prorum, atq; supinū oblique manum

agere

agere debuit: rotundum sui capitis sinum rotundo humeri capiti inhaerere oportuit, quo circumagi commode, munusque id obire possit. cui rei non parum deseruit sinus ille, quem diximus insculptum esse ad internam vlna prioris processus regionem, cui assidet interna radij capitis portio. Nec minus fit, ut per hanc geminā articulationem leui momento cum sequatur, tum etiam adiunget cubiti flexionem, & extensionem. Id caput copiosa obductum est cartilagine ad motionis agilitatem augendam. In ceruicem descendit teretem, oblongamq<sup>3</sup>, ad cuius extremitatem, qua vergit in vlnam, tuberculū emittit, quo terminatur musculus primus flectendi cubiti auctor: necnō etiam recipit alterius portionem eodē munere fungentis, qui fere totus in superiorem vlna partem implantatur. Caterum inferior pars radij (ut diximus) capite est maiore, depresso, ac lato, appendicis ope non minimum aucto, quod vel in grandioribus conspicuum est: in superficie non modo deprimitur, sed etiam in amplum, ac geminum sinum excauatur, in quo insident, atq<sup>3</sup> inarticulantur duo suprema brachialis ossa: quibus quoniam reliqua brachialis ossa artissimotenu vinculo uniuntur, merito dicere possumus totū brachiale eius unius articulationis opera cū ipso radio copulari: unde manū ipsam modo sursum, modo deorsum inuertere licet, eamq<sup>3</sup> itidē ad latera ducere: cū vero in pronū, ac supi-

Sinus ad internam regionem prioris processus vlnae vsus.

Cartilaginis multae circa radium vsus. Ceruix. Tuberculum

Appendix capitis inferioris radij vel in grandioribus videtur. Sinus excipiens duo summa ossa brachialis.

Quomodo manum sursum & deorsum inuertamus.



Quomodo  
manum in  
prorum ac  
supinum o-  
blique verta-  
mus.

Quomodo  
radius adiu-  
uat flexionē  
& extensionē  
cubiti.

Ab ulna est  
præcipuus  
motus cubi-  
ti

Quomodo  
radius ferat  
opem ulnæ  
in ducenda  
manu.

Radius supra  
suscipitur ab  
ulna; infra et-  
iam suscipit.

Compositio  
ulnæ & radii  
sub arthro-

dia. Inferius  
caput radii  
cur planum,  
& in declive

tendat ante-  
rius. Cur plu-  
res sint sinus

in posteriore  
parte inferio-  
ris capitis ra-  
dii.

Processus  
mamillaris  
in radio vltus.

Radius extra  
qualis.

Linea in ra-  
dio comparat  
linea in cu-  
bito.

Linea in ra-  
dio, & cubito  
vltus.

num oblique manum flectimus: id radii merito  
consequitur, quando is solus quiescente ulna mo-  
uetur. At quemadmodum radius cubiti flexioni  
suppetias laturus ab ulna sinu, cuius præcipuus  
est cubiti motus. superne suscipiebatur: ita etiam  
quasi mutuam ulnæ operam requirens in ducen-  
da manu, dum cubiti motum sequitur: eius infe-  
rioris capitis in insertioni sinum ipsa quoque para-  
uit. Quamobrem supra suscipitur ab ulna, infra  
vero ulnam suscipit, quam tamen compositionis  
speciē sub Arthrodia ponendam existimo: inferi-  
us radii caput parte anteriore planum pene red-  
ditum est, atq; in declive tendit, ut ita a substratū  
esset, liberumq; aditum præberet musculorum tē-  
dinibus, qui secundum ac tertium digitorum  
articulum flectendi partes sibi vēdicant: eodem  
modo posterior pars tendinibus cedit, musculo-  
rū ad exteriores articulos tensionis gratia trans-  
euntibus, propterea plures in ea sinus conspiciun-  
tur. exterior eiusdem capitis portio pollicem spe-  
ctans maxillarum, quendam processum promit-  
tit non aliam ob causam, quam ut ea parte brachia-  
lis luxationem difficillimam redderet. Ad hac  
radius extra non secus atque ulna teres est, ac  
leuigatus: intus autem acuta acie, qua longo du-  
ctu extenditur e regione alterius lineæ, quam ei-  
dē persimile in interna ulna parte descripsimus.  
Ex harū linearū alterutra fluit mēbræ quædā  
in alteram lineam inferenda, qua ambo hæc ossa,  
qua

qua laxius a se inuicem dehiscunt, colliguntur, confirmanturque: quae membrana simul etiam in erstitium quoddam exhibet, quo interiores cubiti musculi ab exterioribus separantur: ambo haec ossa cubitum constituentia caua intus sunt, ac medullosa. ut & leuiora sint, ac debito pabulo minus frustrentur.

Membranae.

Ossa cubiti  
cur caua.

## De brachiali. CAP. XXV.

**S**VMMA MANUM alibi tres in partes diuisimus: in brachiale, postbrachiale, ac digitos: qui & ipsi suis articulis constant. A prima igitur parte exordientes dicimus brachiale, quod Graeci κερπρον appellant, totam eam ossium struem intelligi, quae inter cubitum, & postbrachiale sita est, quae octo ossibus constat: & ea duplici ordine iuncta duas veluti acies constituunt, quarum utraq; quatuor ossa capit. Prima ossium acies parte superiore radii capiti ita committitur ut primum, secundumq; ossiculum in sinum ipsius capitis inseratur: tertium autem paulum inherere videtur: sed quartum nulli alteri ossi iungitur, praeterquam tertio, cui soli pertinaciter annectitur. Secunda item acies parte posteriore cum postbrachiali articulatur, priore autem cum ceteris brachialis ossibus, quae inter se cartilagineis ligamentis ita connectuntur, ut connata esse videantur: quae ligamenta cum nonnulli detrabere minime studuissent, haec ossicula non inuicem iuncta, sed connata prorsus credidere. Ossa haec adeo varia sunt, ut nulla ex par-

Summa manus diuisio.

κερπρον id est  
brachiale  
quid.  
Brachialis ossis octo.Prima acies  
brachialis ex  
quatuor ossibus.Secunda acies  
ossium brachialis.Ligamenti  
cartilagineae  
in ossibus brachialis usus,  
Cur aliqui  
crediderunt  
ossa brachialis esse connata.

Ossa brachialis nō conueniunt inter se figura.

Ossa brachialis carent proprio nomine.

Primum os brachialis.

Secundū os.

Tertium os.

Quartum os.

Quintum os brachialis.

Sextum os, septimum, & octauum.

Comparatur in magnitudine ossa brachialis inter se.

De Vnionem ossium brachialis. Primum.

te conueniant, ac singula quæq; variā formam præseferant, ut, quamquam non facile inuenias quibus illa rebus recte compares, non ideo tamen difficile sit discernere, & quæ, qualiæq; sint, diiudicare: cū vero propriis nominibus singula careant solo numero, atq; ordine dignoscuntur: eaq; ratione perdiscitur, quomodo inuicem, ac etiam cum aliis ossibus componantur. Is ergo erit ordo istorum ossium. Primum brachialis os illud est, quod in priore acie constitutum ab interno latere versus pollicem nobis occurrit. Secundum, quod illi statim succedit. Tertium, quod cum secundo cohaeret ad externum latus versus minimum digitū, aut cubitum vergens. Quartum, quod omnium minimum vni tertio annectitur. Quintum, quod in posteriore acie iuxta pollicem primo assidet. Sextum præterea, septimum, atq; octauum ita numerantur, ut ordine consequuntur. Iam vero non solum numero, ac figura, sed etiam magnitudine differunt. Maxima omnium sunt primū, ac septimum, quorū utrum maius sit, vix discernere queas. His minus est secundum, quod tamen ceteris maius est: deinde sequitur octauum. Postea quintū, cui succedunt sextum, ac tertium, quartum minimum est omnium, uti paulo ante diximus. Quod autem ad ipsorum unionem attinet, sciendum est primū os præterquā q̄ cum radio articulatur (superius enim cū in rotundum protuberet, in illius capitis



capitis sinum subintrat ) inde sensim adhaerere  
 secundo, eiusque sinum subit, deinde cauo admo-  
 dum sinu septimi tuber rotundum admittere, ac  
 inferiore parte quinto, sextoq; cohaerere. Caterū Secundum.  
 secundum & ipsum superne radii sinum ingre-  
 ditur, parte anteriore cū primo: inferiore autē,  
 qua cauum est, cum septimo posteriore cum ter-  
 tio connectitur, ac ita tertium secundo iungitur: Tertium.  
 ac praeterea inferiore latere octauum attingit,  
 posteriore sed interno versus vnam quartum:  
 quod quidem quartum alteri ossi non committi- Quartum.  
 tur. Quintum superiore parte primo, posteriore Quintum.  
 sexto, ac prominenti secundi postbrachialis ( ut  
 interim quinque eius ossa constituamus ) proces-  
 sui adhaeret. At inferior eiusdem portio primum  
 post brachialis os, quod Galenus primum articu- Galen.  
 lum pollicis facit, excipit. Sextū primo, quinto, Sextum.  
 ac septimo, qua illa respicit, nititur: inferiore au-  
 tem tubere in angularem postbrachialis ossium  
 sinum inseritur, ac subinde vergit ad tertium e-  
 iusdem postbrachialis, cuius primam, & longius  
 productā portionem sustinet. Septimum omni- Septimum.  
 um cum medium primum, secundum, sextum, at-  
 que octauum, terminos habet, eisdemq; non pa-  
 riratione committitur, cum aliis simis, aliis gib-  
 bis lateribus existat. Verum latere inferiore cum  
 tertii, tū quarti, postbrachialis ossium portione  
 fulcit. Demum octauum, quod est altissimum: Octauum.  
 reliquis lateribus secundo, tertio, ac septimo co-

## Epilogus.

Brachialis of-  
sa obscure  
mouentur.

Brachiale mo-  
uet manum  
ad latera in  
prorum &  
supinum re-  
cta.

Articuli bra-  
chialis cum  
radio secum,  
& cum post-  
brachiali qua-  
lis.  
Totius bra-  
chi alius de-  
scriptio &  
usus.

Ligamentum  
ex processu  
octaui ossis.

Brachiale ex-  
terius quale  
& cur tale.

pulatur: at inferiore parte basim præstat quarto  
& quinto postbrachialis ossibus, quibus cum idē  
coarticulatur. Atque hi sunt veluti quidam ter-  
mini, quibus brachialis ossa discernuntur, ac etiā  
cum inter se, tum vero cum aliis uniuntur. Bra-  
chialis ossa motu non carent, tamen si nullus iis  
adeft musculus peculiaris eorum motus auctor:  
& ob id obscurus cēsetur, ac sensus nostros omni-  
no latet. Totius vero brachialis motus in agen-  
do extremam manum, tum ad latera, tum in  
prorum, atque supinum rectā consumitur. Huic  
edendo motui præsto sunt musculi, de quibus loco  
agetur suo. Quamobrem dicimus Brachialis of-  
sa cum radio per *Diarthrosim* secum inuicem,  
per *Synarthrosim*, cum postbrachialis ossibus,  
partim per *Synarthrosim*, partim vero per *Di-  
arthrosim* esse cōiuncta. Caterū brachiale parte  
interiore latū, ac profundum sinum habet, quo  
excipit nō paruos musculorum tendines in digi-  
torum articulos inferendos: ibique claudit, ac ne  
defluant quodammodo continet validum liga-  
mentum, quod ex processu longo octaui ossis pro-  
ducitur, ac in latiusculum quinti ossis portionem  
e regione illi positam inseritur. Hic autem pro-  
cessus introrsum pendet, ut ad hoc veluti munus  
paratum sese ostendat. At exterior brachialis  
pars tendinibus quidem substrata est ad digitos  
extrinsecus adēntibus, nihilominus gibba est, ne-  
que cavitatē ullam insignem præ se fert, quādo  
illi

illi ipsi tendines cum longe minores interioribus existant, minus quoque spatij occupare debuerunt ac praterea decuit externam regionem in circumlarem formam diduci, internam vero in planū redigi. Veruntamen ab extrinseca brachialis regione prodeunt quatuor ligamenta, quæ dictos tendines vinciunt, ac in sua sede continent: de quibus alibi dicemus. Scire licet hæc ossicula, quamuis exigua sint, ac dura: non tamen solida prorsus existere: cauernulas enim intus habent medulla oppletas, inter quæ durissimum, ac pene solidum est, quod quarto loco numeratum fuit: cui addendum existimo, quod Gal. asseruit, nimirum ossiculum id sinu quodam esse præditum, in quem immitteretur processus ille styloides ab vlnæ capite productus: de quo superiore capite mentionem fecimus. Sed hoc in humanis locum minime habet, in quibus neque ossiculum id vlllo sinu donatur, quod prope sphericum est, neque styloides ad illud pertingit. Virumque tamen in simia perbelle obseruatur.

De postbrachiali. CAP. XXVI.

**P**ARTEM, quæ cum brachiali sequitur, & ad digitos terminatur: nos cum ceteris Anatomicis postbrachiale dicemus, quam Græci *μετακαρπιον* vocant: quamquam nonnullis hac voce libuit manum vniuersam brachiali excepto intelligere. Postbrachiale autem ex Gal. ac Vesalij sententia quatuor ossibus constituitur, qui-

Quatuor ligamenta a brachiali parte extrinseca vsus. Ossia brachialis non sunt solida.

In simia verificatur quod Gal. dicit de sinu quarti ossiculi.

*μετακαρπιον* id est, postbrachiale quid. Metacarpis quid aliquib. significet. Postbrachialis ossa sunt quatuor Gal. & Vesal.



Primus articulus pollicis potest numerari cum ossibus postbrachialis.

Tractat de primo pollicis articulo hoc cap.

Primus articulus pollicis iungitur quinto ossi brachiali per arthro dium sub diarthrosi.

Quomodo referri ad Arthro dium sub Enarthrosi possit horum ossium articulatione. Secundum os postbrachialis.

Tertium os postbrachialis.

Quartum os postbrach.

bus tamen si quis adnumeret primū pollicis articulum non incongruum fuerit: quando illud os statim brachiali succedit, ac non minus eidem committitur, quam faciāt reliqua postbrachialis ossa, licet laxior sit huius, quam ipsorum articulatione: ex qua item evidentior motus editur. Verum quicquid est, siue quinque ossa hac, siue quatuor numerentur, nobis placet in horum explicatione tractare quoque de prima pollicis articulatione, ut ostendamus illum cū quinto brachialis esse per diarthrosicos speciem, que arthrodia dicitur, coarticulari: quamquam pro ratione ipsorum ossium, que parua sunt, huiusmodi articulatione ad enarthrosim referri posset. Nā quintum brachialis os ea parte sinum satis insignem habet, atque in angulum excavatum: in quem caput articuli quoquo modo oblongum, & versus anteriora protensum immittitur. Secundū postbrachialis os, quod Gal. primum est, in angularem sinum altum terminatur parte quidem superiore, qua excipit protuberantem sexti ossiculi brachialis partē: atque interim latus coniungit quinti ossis lateri, cui eo modo adhærescere videtur. Tertium in sinum desinit, ac parte interna, que ad pollicem spectat, in processum veluti oblongum protenditur: cuius superficies asidet sexto brachialis ossi: quod reliquum est eius sinuati capitis, cum septimo coniungitur. At quartū capite est quadrato, quod duobus insidet ossibus.

nam cum septimi, tum etiam octavi partem occupat: quæ iuncta planâ sedē quodammodo huic plane capiti efformant: licet intrinsecus id aliquantulū declue fiat. Vltimum similiter caput quadratum habet: paulum tamen ad exteriora tendit, atque ad extremā vltimi brachialis ossis portionē adhaerescit: atque ad hūc modum postbrachialis ossa cum brachialis ossibus componuntur. Verum infra cum digitorum articulis vno, ac eodem modo articulantur. In caput enim rotundum omnia desinunt, quo leuiter excauatam subsequentiū articulorum superficiem laxa articulatione subeunt. Ossa hac quatuor primo pollicis excepto a capite priore intus, extraque attenuantur ad mediam vsque regionem: inde vero crassiora fiūt, ac interna presenti regione angularem lineam cōstituunt, quæ per medium secundum longitudinem ipsorum ducitur, quæ facta est pro musculorum ibi existentium ratione, quibus musculis parare etiam oportuit commodam sedem, ne vola nimia mole ad comprehendendum minus idonea redderetur. Idcirco ossa hac hinc inde attenuata sunt, & ita interualla non modica musculis occupanda prabuere: quorum musculorum enarrationem suo loco tractemus. Adhac, postbrachialis ossa intus simulant, extra vero gibba, infra supraque appendicibus nuniuntur: ex quibus ligamenta fluunt, quorum gratia ossa hac inter se vtrinque necesse sunt;

Vltimum os.  
postbrach.

Postbrachiale supra cū ossibus brachialis infra cum articulis digitorum iungitur.

Descriptio  
quatuor ossium  
postbrachialis  
pollice excepto.

Lineæ angularis vsus.

Cur ossa postbrachialis sint attenuata hinc inde interna parte.

Figura ossium  
postbrachia.

Appendicum  
ossium postbrach. vsus.

intus quoque cavitatem non paruam, & medullare fertam habent.

## De Digitis. CAP. XXVII.

**S**VPEREST ut de digitis iam dicamus: ut tandem absoluta ossium manus fabrica tradatur. Digitorum ossa quindecim illi numerabant, qui primum pollicis articulum a postbrachiali disiungunt, singulis digitis terna internodia tribuentes; qui vero eundem inter postbrachialis ossa recensent, sicuti nos fecimus, duobus tantum articulis pollicem donant, atque quatuordecim solummodo statuunt digitorum ossa: ut interrim ungues missi fiant, quos in tractatu de cartilaginibus coniciemus: atque etiam sesamina ossicula, quibus postremum caput dedicauimus. Ossa igitur digitos constituentia substantia dura sunt ut innumeris functionibus quibus manus parata esse debuit, prompta & absque noxa vteretur.

Ossa digitorum quibus quindecim sunt. & quibus quatuordecim.

De vnguibus tractabitur libro de cartilaginibus, De sesaminis hoc lib. cap. ultimo. Digitorum substantia qualis & cur talis.

Ossa digitorum non sunt solida contra Gal. Ossa digitorum in similibus & leonibus cavitatem habent. Quid Gal. de cepit in substantia ossium iudicanda.

Differentia ossium digitorum:

Non prorsus tamen solida sunt, quemadmodum Galeno placuit: cum non minus insignem cavitatem habeant, quam diximus inesse in postbrachialis ossibus, qua cavitatem simiarum quoque digitorum ossa minime destituuntur, & quam in leonibus ipsis adnotauimus. Galenus vero solam ipsorum paruitatem considerans solida esse certoputauit: neque articulum aliquem fregit, ut periculum faceret, an internus sinus adesset, in quo medulla seruaretur. Ex his alia sunt longiora, alia breuiora: quadam crassiora, quadam etiam te-



nuiora conspiciuntur, pro digitorum, articulo-  
rumque ratione: nam digitis crassioribus crassio-  
ra quoque ossa merito obtigerunt: atque etiam quo  
longiores idem, aut breuiores sunt, eo breuiori-  
bus, longioribusve ossibus donantur. Similiter  
articuli primi maiores sunt secundis, secundi ve-  
ro tertius, tertii autem omnium minimi sunt. Prae-  
terea ossa hac duplici forma sunt praedita: in qua-  
rum altera articuli omnes conueniunt, alteram  
vero, & multum priori dissimilem, sibi tamen  
communem articuli ultimi obtinent. Etenim  
horum ossa ceteris sunt depressiora. Cumque in initio  
latiuscula sint, quo magis progrediuntur, eo ma-  
gis attenuantur, angustioraque fiunt donec cerui-  
cem superposito capitulo, in quod desinunt, prae-  
parent: id autem capitulum longum, ac rotun-  
dum unum existit, verum primus pollicis articu-  
lus, itemque primus, & secundus aliorum digito-  
rum, initium ac finem crassius habet, quasi duobus ex-  
tremis capitibus constet, quorum superius maius  
est inferiore: at in toto deductu, qui a priore ad  
alterum sit caput, semper tenuiora redduntur. Ita  
vero ossa exterius curua sunt, ac teretia, sed in  
interna regione plana, & quodammodo sima: neque  
id temere factum: siquidem interna veluti cavitatem  
opus erat, cui superstrati esse debuerunt iedines non  
exigui, ac rotundi, qui & magnitudine, & ro-  
tunditate sua eiusmodi planitie implent, atque eo  
modo terete non digitorum formam faciunt: alioqui

Forma ossium  
digitorum.

Ossa digitorum  
desinunt in  
capitulum.

Cur ossa digi-  
torum interna  
regione  
sint plana.

Cur digiti  
sint teretes &  
plani interna  
regione.

Cur ossa digitorum extra sint curua & teretia.

Ortus ligamentorum ex lineis quæ sunt in interna regione. De articulatione digitorum.

Gal. error.

Ossa digitorum iunguntur cū postbrachiali per enarthrosim. Articulationis digitorum ratio. Vesalii error confutatur.

nimia moles in didem extuberasset, illosque minus idoneos ad apprehendendū reddidisset: præterquam quod non æque commode suis sedibus tendines, eo porrecti adhaesissent, sed in hanc, atq; illam partem potius declinassent, siquidem gibba fuisset interna hæc digitorum regio. Secus autem in externa contingit: nam illuc membrana ritu tendines subtilissimi producuntur: propterea curua, & teres esse debuit, ut digitorum quam præ se ferunt venustati consuleretur. Interna item regione notabis lineas quasdam utrinque per longitudinem ductas, unde ligamenta ortū habent, quæ iam commemoratos tendines complectuntur, ut firmitus in sua sede maneant. Et hæc quo ad ossium digitorum figuram. Porro sic illa articulantur, ut alia suscipiant tantum; alia tum suscipiant, tum suscipiantur: ut obiter colligamus veram non esse Galeni sententiam, cum voluit prioris ossis caput in subsequenti sinu semper inseri. Nam prima digitorum ossa superne per enarthrosim cum postbrachiali iunguntur: etenim ipsorum capita sinuata sunt, & cartilagine incrustata, quibus rotunda postbrachialis ossium capita succedunt, quo articulationis genere facile præstatur, ut digiti in omnes partes moveri possint: necnō etiā circularem motū edere, quamquā Vesalius minime concedit: at leui opera quilibet experiri potest, si digiti circulari linea circini more obducatur. Inferiore parte duo  
paruula

paruula capita utringq; prominent angulari quodam sinu illa dirimente. Hunc sinum media sequentis ossis capitis portio protuberans subit: capita vero in illius sinus utrimq; exculptos inseruntur. Quo fit, ut hac internodia & suscipiantur, & suscipiant, cum priora dumtaxat susciperent. Illum ideo articulum ad enarthrosim regulimus, hunc vero ad ginglymum, quod articulationis genus in aliis pariter internodiis observabis, quae omnia cartilagine sua infarciuntur: ut quouis momento prompta, & lubrica magis in edendo motu articulatione reddatur. Ad haec digitorum ossa suis utrimque appendicibus munita sunt, exceptis ultimis, quorum pars inferior cum articulatione non egeat, neque eguit appendice: cuius tamen superficiem ungues ipsi obtegunt. Horum ossium, simul etiam digitorum vultus, prae terea cur ex tot, tamq; variis articulis constructi fuerint: neq; ex plurib; paucioribus ve, aut alius modo constare potuerint, longum esset recēdere: quae tamen si quis nosse velit, Galenum legat primo & secundo de Part. usu, ad amussim hac multa cum admiratione tractantem. Illud vero obiter scias eiusmodi ossa talem inter se structuram & portionem adeptam esse: ut licet, alia breuiora, alia sint longiora: ad rectam tamen lineam, & aequalem digiti omnes perducuntur: cum ad aliquod sphaericum apprehendendum mutuam conferunt.

Quae internodia per enarthrosim, & quae per ginglymon articulantur.

Cur internodia sint cartilagine obdita.

Quae ossa digitorum appendicem habeant, & quae non & cur. Ungues quid faciant.

Gal. primo & secundo de Usu Part. docet exacte constructionem & usum digitorum.

Gal. laus.

Digitales licet inaequales coeunt tamen cum aliquo sphaerico, est apprehendendum.



## De Ilium osse. CAP. XXVIII.

**O** Illud, quod transversis sacri ossis processibus committitur, et si unicū in adultis esse videatur, cum id nulla linea interfecet: perinde tamen censetur, ac si triplici ex osse constaret.

Idem os in  
pueris & iu-  
uenibus tri-  
plex videtur.  
in aliis unū.

Os iliū quid  
vocetur.

Os pubis  
quid vocet.

Os coxendi-  
cis quid vocetur.  
Vnus ilij, pu-  
bis, & coxen-  
dicis.

Basis ossium.

Tria ossa quæ  
cum sacro co-  
municantur nō  
mouentur.  
Id est circa  
igla.

Constare autem cernitur in pueris, & iuuenibus triplici linea cartilagine oppleta illa tunc distinguente: ea propter tres in partes diuidi solet triaque diuersa nomina sortiri: nam suprema eius pars omnium latissima, qua cum sacro coniungitur, ilium os ab omnib. appellatur: anterior, quæ & ipsa lata, minus tamen quam superior, ac vtring. foramen amplum habet, pubis os vocatur: quæ vero media, & angustior quidē, sed crassior, & extrinsecus in magnū, ac profundum sinum excisa, coxēdicis os dicitur. Duo autē sunt huiusmodi ossa singula scilicet vtring.: quæ quāquam sacro apposita sunt, dorsi tamē scapula vsui proportionē videntur respondere. Hæc enim femur non aliter, atque ille humerum, excipiunt, nec non etiam variam muscutorum originem, insertionemque. Verum sacro iuncta vniuersa ossium compagi per necessariam illam basim suggerunt, de qua capite de sacro osse loquuti sumus: nam cum hæc perpetuo maneant, ac nullo umquam motu sint pradita, circa ipsa reliqua omnia moueri iure optimo debuerunt: id quod facile attestari possumus, cum vigeamus superiorum partium, ac inferiorum motus sigillatim percurrentes omnes

mnes tandem in hac ossa veluti ad centrū quod-  
 dam terminari. Enimvero ilium ossa ita ipsi sa-  
 cro committuntur, atq; adeo pertinaciter inhae-  
 rent, vt connata prorsus esse videantur: & nos  
 adhuc ostendere sacri ossis compagem possumus,  
 quam domi data opera diligenter in studiosorum  
 gratiam asseruamus: cui sinistrum ilium os vsq;  
 adeo conatum est, vt nulla ratione diuelli possit:  
 eadem quoq; inter se parte anteriore vniuntur,  
 ac peluis imaginem elegantissime conformant,  
 quae utero, vesicae, ac intestinis tutius continen-  
 dis a natura parata est. Atque hos potissimum  
 vsus illū ossa praestant, aliis interim omnis, quos  
 opportunius alibi recensebimus. Horum ossium  
 figura varia est, siquidem parte posteriore lata  
 sunt, duobusq; latis sinibus insignita, in quos ta-  
 men curuari potius, quam excindi videntur:  
 quando videre est partes ab altero latere hisce sini-  
 bus oppositas protuberare, ac gibbas fieri, vbi  
 multae asperitates visuntur, extrinsecus praefer-  
 tim musculorum nexib. percommode seruientes.  
 Huius partis suprema regio semicirculari linea  
 obducitur: quae secundū totā sui circumferentiā  
 appendice munitur: cuius sedes, quoniam aliquan-  
 tum extra prominet, ideo spina dicta fuit: ab hac  
 praecipue ligamenta fluunt, & eorū musculorū ex-  
 ortus: qui nates constituunt, deorsumq; in femur,  
 ac tibiā, & etiam sursum ad thoracē, ac deorsum  
 feruntur. Qua enus autē cū ossē sacro copulantur,

Ilium ita sa-  
 cro haeret, vt  
 connatum vi-  
 deatur.

Ossailium  
 pelui similia.

Iliorum vsus.

Iliorum figu-  
 ra.

Asperitatum  
 in iliis vsus.  
 Superioris  
 partis ilij de-  
 scriptio,

Spinae in iliis  
 quid, & eius  
 vsus.

Natura Indu-  
ctia in con-  
iunctione ili-  
orum cū sa-  
cro.

Cartilago  
glutinis mo-  
do.

Cur ad sym-  
physim posi-  
tus quā ad Gin-  
glimō redi-  
genda sit cō-  
positio illi cū  
sacro.

Coxendicis  
descriptio.  
Cur crassissi-  
mum.

Vfus coxen-  
dicis acetab-  
ula.

Cartilago ve-  
stiens acetab-  
ulū.

Articulatio  
femoris cum  
coxendice  
proportione  
respondet ar-  
ticulo hu-  
meri cū sca-  
pula.

*natura mutui ipsorum congressum excogitavit, ut is validior, ac pertinacior foret. Quamobrem transversis sacri processus sinibus partim amplis, ac profundis, partim etiam levibus excisi sunt, inter quos extuberant partes. Similiter ilium ossa & sinus, & tubera a se ferunt. Horum ergo sinus sacri tubera excipiunt: eminentes autem partes illius pariter sinus ingrediuntur, quam unionem intercedens levis cartilago glutinis modo continet. quae quamquam eodem fiat modo, quo solet, cum ossa ginglymo articulatur: cum tamen nullus ex ea motus proficiatur, symphysi magis subiiciemus: & haec est partis superioris descriptio. Quae autem ab ea versus anteriora discedit, mediumque ossis spatium occupat, cui nomen os coxendicis inditum est, crassissima facta fuit, ut commode sinus ille amplus, ac profundusingeretur, in quem immittitur longum, ac rotundum femoris caput: ideo sinus iste acetabulum nuncupatur, qui tamen cum non adeo profundus esse potuerit, ut plene femoris caput contineret: cartilaginem eo modo adiacere oportuit, quo adhibita est, ubi humerus cum scapula coniungendus fuit: sinus iste non solum partem coxendicis, verum & ilij, & pubis occupat. Nam praeter eam cartilaginem, quae crusta ritu circumdatur tam femoris capiti, quam acetabulo: exurgit ex labris ipsius sinus crassa quaedam, & circularis cartilago, quae acetabuli capacitatem auget, atq.*



ita complectitur altum femoris caput, ut ne de sua sede egredi, luxariue tam facile possit: atque ut huiusmodi capitis insertio firmitus in eodem acetabulo resideat, e medio eius incrustatae appendicis teres, ac validum ligamentum nascitur, quod in medio sinu figitur, sicque articulationem hanc alioqui laxam maximopere colligat, continetque. Pars inferior, quæ ilium, coxendicisque os intersidet, ingenti sinu donatur, qui ad utrumque latus patens. & peruius, ac inferne abruptus dehiscit: atque hic utriusque ossis communis esse videtur, quem ideo paratum animaduertimus, quod illac pateat aditus pluribus, nec exiguis nervorum surculis a spinali medulla per sacri ossis foramina profluentibus: qui non inde procul in unum coeunt nervum omnium nostri corporis nervorum maximū, qui per penitissimos femoris musculos delatus ad crus disseminatur, sicut alibi ostendemus. Ab hoc sinu cum recesseris versus anteriora, exurgit processus quidam acutus: unde ligamentum prodit in sacrum os inferendum, paratum ut claudat anum, atque nervum illum maximum, de quo paulo ante diximus. Præter hunc processum iuxta coxendicis basim alter adest sinus, latus quidem, sed humilior, ac rimis quibusdam intersectus, cui inhaerent tendines quatuor in suo ipsorum musculo, tanquā in crumena recoditi: qui tandē in unum coeunt in femur inferendum. Inferior coxendicis

Acetabuli descriptio.  
Carrilago circularis augēs acetabulum & cur.  
Ligamenti in acetabulo finis & usus.

Sinus inter ilium & coxendicem.

Sinus usus.

Nervi maximi ortus & iter.

Processus acutus.

Sinus iuxta basim coxendicis usus.

Tendines quatuor contenti in suo musculo, tanquā in crumena.

Cur crassissima sit pars inferior coxendicis.

Cur basis coxendicis habeat appendicem.

De ossibus pubis.

Foramen pubis.

Quomodo os dextrum pubis cum sinistro iungatur.

Ossa Pubis in partu dehiscere ridiculum est dictu.

Os coccygis in partu retrahitur.

In osse pubis differunt maris a feminis. Quomodo distinguantur ossa pubis feminæ a maribus.

portio crassissima est, quam basim propterea paulo ante nuncupauimus. Hac una ex omnibus coxendicis ossis partibus appendice donatur, unde tres musculi tibiā flectentes enascuntur. Superest nunc, ut anteriorem partem, quæ os pubis nominatur, absoluamus. Ergo pubis ossa supra, infraque tenuiora sunt ceteris: quo autem magis ad medium accedunt, eo magis attenuantur, usque dum in amplissimum foramen desinunt; superne iunguntur, ac dextrum cum sinistro multa cartilaginis interuentu coalescit: quem nexum adeo tenacem, ac solidum offendimus, ut difficillimum sit cultro, aut scalpello abscindere.

Propterea risu magis, quam reprehensione digna illorum sententiam iudicamus, qui proferre in vulgus non verentur, ossa hæc in partu laxari, atque dehiscere, ut facilius exeat fœtus. Nulla enim ratione dimoueri possunt: tantum abest ut laxiter aperiantur: verum autem id est de coccygis osse, sicuti supra suo loco dictum fuit. Illud enim certum est retrahi, ac eo modo parietibus non parum auxiliari: neque de hac re ambigere quisquam debet, quando virumque facili experimento comprobare licet, si tactus adhibeatur. Porro scitu dignum est, ossa hæc in maribus non ita ampliter produci, ut in mulieribus, in quibus latius hæc patent, & capaciora multo sunt, & quā diximus pelvis similitudinē tenere. Animaduertendumque est hinc facile discerni posse

posse foeminarum ossa a virorum ossibus. Horum enim supra, infraque strictiora, angustioraque sunt, illarū vero ampliora: ut facilius credatur ossa pubis minime dilatari, quando si aperiri possent frustra ipsa natura differentiam hanc constituisset, ut latius hac, quam illa pateret. Ceterū ab ea quae sit per cartilaginē cōiunctione, quo magis deorsum tendunt, eo etiam magis, ac magis disiunguntur: ut vacuā ibi sedem subsistentibus testibus, ac peni relinquunt. Ex superiore parte, qua ossa pubis coniunguntur, quaque aspera sunt, ac gemino tuberculo abundant: exoritur tum recti abdominis musculus, tū etiam illi, qui ad femur; tibiamque deferuntur. Nec non illuc inferuntur abdominis musculi oblique descendentes inferiore vero, quemunitur appendice, producuntur musculi penem sustinentes, cuius corpus statim sub ipsa ossium unione asfigitur. At foramen illud, quod in medio est amplissimum, lenitatis potius, quam alius rationis gratia factum, implēt duo musculi, internus, atque externus, qui deorsum tendunt, & in femur implantantur, eius circumagendi munere fungentes: inter quos media est membrana non leuis, & foramen identidem obturans. & alterum musculū ab altero distinguēs. Per huiusmodi foramē Anatomici imperiti putāt seminaria vasa ad testes descendere: sed falluntur, quādo illa musculū abdominis perforāt, ac super hac ossa ferū-

Ossa pubis  
nō dilatari.

Cur ossa pubis deorsum  
disiunguntur.

Qui musculi  
ex superiore  
parte pubis  
orianantur.

Pubis inferior pars appendicem habet.  
Situs & origo musculorum sustinentium penem.  
Foramen in medio ossiū pubis cur factum.  
Membrana inter musculos circumagentes femur.  
Error anatomicarum de viū foraminis pubis.



Iter vasorum  
seminariorū.  
Sinus vasorū  
seminarium  
non est in of-  
sibus pubis  
mulierum.  
Substantia of-  
sium quæ cō-  
mittuntur cū  
sacro qualis.  
Foramina  
pro nutrime-  
ti delatione.

tur, ubi sinus quidam oblique declinis adest, per quem demittuntur simul tam deferentia, quam preparantia vasa: qui sinus in mulieribus non reperitur & hac potissimum differentia ossa mulierum a virorum distinguuntur. Atque ad hunc modum se habent ossa, quæ cum sacro committuntur, quorum substantia non multum ab ipso sacro diuersa est: fungosa enim plurimum sunt, nec nimis dura, foraminibus crebris referta, per quæ nutrimentum allatura vasa perducuntur.

## De femore. CAP. XXIX.

Homo & Si-  
mia habent  
os femoris  
maius aliis  
ossibus.  
Femur est bre-  
uius tibia in  
aliis animalibus  
ab homi-  
ne & Simia.  
Femur in ani-  
malibus iux-  
ta clunes:  
In animalib.  
quod vulgo  
femur credi-  
tur est tibia.  
Aristotelis er-  
ror, qui ponit  
humerū lo-  
co cubiti.  
Aristor error  
existimantis  
aves carere fe-  
more.  
In avibus vbi  
fit femur.  
Cur in omni-  
bus fere qua-  
drupedibus  
femur est bre-  
uius tibia.

**F**EMORIS OS tum humanum, tum etiam simiarum reliqua ossa omnia magnitudine superat. Cetera vero animantia femur ipsum brevius multo quam tibia habent, in qua fortasse nonnulli decepti sunt, existimantes in brutis femur illud esse, quod extra primum articulum constituit, neq; considerant id ipsum in animalibus iuxta clunes latitare. Ea vero pars, quæ primo sese exerit, non femoris est os, sed tibia. In quo item errore versatus est Aristoteles, qui non contentus cubiti loco humerum ponere, sicuti supra etiā capite de Humero diximus, propriam & femoris, & tibiæ sedem ignorasse, palam fassus est: quādo asserere nō dubitavit, aves femore destitutas esse, quod omnino falsum est: siquidem illæ femur habent, verū id delitescit, quemadmodū in omnibus fere quadrupedibus, in quib. brevius esse oportuit, cum longius situs, in quo residet, mi-

nime

nime patiatur: secus autem in simia, homineque contingit. Propterea os tibiae & his duobus femoris, & ceteris ossibus longe maius existit, illud supra cum osse coxendicis, ilij, pubis: infra vero cum tibia articulatur; cuius figura longa est, & teres, ac non usquequaque recta. nam media probe regione curuatur, anteriore quidem gibbum, posteriore autem, ac exteriori simum, superne in caput crassum, rotundum, & cartilagine incrustatum desinit, longiorem cervicem obtinens, quae sursum alte protenditur ad interiora plurimum incumbens. Caput autem huic praepositum cervicis ab orbiculari appendice fere totum efformatur & coxendicis acetabulum subit: quae articulatio validissima esse debuit, propter immensum pondus, quod femori sustinendum fuit. Idcirco natura non modo altiorem insertionem effinxit, & cum profundo acetabulo cartilaginem composuit, ut ipsum adauctum, altiusque redditum femoris caput facilius susciperet: verum etiam tere-tem, ac robustam copulam paravit, quam e sinu quodam non levi in medio pene capitis vertice, magis tamen versus interiora produxit: atque id in acetabuli fundum immittendum curavit vinculi, ac firmamenti validioris gratia. Quae cum ita habeant, eos refellere merito possumus, qui huius articuli luxationem minus integram putantes, notham illam, mentitamque vocarunt: cum perfecta; veraque sit, in qua saepenumero accidere

Cur homo & Simia habeant femur maius tibia.

Femur cum quibus articuletur. Femoris figura.

Cervix

Caput

Cur articulus femoris cum coxendice sit validissimus.

Cartilago vestit profundum acetabuli coxendicis. Ligamentum femoris cum acetabulo quale.

Luxatio articuli femoris cum acetabulo legitima est contra quosdam.

Cur difficile  
restituatur  
luxatio arti-  
culi femoris.

Processus fe-  
moris in nu-  
per natis vi-  
dentur appē-  
dices.

Processuum  
femoris de-  
scriptio.

Γλῶττον quid  
Τροχαντῆρες  
quid.  
Processuum  
femoris uti-  
litas.

Processus fe-  
moris quo-  
modo iungā-  
tur.  
Vnde femur  
teres.  
Quid efficiat  
cap. interiora  
femoris.

solet, ut ligamentum illud laxius, & prolixius fiat, unde restitutio difficilis admodum redditur. Ab ipsa ceruice statim os istud in portione quandam latiusculam descendit, ex qua processus duo veluti nodi educuntur, qui in nuper natis appendicum naturam tenent, cum facile diuellantur. Temporis autem progressu ita cohererent, & cum partibus unde prominent, confunduntur: ut ne signum quidem appendicum ostendant. Itaque femoris processus numerantur, quod ad posteriora magis vergunt: alter tamen alteri superior est. Superior extrorsum spectat, & maior existit, inferior vero longe minor est, ac in interna sede potius: maiorem Γλῶττον Graci dixerunt: ambos vero Τροχαντῆρας, quasi rotatores dixeris, cum videlicet rotando femori facti esse videantur. Etenim eorum musculorum insertionem admittunt, quorum opera femur tum extrorsum flectitur, tum circumagitur: quāquam praterea octauo musculo tibiā flectenti originē suppedient. Parte posteriore linea quadam emittens ab externo ad internū ducta hos ipsos processus simul iungit: hinc femoris os teretem formam sumit. Cumque mediam regionem transferit, crassum magis efficitur, quo magis descendit: necnon etiam dilatatur, atq; introrsum magis deprimatur, ac tandem in duo magna capita exit: aspera illa quidē extrinsecus, at in superficie leuia, leui quodāmodo crusta peructa, quae ma-



na appendicis interuentu constituuntur. Non  
 parvus (inquit Galenus) sed ingens quidam, ac  
 profundus sinus, & asper capita ista, parte poste-  
 riore non exiguo intervallo disiungit: parte item  
 anteriore sinum leuiter depressum communem  
 habent, cui innititur os quoddam orbiculare,  
 quod Molam nominant, de quo suo loco dicitur.  
 Hæc capita a se prorsus inuicem differunt: nam  
 anterius crassius est, exterius autem latius, ac de-  
 pressum magis, idque ut ne ambo cum tibia æ-  
 qualiter inarticularentur, atq; obliquus motus  
 di posset, cum tibia præsertim ad exteriora fle-  
 tenda veniret: cui motui destinatus est muscu-  
 lus sub poplite delitescens, qui ab externo iam cō-  
 memorato capite nascitur, extrinsecus scilicet  
 versus posteriora, ubi pars quadam inest aspera,  
 & sinulis quibusdam impressa. Atque hæc dili-  
 enter intuearis Lector optime: nam huius mu-  
 culi munus non satis recte perpendit Vesalius,  
 um minime nosse posset, quomodo tibia in obli-  
 quum adduceretur: iam vero femur infra cum  
 tibia per Ginglymum componitur: superius enim  
 tibie caput duobus sinibus refertū est, inter quos  
 ducitur tuber eminens. Capita vero infimi fe-  
 moris tibie sinibus inhaerent: at eiusdem femoris  
 posterior sinus mediam portionem tibie eminē-  
 iorem excipit, unde fluit ligamētum validum,  
 quo arctissime femur cum tibia colligatur, nō se-  
 us ac superiore articulo fiebat, ubi per Enarthro-

Gal. de rima  
in femore.

Vesalius deci-  
pitur in mus-  
culo flecten-  
te tibiam ad  
exteriora.  
Femur com-  
ponitur cum  
tibia infra per  
ginglymou.

Origollga-  
mentum femo-  
ris cum tibia  
infra.

Femur copu-  
latur coxen-  
dici per enar-  
throlum.

Cur ligamen-  
tum iemoris  
supra infrag;  
sit dignum  
annotatione.

De Ligamen-  
tis priuatum  
aget.

Linea quæ  
est in p. co-  
riore femore  
delineatio.

Octauus mu-  
sculus femo-  
ris est omniū  
maximus.  
Quomodo  
recti stemus.  
Asperitates  
ab insertione  
musculorum.  
Femoris vius.

Cur cavitās  
femoris sit.  
magna.  
Vena.

*sim femur coxendici committitur eo, quo supra  
diximus modo. Hoc autem ligamentum teres,  
quo femur supra infrag, insignitur, articuli deti-  
nendi gratia, in aliis articulationibus minime  
reperitur. Idcirco obseruatione dignum est: neq;  
enim ob id hisce desunt communia cæteris liga-  
menta, quæ extrinsecus obducta partes coheren-  
tes inuestiunt, & undique colligant: sed de his  
priuatim agemus. Præterea notanda est linea  
quadam insignis, multumq; aspera, quæ in poste-  
riore femoris regione prominet, nec procul ab in-  
terno rotatore incipit, ac per longitudinem eius-  
dem regionis desertur: deinde ultra medium in  
duas partes scindi, & caput utrumq; petere vi-  
detur, sed ad externum euidentius terminatur.  
Huic lineæ inseritur, ac tenaciter adhærescit o-*

*ctauus femoris musculus omnium nostri corporis  
maximus, cuius beneficio recti stamus. Alia ni-  
hilominus ibi adsunt asperitates, ac nonnullæ et-  
iam impressiones, musculorum tantum occasione  
fabrefactæ, ut suo loco patebit, ubi musculi tam  
femur, quam tibiam mouentes describentur: fe-  
mur & sistimus, cū recti stamus, & quaque ver-  
sum agimus: nullū enim motionis genus illius cū  
coxæ dice articulatione excludit, quæ admodū in se-  
ipso quicumq; experiri facile potest. Os id amplif-  
simum sinum habet intus, quo leuius sit, & me-  
dullam multam pro nutrimento seruet. Huc sci-  
licet pertingunt vena per summam, imamque*

praesertim ipsius ossis partem plurimis locis perforatam. De femore satis: nunc de tibia, fibulaque.

## De Tibia. CAP. XXX.

**Q**UAE AD MODVM inter humerum, ac summam manū ossa duo descripsimus, quae iuncta cubitum constituiebant: ita a femoris osse ad extremum pedem regio duplici osse constructa pertinet: quae modo tibia, modo cruris nomine donatur. Alterum os, quod maius est, totius nomine tibiā nuncupamus: alterum vero longe gracilius quandoque suram, quandoque fibulam vocamus. Tibiam Graeci <sup>κνήμην</sup>, fibulam vel <sup>ῥαχίον</sup> <sup>ῥαχίον</sup> appellant. Tibia ea magnitudine praedita est, ut vel humerum superet, quem tamen Galenus omnium ossium maximum, excepto femore, credidit. Hac infra supraque appendicem habet: superior ipsius pars latior est, & crassior: tuos sinus leuiter inque superficie sortita est, inter quos currit tuberculum quoddam prominens, utque asperum. Hisce sinibus excipiuntur imae femoris capita, in quibus ne incommodius insident, cum praesertim depressiores sint, quam cauitum altitudini conueniat. Natura praeter cartilagineam crustam utriusque sinui affixam, alteram opposuit mobilem: cuius figura lunam imitatur, & nostrum C similitudine refert, initio ac circa inuicem oras crassior: quo vero introrsum magis entrum recipitur, eo tenuior semper fit, prius uide desinens, quam centrū attingat: ita sinuū

Tibia & fibula proportionē respondēt cubito & radio.

Tibia idem quod cruris. Cruris os maius tibia quoque dicitur. Fibula est os gracilius cruris.

Idem sura & fibula <sup>ῥαχίον</sup> <sup>ῥαχίον</sup>.

Tibia est maior humero.

Humerus non est maior tibia contra Gal.

Femur reliqua ossa magnitudine excedit.

Tibia habet appendicem utrinque.

Sinus.

Tuberculum.

Sinuū vsus.

Crusta cartilaginea.

Cartilaginīs lunatae figura & vsus.



profunditatem maiorem relinquit, ad quam augendam potissimum facta esse videtur: quanquam quod lubrica est, levis, mollis, & vinctuose humiditatis plena, ligamenti vice fungitur, & articuli mobilitatem plurimum adiuuat. Accedit etiam non minimum firmandi huius articuli adiumentum. Nam id tuber, quod e media tibia superficie emergere, & alterum sinum ab altero dirimere conspiciamus: in amplum sinum immititur, qui partem posteriorem utriusq; femoris capitis intercipit, ibiq; valido ligamento vincitur: quod ligamentum ex tuberis apice prodit, & in medio sinu impense admodum infigitur, atque

Cartilago lunata ligamenti vicem gerit in tibia. Quomodo articulo tibiae cum femore robur detur.

Tibia deorsum versus triangulum imitatur. Cur tibia tribus praecipue partibus incuruetur.

Quomodo fibula tibiae agglutinatur. Sinus vasa excipiens.

Musculorum tibiae extendentium insertio.

ita articulus omni ex parte probe munitus in sua sede continetur. A superiore hac parte deorsum procedens tibia sensim attenuatur longioribus lineis, ac sinibus variis distincta ita ut triangularem formam imitetur: at oblique tendit, ac tribus praecipue partibus incuruatur, perspicue cedens musculis illac descendantibus. Ibidem extrinsecus versus posteriora iacet sinus quidam levis, & cartilagine obductus, cui adiacet interna fibulae capitis portio; itaq; superne fibula tibiae agglutinatur. Educitur praeterea e media posterioris partis summitate sinus declivis, qua transeunt vena, arteria, & nervus, ac deorsum feruntur: verum antrosum non procul a summa appendicis sine, extat eminentia quaedam horrida musculorum in primis insertionem admittens tibiae extendentium

ium. Inde vero producta linea in media regione  
 acuta prominet, veluti cultri aciem effingēs, pro-  
 pterea quibusdam spina vocata est. Hinc tibia  
 latus internum ex carne deprehenditur, iccirco  
 regio hæc crea dicta fuit contrario sensu, cum lo-  
 cus ille omni prorsus carne sit denudatus: alia  
 autem tibiæ latera, maximeque posterius multa  
 carne opplentur. Secunda item linea quæ fibula  
 subest, illique e regione respondet, ideo facta est,  
 ut ex ea ligamentum producat, quo fibula cum  
 tibia connectitur, ac interim anteriores muscoli  
 a posterioribus seiunguntur. Inferior tibiæ pars  
 rursum crassescit, & in caput desinit, quod supe-  
 riore minus est, verum in superficie unico, am-  
 ploque sinu excisum, qui sua cartilagine obducitur,  
 & tali insertionem suscipit. Huius capitis  
 pars interna producit, ac in processum crassius-  
 culum euadit, qui sinui iam commemorato pro-  
 minet, ac talum sinui inhaerentem claudit: qui  
 cum alteram in partem protrudi, & e sua sede di-  
 moueri posset, alterum processum postulauit, quem  
 tamen externæ tibiæ regio capere non potuit:  
 quando in ea calari debebat sinus oblongus sen-  
 tim latefcens, & in duo supercilia desinens, quem  
 subiret, cuique incumberet extrema fibula por-  
 tio. Quod igitur tibia præstare non potuit, fibula  
 eam sedem occupantem præstare oportuit: quam  
 obrem eius caput in acutum tendens, tanto decli-  
 vius tibiæ ossi descendit, quantum tibiæ caput

Spina tibiæ  
 quid.

Circa quæ  
 pars tibiæ,  
 & cur dicta.

Vbi tibia  
 multa car-  
 ne vestia-  
 tur.  
 Secunda li-  
 nea in tibia  
 vsus.

Inferior ti-  
 bia descri-  
 bitur.

Vide natu-  
 ræ artem  
 miram.

Malleoli duo qui internus & qui externus.  
 Superius fibulam excedit. Vnde inferius fibula caput non aliter, quam processus quidam, alteri tali latus comprimit. Hæc autem duo tubercula malleoli dicuntur; quorum quia tibia promittitur, internus: qui vero a fibula prouenit, externus vocatur. Ambo hinc indetalum tibiæ articulatam obsident, ut neutram in partem delabi possit, adeo ut si quando huiusmodi luxatio contingat, ad internum magis, quam externum malleolum talus inclinet necesse sit: quoniam externus longius quam internus producit: tibiæ processus, quem modo internum malleolum vocari diximus, parte posteriore sinum habet, vnde ligamentum educitur, quo tali os tibiæ alligatur cui etiam firmiter nectendo non minimum adiumentum præbet sinus ille oblongus, asper, & transversim ductus, quæ exigit anterior inferioris tibiæ appendicis sedes. Etenim hinc ligamentum nascitur tali cervicem tibiæ nectens. Cæterum fibula tibiæ non secus adheret, ac radium cubiti adiungi diximus: parte tamen superiore femur nusquam attingit, verum sub tibiæ capite eo, quod supra diximus, modo cōnectitur: infra vero longum tibiæ sinum subit, utriusque tamen partem structura per Arthrodiā fit, quæ sub Synarthrosi ponitur. Ambo fibula capita in processum acutum exeunt, quæ nonnullis asperitatibus præditi sunt: horū superius, quod est rotundius, musculorum tibiæ mouentium insertioni deseruit: inferius

Cur in luxatione malleolus inclinet magis ad internū malleolū, quam externum.  
 Interni malleoli figura & vsus.  
 Tali cervix tibiæ nectitur.  
 De fibula.  
 Fibula non attingit femur supra.  
 Arthrodiā sub Synarthrosi.  
 Asperitatū Processū fibulae vsus.



utem, quod depressus est, ac extrinsecus gibbum  
 agis, musculos emittit, extremo pedi famulan-  
 tes. Verum quatenus bina hæc capita sinibus exci-  
 antur, cartilagine obtenduntur. Fibula, et si re-  
 ta est, aut saltem modice curua, plurimum tamẽ  
 ipsi tibia dehiscit, parte præsertim superiore:  
 noniam ibi tibia in sinum flectitur. In eo autem  
 intervallo ligamentum cernes, de quo supra me-  
 minimus, fibulam, tibiamque medio spatio com-  
 lectens, ac præterea ligamentum id musculos de-  
 inguit, per quos spacium illud hinc inde reple-  
 tur: quorum insertioni, ac nexui maxime inser-  
 iunt inæqualitates fibula sinibus ac lineis com-  
 paratæ: huius muneris ergò hisce pariter fit, ut fi-  
 ula æque ac tibia angularem propemodum figu-  
 ram adipiscatur. Vsum horum ossium in se ipsis o-  
 nes si experiri non pigeat, perdiscere possunt. Fi-  
 ula vero in prouum ac supinum non mouetur,  
 quod musculus huic obeundo muneri dicatis ca-  
 et. Sed tam fibula, quã tibia intus cavitatem ha-  
 et medullã asservantem, nec foraminib. desicit.

## De Patella. Cap. XXXI.

**O**S quoddam genu præponitur, quod a fe-  
 more, tibiaque separatim, utrique tamen  
 communem veluti operam præstat, sicuti mox  
 dicemus. Ideo separatim de hoc ipso osse a-  
 gendum fuit post femoris ac tibia descriptionem,  
 quando neque cum hoc, neque cum illo  
 commisceri, neque etiam ante hoc, vel illud tra-

Vbi dehi-  
 scat fibula a  
 tibia & cur.

Vsum tibiæ  
 ac fibulæ po-  
 test quili-  
 bet in se ex-  
 periri.

Cur fibula  
 in prouum  
 & supinum  
 non mo-  
 ueatur.

Fibula & ti-  
 bia habent  
 medullam  
 in cavitatẽ,  
 habent &  
 foramina.

Patellæ vsus  
 communis  
 est femori  
 & tibiæ.

Cur tracta-  
 tur de pa-  
 tella sepa-  
 ratim a ca-  
 pite de fe-  
 more & ti-  
 bia.

Patellæ nom-  
inum ex-  
pacio.

Patella non  
est cartila-  
ginosa neq;  
solida.

Substantia  
puellæ qua-  
lis vere sit.

Vbi inuol-  
uatur carti-  
lagine lu-  
brica Patel-  
la.

Patellæ uti-  
litas prima.

Cur patella  
sit mobilis.

Patella ha-  
bet propria  
ligamenta  
contra com-  
munem.

Ortus pro-  
priorum li-  
gamento-  
rum Patel-  
læ vnde.

Patella arti-  
culatur fe-  
mori per  
Gingly-  
mon.

Etari commodè potuit. Id autem est, quod Græci ἐπιγυρῖδα, seu ἐπιγυρᾶτιν vocarunt: Latini autem patellam genu molam, vel scutum, vel scutiforme os, vel genu rotulam nominarunt. os est non cartilaginofum, sicuti nonnullis visum est: neque rursus adeo durum, vt solidum existimari debeat, vt alii existimarunt: at substantia est, qualis dura cuiusdam appendicis, qua tamen prona sit, vt nutrimentum per omnes sui partes suscipiat. Verum intro cartilagine lubrica inuoluitur, idq; magis parte, qua femur ac tibiam respicit, cum altera parte musculorum tendinibus inuestiatur. Patella hæc facta fuit, vt tegeret femoris, & tibie articulum, alioqui nimis patentem, ac proniorem, vt antrorsum procumberet facillimo luxationis genere: præstat item, vt in rectum angulum genu flecti possit: mobile præterea, nec per- tinaciter adherens esse debuit, vt ne difficilem articuli huius motum redderet aut longum in genu decubitu præpediret. Suis tamen ligamentis cū femoribus, tum etiam tibie necitur, quicquid alii dixerint, sibi persuadentes solis musculorum tendinibus contineri. nam ex appendicibus femoris, & tibie ligamēta nascuntur, quibus manifesto molā utrinq; vinciri plane perspicimus: at cū femore solū articulatur eo modo, quem sibi Ginglymos vindicauit. Etenim anterior imi femoris pars in duo, vt diximus, capita desinēs in medio sinum habet, in quē media protuberantior patellæ portio

portio immittitur: quem ut magis impleat, cōmo-  
diusque inhereat, hinc inde & ipsa sinus natura  
dedit protuberantibus femoris capitibus respon-  
dentes: quamobrem femur patellam excipit, &  
eadem pariter excipitur. Formam pene orbi-  
cularem nacta est: verum in acutum quodammo-  
do desinit, quatenus tibia aſidet: propterea ſcuti  
nomine donatur: in extremitatibus tenuior, quo  
magis ad medium tendit, eo craſſior efficitur, ubi  
rorsus eminet, vmbonemque imitatur.

Patellæ fi-  
gura qualis.  
Vbi patella  
est similis  
vmboni.

De pedis ossibus, ac primum de Thalo.

CAPVT. XXXII.

**S**UPEREST nunc ut extremi pedis ossa de-  
scribamus, quæ sex supra viginti sunt: unde  
es vno minus constat, quam summa manus. Cæ-  
terum in pede tres ordines similiter, ac in manu  
constituere placet: idq; clarioris doctrina gratia:  
ut prima pars, quæ statim tibia, fibulaq; succedit,  
namq; tarsum nominamus, brachiali respōdeat:  
secunda vero, quam pedium cum cæteris appella-  
mus, postbrachialis ossibus. Tertia sit digitorum  
articulis destinata: cum interim tamē eo solo in-  
ter se differant, quod septem nobis erūt tarſi ossa,  
brachialis autem octo: quo fit, ut vno eo osse, quo  
brachiale tarsum superat, manum pariter ex-  
remam extremo pedi prestare dicere possimus.  
Quinque vero pedii ossa, quot etiam postbrachi-  
lis numerabuntur: quæ item supererunt utro-

Ossa pedis  
26.

Manus os-  
sum nume-  
rus.

Tres ossiū  
phalanges  
in pede.

Comparan-  
tur tres or-  
dines ossiū  
in pede cū  
tribus erdi-  
nibus ossiū  
in manu.

Tarsus  
quid.

Tarſi & bra-  
chialis con-  
formitas.

Pedii & post  
brachialis  
cōformitas.

Tarſi ossa 7.

Brachialis  
ossa octo.

Pedii ossa 5.  
Ossa post-  
brachialis 5.



Offa digi-  
torum tum  
manus tum  
pedis 14.  
In ossibus  
Tarsi dif-  
fert ab aliis  
anatomicis  
& quomo-  
do.

Prima clas-  
sis septem  
ossium Tar-  
si in pede  
respondet  
brachiali.

Singula  
Tarsi ossa  
non habent  
nomen.

Talus.  
Calx.

Scaphoides.  
Cyboides.

Quomodo  
distinguan-  
tur tria ossa  
Tarsi carē-  
tia nomine.

Idem est  
ἀσφᾶλον-  
ος, ἀσφῖον  
& Talus.

Tali situs.  
Tali habet  
homo & ani-  
malia pede  
multifido.  
Aristoteles  
decipitur  
in Talis.

bique, in digitorum articulos quatuordecim dis-  
tinguentur. Neque video cur a tarsi ossibus tria  
illa priora seiungi debeant, sicuti ab aliis Anato-  
micis factum fuit, fatentibus quatuor posteriora,  
quae sola tarsi appellatione dignantur, ad brachi-  
ale tantum referri oportere, tribus primis absque  
relatione designatis. Per me itaque semper licebit  
cum hac tria, tum etiam quatuor sequentia tarsi  
vocabulo complecti: ut cum a tibia, suraque re-  
cesserimus, descendentes protinus ad unam os-  
sium compagem, veluti classem deueniamus, quae  
brachiali comparemus, quod quidem post cubitū  
vnamque nobis occurrit. Verum hac tarsi ossi-  
singula peculiari nomine non sunt donata: nam  
prima tria alii a tarso secernunt, & unum ex  
quatuor sequentibus proprium nomen obtinue-  
re: at postrema tria adhuc sunt sine nomine. Pri-  
mum igitur omnium talus, secundum calx, ter-  
tium scaphoides, quartum cyboides nominabitur  
quae supersunt tria, quamquam innominata sunt  
attamen numeri, situs, ac forma ratione distin-  
guentur. Primum ergo talus erit, quem Graeci  
ἀσφᾶλον, & ἀσφῖον vocant: tibiā, fibulamq; illic  
subit, quippe cui illarum appendices incumbunt  
quamquam tibia soli substratus esse videtur. In  
os homini cum ceteris commune est animalibus  
quae multifido, seu in digitos scisso pede incedunt  
quicquid dixerit Arist. atq; illum sequenti; a quo-  
rum sententia rei veritas omnino abhorret. Ta-  
li for

e forma ea fuit, ut supra eminect, ut orbiculare  
 tuber, ceu rotula partem imitetur, quæ in medio  
 sinum leuem possidet, lateribus hinc inde promi-  
 nentioribus, quæ scilicet cum tibiæ osse copula-  
 tur: sic enim tibiæ ossis appendicem, quemadmo-  
 dum capite de tibiæ, suræque ossibus dictum fuit,  
 natura insculpsit, ut excipiendo talo percommo-  
 dam sedem præberet, tutiorem nimirum articu-  
 lationis speciem constituens, quæ ginglymos dici-  
 tur. Subseruit autem hic articuli modus pedi fle-  
 tendo, ac reflectendo, qui motus ab ingrediente  
 animali continenter fieri solet: qui motus ut fa-  
 ciliior foret, minusque membrum ex eo laboraret,  
 aut ne ossa attritu multo tandem deficerent, na-  
 tura solertia pars utraque cū tarsi, tum tali ap-  
 pendicis vberiore crusta lenigauit. Tali latera v-  
 trimque sunt declinua, ac figura vcluti plana, ut  
 illis internus tibiæ processus ac fibulæ appendix  
 malleolos ambos constituentes adhærescerent: at  
 externum latus longius descendit, magisque est  
 excavatum, quo inferius procedentem fibulæ ap-  
 pendicem excipiat, ad externum malleolum con-  
 struendum, qui propterea deorsum magis quam  
 internus protenditur. Inferior tali pars sima est,  
 ac sua cartilagine obducta: tota calcis ossi inha-  
 ret, ita tamen, ut anterior eius portio semicircu-  
 larem sinū habeat, cui inseritur media se offerēs,  
 calcis regio: at posterior quodammodo prominet,  
 quæ scilicet ab interna, atque posteriore calcis

Tali figura.

Cur appen-  
dix tibiæ ta-  
lū excipiat.

Talus arti-  
culatur ti-  
biæ per gin-  
glimon.  
Ginglymi  
vñs in talo  
& tibia.

Cur os tali  
cartilagine  
incrassetur.

Cur tali la-  
tera sint de-  
clinua &  
plana.

Quid con-  
stituatur mal-  
leolos.

Cur malleo-  
lus externus  
differat ab  
interno.  
Tali pars  
inferior  
qualis.

- Per anteriorem partem quid intelligendum. Quid per posteriorem.
- Cur natura cavitatem magnam in talo finxerit.
- Vbi sint ligamenta calcis & tali.
- Anterioris tali partis figura & versus.
- Quomodo pes obscuro motu moueatur.
- Descriptio partis prioris tali.
- Cur talios sit sinuatus.
- Tali ossis substantia qualis.
- portione suscipitur: nos anteriorem partem semper intelligimus, quae a capite descenditibus primo se offert: posteriorem vero, quae sequitur, remotiorque est: sed inter illa duo spatia cavitates admodum profunda tacet, quam etiam augere videtur calcis sinus in ea parte cavitati huic e regione respondens. Hanc ipsam non aliorum factam fuisse conicio, quam ut mucosam quandam substantiam, ac pinguedinem simul contineat humectandis inungendisque hisce ossibus paratam, ne scilicet crebro motu exsiccarentur: atque ita suo munere frustarentur, praeterquam quod ligamenta ibi praesto sunt, calcem, ac talum arctissime colligantia. Anterior eiusdem pars in ceruicis formam producit, quae in caput rotundum, & sua crusta obtectum desinit, quod ab osse scaphoide in amplum rotundumque sinum calato excipitur. Is articulus praestat, ut pedem obscuro quamlibet motu introrsum, extrorsumque moueatur, necnon etiam aliquo modo circumducatur. Demum parte priore talus decumbit, & in geminum quasi processulum supra calcem extenditur, quae scilicet ad internam regionem vergit. Atque in hunc modum se habet talios: quod tamen adeo sinuatum conspicitur, ut non modo ligamentorum insertionem, ortumve admittat, sed tendinum, muscutorum digitos mouentium deductui cedat: huius substantiam solidam non inuenies, ut aliquis opinatus est: verum intus spongiosa est, ac multis foraminibus peruiam.



peruia. Secundum quod sequitur calx, siue calcis os dicitur, alij calcaneum, vel pedis calcar appellant, Græcis ἰσχυρὸν vocatur: magnitudine ideo omnibus summi pedis ossibus antecellit, non multum a tali substantia dissidens, quāquam fungosius esse videtur: neque adeo duro cortice undigum munitum, superne tali ossi ad eum, quem paulo supra diximus, modum cōmittitur, cum scilicet media versus anteriora regio partim rotundotubere turgeat, partim vero ingentem sinum habeat, ut talum excipiat, & ab eodem per Ginglymon excipiat. At quæ prior est, in tergum tamen vergit: oblonga, rotundaque est, quodammodo caput in superficie habet, & in ea regione appendice munitur, ac tota portione a tibia rectitudine excedit: quod ideo factum fuisse existimo, ne pes cum tibia posteriora versus delaberetur, minusque sic illa pedi, pes vero humi hareret: inferiorem calcis partem, qua progredimur, latiusculam esse oportuit: ut tutius ibi pes consisteret: eandem præterea asperam, & transverso processu abundantem, ut inde oriretur musculus flexor. Etendo quatuor pedis digitorum articulo describens: ubi præterea ortum habet materia illa musculosa, unde emergunt quatuor muscoli, qui longotēdine in internam quatuor digitorum regionem implantantur, & propterea eminentes hinc inde processus cavitatem quandam relinquunt, ut cōmodius in ea tam musculus, quam muscu-

Error cuiusdam existimantis os tali esse solidum.

Calcis nominata,

Calx est maius os in summo pede.

Calcis substantia qualis.

Cur calx a tibia rectitudine excedat.

Cur inferior pars calcis sit latior.

Cur aspera, & processu transverso,

Materia musculosa ex qua quatuor exeunt muscoli.

Cur inter processus eminentes sit cavitatis.

Asperitas in  
capite cal-  
cis cur.

Articulati-  
onis forma  
sub Gingly-  
mo ad Syn-  
arthrosim  
referenda.

Processus  
vsius.

Cur inter-  
num latus  
calcis sit in-  
signiter ex-  
cavatum.

losa illi substantia locum habeat: ne, dum pes hu-  
mi validius incumbit, eiusmodi musculorum ca-  
pita nimia compressione lendantur. Iam vero  
calx ea parte, quam in caput euadere dictum est,  
impressionem quandam habet leui, ac paululum  
elata asperitate donatam, quo melius in eam ten-  
do omnium maximus, ac robustissimus inserere-  
ar: qui a tribus musculis pedem mouentibus in  
vnum tandem coeuntibus conficitur: parte qua  
minimum digitum respicit, cum cyboide coniun-  
gitur: ita quidē, vt superne, vbi leuiter effertur,  
plano propemodum cyboidis sinui aptetur: infer-  
ne autem obliquo ceu sinu, atque ad interna ver-  
gente equali ductu procedentem cyboidis portio-  
nem excipiat. Quamobrē sub Ginglymo ad Syn-  
arthrosim referenda talem articuli formam re-  
ctius posueris: qua vero maximum digitum spe-  
ctat, (quam tamen regionem ad internum cal-  
cis latus concinnius referas) processum non mo-  
dicum emittit, quo sinum in interno latere cela-  
tum adaugeat, ac propterea propugnaculo sit cū  
musculorum tendinibus, tum etiam venæ, arte-  
riæ, ac neruo illac transeuntibus. Non enim ob  
alios vsus latus id tam insigniter excavatum est,  
quam vt hisce vasis, tendinibusq; cederet, quibus  
omnibus tam confert processus iste, quam etiam  
præstat, vt talus ibi aptius cum calce cohareat:  
externū deniq; calcis latus depressum est, asperū,  
& inaequale: cui prope partē posteriorem paruus  
adeft

adeſt ſinus ſub exiguo proceſſu conditus, ubi cartilagineam cruſtam offeſdes, qua nimirum petit muſculi ſeptimi tendo, pedi extendendo ſubſeruiendis. Tertium tarſi os a Græcis *σκαφοειδής*, à noſtris autem nauiforme, ſiue naiculare. ſiue cymbam referens nuncupatur: quoniam ſcapham, aut phaeſelum imitetur. Id os in interna pedis parte poſitum eſt: anteriore ſui ſede ſinu eſt proſundo, in quem oblongum, rotundumque tali caput inſcritur, qui articulus ad Enarthroſim nihilominus obſcuram referri debet, quando ab eo non riſi obſcurus motus prouenit: poſterior pars priori quinti, ſexti, ac ſeptimi oſſium nomine carentium ſedi committitur ita quidem, vt non facile ſit indicare, ab illisne oſſibus excipiat, an illa ipſa excipiat. Etenim hæ ſedes non prorſus commonſtrant, ſinusne, an tubercula ſint: tamen ſi leuiter demum protuberare videntur: externum eiufdem latus amplum, rotundum, ſinuatumque eſt, qua præſertim cum quinto oſſe coniungitur. Vnde ſimulatque diſceditur, ſenſim in anguſtum redigitur, & in internum proceſſum finitur: veluti nauis roſtrum referens: ita internum latus prominet, vt inſigne tuber conſtituat, cuius ope dextrum a ſiniſtro leui momẽto ſecernimus: inferioremq; ſinum, cui eminet, maiorem efficit, quã tendo ſexti muſculi pedem mouentis percomode refleſtitur, multis aſperitatibus cum ſuperiore, tum etiam inferiore parte ſcatet,

Os Tarſi  
vel Nauiforme.

Situs nauiformis.

Articulatio nauiformis cum talo ad Enarthroſim.  
Poſterioris cymbæ deſcriptio.

Externi lateris cymbæ deſcriptio.

Reflexio tendinis ſexti muſculi pedem mouentis.



Cyboides  
os quartū.

Cyboides  
nō est qua-  
dratum.

Cur cyboi-  
des dicatur

πολύμορ-  
φον.

Os grandi-  
nolum.


Situs cy-  
boidis.

Cur iunctu-  
ris adfit car-  
tilago.

Sinus viam  
præbēs ten-  
dini septi-  
mi muscoli  
pedis.

ut idoneam ligamentis sedem præbeat, quibus ossa hæc inuicem connectantur. Quartum os, quod ceteri primū tarsi faciunt καὶ βῆδης Græce, Latine autem cubiforme, seu cubum, tesseramve imitans, dicitur: & licet quadratum esse videatur, ita quod tessera figuram referat, multiplici tamen forma insignitur: ideo πολύμορφον quasi multiforme nuncupatum est. Arabes grandinosum vocarunt. Id quidem ad extimum pedis latus iacet, & cum calce parte anteriore eo articuli genere iungitur, ut non magis suscipere, quam suscipi videatur: sicuti antea asseruimus, ubi de calce loquebamur. In posteriore autem illius parte duos similes sinus cernere est, quibus suscipit extrema duo pedii ossa, quibus fulciendis veluti basis paratum esse videtur. At internum latus cum externo septimi ossis coharet, ubi non secus atque aliis partibus, quæ cum ceteris ossibus copulantur, leui cartilagine incrustatum animaduertas: cum tamen alibi nulla cartilagine obducatur: solis siquidem iuncturis talis adest cartilago, ne nimis impacta sint ossa: ac motui quamuis obscuro resistent: extrema sedes bifida est, ac duos processus exerit sinu medio illos dirimente, qui ad inferiora obliqua ductu tendit, ut obsequatur tendini septimi muscoli pedem mouentis, cui substratus est ac viam præbeat: superior pars planior est, sed extrorsum acclinis fit, quādo talis reliqua pedis forma futura est, ut scilicet in medio elatior,

in

in utrumque latus, ac maxime in externum sensim declinet. Propterea videre est pedis ossa, praesertim postrema tarsi quatuor in orbicularē formam diducta, ut parte superiore conuexa sint: inferne autem concava fornicem imitentur. Validior nempe constructio hac futura erat, ac roboris plus habitura, quae sufficeret tum figendo pedem, tum demum corporeae moli sustinenda. At haec prominere huiusmodi ossa necesse fuit, ut inferna cavitati relinquerent idoneam sedem, tutum iter exhibitura tendinibus ac musculis sub inferiore regione positis. Verum hac obiter dixisse sufficiat, ut patere possit: quare in superficie protuberantem formam pedis, ac in ima parte simam, cauam uel non planam natura construxerit. Caeterum ad tarsi ossa reuertamur, e quibus reliquiam sunt tria, quae adhuc nomine destituuntur: horum quintum e regione pollicis situm est, cuius figura talis esse videtur,  ante sinuata conspiciatur, & cum posteriore naucularis portione prominente coniungitur: retro uero primi pedii ossis, quod pollicem sustinet sedes efficitur, quam partem si per se spectes, difficile iudicatu sit, sinuatane sit, an promineat: quod quatuor hisce tarsi ossibus commune est, quatenus inuicem, aut cum pedii ossibus uniuntur: obscuri enim adeo in iis sunt sinus, ut planis seu superficiebus in modum glenes committi recte dici possint. Attamen si consideres partem illam pedii ossis, quae huic

Cur tarsi ossa postrema praesertim sint fornicis instar.

Cur prominere huiusmodi ossa necesse fuit tarsi.

Pedis forma in superficie protuberat in ima parte sima est.

Per Glenē committi.

quinto ossi incumbit, ubi eam videris duplicem  
 cavitatem præ se ferre, proculdubio indicabis ne-  
 cessum esse, ut altera hac pars in duo quamlibet  
 exilia tubercula turgeat: nisi geminas hinc inde  
 sinuatas partes committi fateamur: quod mea  
 quidem sententia perridiculū foret, quando ubi-  
 que tum natura, tum etiam artis natura prorsus  
 æmula ordo postulat, ut vel plana planis, vel si-  
 ma protuberantibus, nusquam vero caua cauis  
 committantur: superior pars modica est, & ad  
 intimam sedem, quæ angustissima visitur, descendit:  
 hæc autem quoquo modo gibba est pro eius cavi-  
 tatis ratione, quæ in externa regione cernitur:  
 qua ad inferiora pertinet, cum interim latus id  
 parte sui superiore internum sexti ossis latus mo-  
 dico sinu contingat: verum inferior crassior exi-  
 stit, quo firmitus terra inhareat. Sextum os qua-  
 drilaterum apparet, si superiorem eius faciem in-  
 tueamur: quæ utique plana est, & quadratis la-  
 teribus respondet. At si partem inferiorem, cum  
 illa angustissima sit, & in aciem abeat: hoc ipsum  
 os cuncti tantum imaginē referre dicemus, quale  
 item esse dixeris septimum, quod illi proximum  
 est os, de quo mox dicemus: ac mehercule ambo  
 hæc ossa sic inter alia, quæ circumstant, posita sunt,  
 ut cuneorum more ad ea veluti constipanda im-  
 missi fuisse videantur. Verum sexti huiusce ossis  
 pars anterior cum scaphoide, posterior leuiter pro-  
 minens cum secundo Pedii ossē, intima cum ex-

Plana pla-  
 nis, vel sima  
 protuberā-  
 tibus com-  
 mittuntur,  
 non caua  
 cauis.

Cur quintū  
 os innomi-  
 natum in-  
 fra sit cras-  
 sius.  
 Sexti ossis  
 tarssi inno-  
 minati de-  
 scriptio fi-  
 guræ.  
 Sexti & se-  
 ptimi ossis  
 tarssi utili-  
 tas.

terno



terno quinti tarsi ossis latere, ac demum externa cum intima septimi eiusdē sede copulatur. Quibus partibus sua nō deest cartilaginea crusta. Septimum medium est inter sextū, ac quartū, quod cyboides nuncupauimus: quadrangulare id quoque videtur, sed lōgiusculū est: anteriore sui parte ad nauiforme declinat, eiusq; tuberculū exiguo admodum sinu excipit, itaq; illi cōmittitur: parte vero posteriore tertiū pedis os admittit: at suis laterib. latera tū sexti, tū quarti ossis attingit: atq; hac de tarsi ossibus: quorum substantia dura quidem est, non omnino tamen solida, nec a foraminibus vacua recipiēdi alimenti gratia cōstitutis.

Septimi ossis innominatus.

Ossiū tarsi substantia qualis.

# De Pedio. CAP. XXXIII.

SECVNDA pedis pars, quam Græci *πῆδιον* appellāt, Latinis modo planta, modo pecten, modo pedis vestigium: ea est, quam postbrachiali respondere diximus, quinque ossibus constans articulos digitorum imitantibus oblongis, ac teretibus, quorum extrema capita mediam regionem subtiliorem relinquunt. Etenim initio crassiora, ac sinuata qua cum quatuor postremis tarsi ossibus eo quo dictum est modo componuntur: inde vero qua cum primis digitorum articulis iunguntur: in rotundum caput non secus atque postbrachialis ossa, eminent. Ex his ossibus primum maximum est, verum aliis longitudine cedit: siquidem omnium breuissimum est, cuius pars inferior, que sub capite est anteriore, in tuber-

Idem est *πῆδιον*, planta, pecten, vestigiumque pedis. Planta respondet postbrachiali. Ossa plantæ quot. Ossiū plantæ figura.

Primum est plantæ describitur.

Tuberculi  
in primo of-  
se plantæ v-  
sus.

Secundi of-  
fis plantæ  
descriptio  
& vsus.

Tendonis  
octaui mus-  
culi pedis  
insertio.

Situs mu-  
sculorū qui  
flectunt pri-  
mum arti-  
culum di-  
gitorum.  
Ossa plan-  
tæ habent  
appêdicem.  
Ossa plantę  
cur sint fo-  
raminulen-  
ta.

Digitus sunt  
tertia pars  
pedis.  
Ossium di-  
gitorum nu-  
merus.  
Pollex ha-  
bet duos ar-  
ticulos in  
manu pe-  
deque.

culum prominet, quo duo sesamina oscula ibi as-  
sidentia disiungit. At secundum os, quod susti-  
nendo indici est efformatum, omnium longissi-  
mum, quantum illud quoque esse videtur, quod  
minimo subest: eius enim longitudinem adauget  
prominentior, & in externum pedis latus pro-  
ducitur, in quem octaui musculi pedem mouen-  
tis tendo inditur. Caterum omnia parte antero-  
re tarsi ossibus vniuntur, atque etiam sibi inui-  
cem inherent, sensim deinde dehiscunt, & a se  
mutuo abscedunt, tenuioraque fiunt, ut in medio  
internualla constituent, in quib. musculi sunt pri-  
mos digitorum articulos flectentes. Tam antero-  
re, quam posteriore parte appendicem obtinuerunt  
cartilaginea crusta obiectam, verum appendix  
posteriori parti adnata rotundum illud, de quo di-  
ximus, caput effingit, quod in sinum primorum  
articularum profundum, atq. orbiculare immit-  
titur: caua intus sunt, ac medullosa, & habent fo-  
raminula, per qua cum venula, tum arteriola a  
ea nutrienda, fouendaque subintrant.

#### De digitis. Cap. XXXIII.

**T**ERTIAM pedis partem explent digitorum  
articuli pedion subsequentes. Hec ossa qua-  
tuordecim numero sunt: nam singulis digitis ter-  
ni sunt articuli, præter pollicem, cui duo tan-  
tum obtigere, id quod in manu quoque observa-  
uimus. Qui enim maximi digiti primus articu-  
lus esse deberet, utrobique pari passu incedere  
videtur,

videtur, in postbrachialis videlicet ac pedis ossibus: adeo ut merito in eorum numero collocetur: licet in manu id genus os a cæteris postbrachialis ossibus differre facile deprehendatur, cum in eo motus quodammodo manifestus fiat. In pede autem os istud non alio motu mouetur, ac reliqua pedij ossa. Iccirco rectius id ipsum inter illa connumeratur, atque ita duo tantum articuli pedis maximo assignantur. Quemadmodum ergo digitorum pedis ossa cum iis, quæ in manu sunt, numero conueniunt: ita quoque parum ab eisdem discrepant substantia, structura, ac situ, præterquam quod prima internodia parte sui anteriore sinu constant profundiore, in quem inseruntur prominentiora ossium pedij capita: quod articulationis genus Enarthrosim dicimus. Cæterum in mutuis ipsorum articulationibus Ginglymon semper obseruabis. Hæc itidem internodia breviora sunt, quam in ipsa manu, superne gibba, inferne vero sima, ut musculorum secundum, ac tertium digitorum articulum flectentiū tendines tutissime admittat, nec appendice utrumque ipsorum caput destituitur: ubi cartilago etiam obducitur, firmiorem, lubricamq; magis articulationem reddens (summam extremorum articulorum partem excipio) ubi neq; appendicem, neq; cartilagineam crustam inuenias: quanloquidem nulli alteri ossi ibidem coarticulatur:

## M

articulatione utilitas. Cur summi digitorum articuli careant appendice & cartilagine. Ossium digitorum cavitates medullas habent.

Collatio ossium digitorum pedis cum ossibus digitorum manus.

Ubi ossa digitorum pedis articulantur per Enarthrosim cum ossibus plantæ. Enarthrosis quid.

Mutua articulatione ossium pedij & digitorum fit per Ginglymon.

Tendines musculorum flectentium secundum & tertium articulum digitorum.

Appendix Cartilaginea.



medulla & ipsa intus referta sunt, neque inani  
cavitate pradiata.

## De Sesaminis. CAP. XXXV.

Sesam. ossiū  
figura & si-  
tus.

Ossium sesa-  
minis vsus  
primus.

Sesam. vsus  
secundus.

Mole in ge-  
nu vsus.

Sesam. vsus  
tertius.

Sesam. vsus  
quartus.

Cur sesami-  
na sint di-  
cta.

Differentia  
duorū sesa-  
ab aliis.

Sesa. ossium  
substantia  
qualis.

Medullosus  
succus conti-  
netur in se-  
saminis.

**D**ANTVR ossicula quadam orbicularia,  
depressa, sub infimis digitorum non modo  
pedis, verum etiā manus articulis inter ipsa in-  
ternodia iacentia. Quæ quamquam non alior-  
sum a natura fabricata esse videantur, quam ut  
infartiant vacuum illud, quod iisdem articulis  
reliquū est: alios tamen vsus longe maiores præ-  
stant: quippe quæ nō secus propugnaculo sint ar-  
ticulis, quam soleat genu mola eam partem mu-  
nire, quæ cum femore tibia articulatur: & appre-  
hendentis rebus firmitatem nō modicam, & in-  
pede humi equaliter aptando cōmodum maxi-  
mum afferant. Præterea facta sunt, ut articuli  
in ipsa flexione in acutum angulum nō dirigantur.  
Hæc ossicula, quod parua admodum sunt, nō  
formæ tantum ratione veteres sesami semini cō-  
pararunt: unde Græcis σπινθηριον, Latinis ve-  
ro sesamina ossicula, vel sesami figuram præ se fe-  
rētia, dicta sunt. Excipi ab aliis iure possunt ge-  
mina illa, quæ sub interiore primi pedis ossis par-  
te, quæ cum primo articulo pollicis articulatur,  
reperiuntur: siquidem maiora sunt, & cartila-  
gine quadam incrustata, quatenus videlicet ar-  
ticulo inherent, cum cetera multo maiora sint,  
omnia substantia sunt pene solidiore, quæ tamen  
intus fungosa est, ac poris scatet, ubi succus qui-  
dam

lam medulloſus pro nutrimento ſeruatur. Numerus oſſiculorum incertus eſt, in nonnullis videnti, in aliis quindecim, in quibuſdā decem, in aliis plus minusve. Hic obiter dictum illud veim, horum oſſiculorum cauſa nonnumquā euenire, ut luxati præſertim primi digitorum articuli minus commodè reponantur. Niſi enim quiſ difficultatis rationem optime nouerit, nuſquam lenam reſtaurationem molietur. Atq; hac de Rebus, quibus explicandis tum breuitati, tum etiam perſpicuitati ſtuduimus: ut quoad eius fieri potuit, diſcentium vtilitati conſulere-  
mus, eandem operam in cate-  
ris, quæ ſequuntur,  
præſtaturi.

Nō eſt certus numerus oſſium ſeſamino-  
rum.

Curluxatio in pede fit quandoque reſoſitu diſ-  
ficilis.

Breuitati & perſpicuitati ſtudet.


M 2



180 REAL. COLVMBI CREM.  
 REALDI COLVMBI  
 CREMONENSIS  
 DE RE ANATOMICA,  
 Liber II.

DE CARTILAGINIBVS.

Ordo tra-  
 ctandorū.



EQVENS hic liber car-  
 tilaginum naturam ex-  
 plicabit, ligamentorumq;  
 fabricam, ac postremo sce-  
 leti componēdi rationem.  
 Acartilaginis igitur, quod  
 ea primo nobis proposita

Cartilagi-  
 nis descri-  
 ptio.

sit, descriptione exordiamur. Cartilago substan-  
 tia quadam est media inter ossa & ligamenta.  
 Nam ossibus tanto mollior existit, quanto liga-  
 mentis durior: albedine tamen cum utrisque  
 maximopere conuenit, ac sensus penitus est ex-  
 pers. Etenim nervos sentiendi authores nullibi  
 cognoscit, quod summa cum ratione factum esse  
 fatebitur, qui cartilaginum utilitatem callebit.

Cur cartila-  
 gini sentiē-  
 dū non fuit.  
 Cartilagi-  
 num vltus  
 multiplex.

Nam cartilagine sentire minime decuit, siue  
 operiendi, ac sustinendi munere fungantur: siue  
 propugnaculorum vices gerant: siue praestent, vt  
 ne ossa inuicem atterantur: siue efficiant, vt ea-  
 dem simul annexa firmitus cohaereant: siue sinus  
 augeant: siue articulorum motus faciliores red-  
 dant.



dant. Iam vero easdem sic natura composuit, ut nullo usquam modo frangi possint ubique sua mollitie cedentes: neque adeo resistunt sicuti ossa, nec impetu aliquo decidunt, aut extenduntur attracta, ut ligamenta plerumque faciunt: verum in sese redeunt semper, neque sedē suam, vel formam facile commutant.

## De Palpebrarum Cartilaginibus.

## CAPVT I.

PRIMUM locum inter cartilagines illa sibi vendicant, quae oculorum palpebris contigēre: bina quidem utrimque supra, infraque: at superiores maiores longe sunt homini, atque iis animantibus quibus palpebra superiores mouentur inferioribus immotis. Quibus vero contra, ut auiibus pene omnibus, inferiores superioribus maiores existunt. Caterum has cartilagines inuestiunt intus membranula, foris autem cutis, licet in palpebrarum extremitatibus tantum sita sint, quas validiores efficiunt, ut arctius continueant, ita propugnaculi vicem oculis praebeant: cui rei non minimum adferunt adiuuētum pili in utraque cartilagine non secus, ac in duriore solo infixi, ut ne mollius iaceant, aut languidius pendendant, sed stent erecti ad ipsam oculorum a-  
ciem dirigendam.

## De Aurium Cartilaginibus. CAP. II.

HIS proxima geminae illae sunt, quae utramque aurem cōstituunt, auditus forāmini sic

Natura in cartilag. cōpositione, admirabilis.

Cur mēbrana & cute inuestiatur palpebrarū cartilagines

Pilorum in cartilaginibus palpebrarū vsus.

Vfus.

- apposita, ut ipsarum ope, atque opera longius id  
extendi, ac latius quodammodo patere videatur
- Cur crassio- ad sonos promptius percipiendos. Crassiores su-  
res superne. perne cartilaginee hæc factæ fuerunt, ac præser-  
tim iuxta foramē, unde ortum habent, ubi du-  
Vbi durio- riores quoque sentiuntur ob tēporis ossis, unde pro-  
res & cur. deunt, vicinitatem. Nimirum id os ad meatus  
Os tempo- auditorij circumferētiam asperum redditur, ut  
rum ubi sit auditorij circumferētiam asperum redditur, ut  
asperum, & cartilaginee educat, ea ratione accommodatius:  
cur. ubi etiam ita affixæ sunt, ut nullo momēto, neque  
Figura car- deorsum labi, neque sursum propelli possint. In-  
til. aurium tus, extrorsum partibus constāt tum simis, tum et-  
qualis & cur iam gibbis, ut prominentes partes externa in-  
nalis. ternis cavitatibus respondeant. Supra rotundæ  
sunt, infra vero in pinnam desinunt: qualicet ab  
ipsis cartilaginum finibus dependeat, cartilagi-  
nis tamen omnino est expers, cum neutiquā eius  
Cur aures ipsius indigeat. In præptu nemini esse non potest,  
osseæ non cur nō osseas aures natura efformauerit: quoniā  
sunt. si subtilitatē respexisset ex osse illas fabricatura,  
fractu faciles, & paulo momento defecturas no-  
Cur aures uerat: at si crassas, & solidas, quales esse debue-  
sint cartila- rant, nimis profecto capiti onerosas. Rectissime  
agineæ, ergo ex cartilaginea substantia leni, atque ob sui  
mollitiē ab externis ictibus minus ledenda con-  
Cur aurium struxit. Quibus præterea non tam munimenti,  
cutis sit pe- quam decoris gratia pertinacē cutim aduoluit,  
tinax.

De nasi cartilaginibus,

CAP. III.

Extrema

**E**XTREMA nasi portio cartilaginea facta est magna natura providentia, ut facillime claudi, malorum odorum ascensus prohiberi, ac rursum aperiri dilatariq. possit aeris attrahendi causa. Præterea hæc narium substantiæ ratio, ut de auribus dicebamus, confert, ut vix lædatur ab extrinsecis, quibus sæpe occurSAT: pressa enim cedit, frangi omnino nescia. Quæ utilitates adeo necessaria sublatæ forent, si narium fabrica uniuersa ex osse constaret. Quamobrem optime huic parti, sicuti cæteris sapientissimus rerum opifex cōsuluit, dum imas nasi partes cartilagineas cōdidit superioribus ossibus annectens, ut inferioribus superiores veluti basis, ac firmamentum forent, quando hæ ab illis pendere debebant. In tres ergo cartilagineas nasi extremitas distincta est, quarum duæ latera constituunt, quas pinnas, seu alas vocarunt, quasq. tertia cartilago intersecat, unde nasi foramina duo cōficiuntur. Hæc media osseo nasi septo finitima respondet. Pinna autem ipsæ solæ sunt quæ mouentur, cum propriis donatæ sint musculis extrorsum illas ipsas trahentibus, ut dilatentur: sed introrsum nullo peculiari musculo adducuntur: tametsi Ves. internos quosdam musculos somniauit, qui mihi nusquā reperiuntur. Cæterum labiorum beneficio clauduntur, quemadmodum loco suo vberius ostendetur.

Cur extre-  
mus nasus  
sit cartilagi-  
neus.

Cur totus  
nasus non  
est osseus.

Cur superi-  
or nasi pars  
sit ossea.

Tres nasi ex-  
tremi carti-  
lagines.

Cur solæ  
pinnae in na-  
so mouean-  
tur.

Vesalii er-  
ror.

Quomodo  
pinnae na-  
rium clau-  
dantur.

De maxillæ inferioris Cartilaginibus.

### CAPVT IIII.



Situs.

Vfus.

**P**RIORE libro, ubi de maxilla inferiore loquuti sumus, duarum cartilaginum obiter meminimus, quas inter superiores eiusdem maxille processus, ac temporum ossa haud dubie reperies: mobiles quidem illæ sunt, nec alia de causa fabricata, quam ut frequentem maxille motum tamquam in lubrico ponerent. Vix enim verisimile fit, articulū illum quamlibet laxum sufficere posse: quin etiam inter edendū, loquendum, atque oscitandum ossa hæc attererentur, aut saltem labore nimio fatigata ab ipso tādē motu desisterent: nisi cartilaginee istæ mobiles adessent, quarum beneficio, quandocumque opus foret, maxilla promptius moueretur, nullum fere quietis, aut cessationis tempus requirens.

De Asperæ Arteriæ Cartilaginibus.

## CAPVT V.

Trachea &  
larynx anti-  
quis ex car-  
tilag. cōstat.

In brutis  
substantiala-  
ryngis carti-  
laginea est.  
Hominis in  
consistente  
ætate con-  
stituti la-  
rynx ex os-  
sibus con-  
stituitur.

**T**RACHEAM Arteriam, atque eius caput laryngem ex cartilaginibus, non ex ossibus constructam esse cum veteres, tum recentiores Anatomici existimarunt: quorum authoritati subscribere non grauarer, nisi rei natura multo aliter haberet. Neque mirum videri debet, tot celebres viros hallucinatos esse in substantia laryngis: facilis enim est error, si brutorum, ut bovis, & huiusmodi aliorum laryngem intueare, qualem Vesalius publice semper secare, atq; ostentare consuevit. Verum si humanam inspexeris, præsertim in consistente ætate, procul dubio ossi-  
cula

cula omnia, ex quibus conficitur, agnosces epiglottide excepta, quæ fistulam tegit. Ea vero lingua formam referens lingula nuncupari Latine solet. Græcam vocem magis amantibus Epiglottis dicitur. Quam cartilagineam esse oportuit, ut sine ulla noxa continuum motum admitteret, qui expirando, inspirandoq; continenter editur, præterquã quod moveri quoq; illam necesse est, dum aliquid deglutimus, dumq; loquimur, ubi modo attollitur, modo deprimitur, ac præterea in vomitu ad cōtraria reuollitur: quos motus facillime consequitur cartilagine in quamlibet partem cedente. At reliquas laryngis partes, quoniam osseam naturam ut antea diximus, sapiunt; nos inter ossa connumeravimus proprio de illis capite. Quod autem laryngem sequitur, aspera arterie tractu finitur, idq; totum cartilagineum est, & crebris anulis distinguitur: qui tamē anuli non ex cōtinua cartilagine constant: siquidem parte posteriore vertebrae versus, ubi œsophagus, siue gula canalis iuxta extenditur, intersecti sunt, membranula tamen eos illic copulante. Non enim abrupti esse poterant: at nihilominus ipsi œsophago cedere illos operæpretiū erat, ne deglutiendis cibis, cartilagineis compressione pateretur. Hanc membranulam si detrahas, protinus anuli diulsi apparebunt, ac formam C nostri elementi præseferent. Iam vero simul iunguntur vestiente membrana, quam in

Epiglottis  
quid sit.

Cur Epiglottis sit  
cartilaginea.

Cur de laryngis partibus plerisque loquitur in libro de ossibus. Anulorum tracheæ substantia qualis.

Anulorum figura detractione membrana qualis.

In Angina acutissimo Angina affectu præscindere fortasse quandoque non abre foret. Hic aspera arterie ductus sub iugulis definit, ubi duos in ramos scinditur, qui rursus in alios duos, itemque ij in alios, ac denum omnes per pulmonum substantiam disperguntur aerem inspiratum, ac expiratum deferentes.

## De spinæ dorsi cartilaginibus.

## CAPVT VI.

**D**ORSI spina vertebrarum serie producit<sup>ur</sup>, quarum corpora supra, infraque cartilaginibus crassis committuntur: primam tamen

Prima vertebra dorsi cartilagine caret.

Cartilaginū vertebr. v. sus.

Cartilag. vertebr. figur.

Cartilago sub sacro.

Cartilago inter ossa coccygis.

Cur cartilago inter primum & secundum os coccygis in mulieribus multa,

vertebram excipito, quæ corpore caret, nec ulla cartilagine donatur. Prestant autem huiusmodi cartilagine, ut laxior quodammodo sit corporū vertebrarum inuicē facta articulatio, quo facilius antrorsum, retrorsum, & in utrumq; latus flecti possint. Hæ vertebrarū corporibus latitudinem respondēt illorū superficiē æquantes. Ideo quæ admodum illa in descensu magis agētur, ita quoque cartilagine maiores, crassioresque fiunt, ut grauiore ossium mole depressa non deficerēt. Sub osse sacro, ubi Coccyx affigitur, cartilago similiter assidet: ac præterea inter primū, ac secundum eiusdem os interposita est, multa quidem illa, & præcipue in mulieribus: quoniam dum pariunt, cauda ipsa versus posteriora trahitur, cum tamen in viris nunquam a sua sede dimoueat<sup>ur</sup>.

De



De cartilagine quæ in superiore pectoris parte posita est. CAP. VII.

**S** V M M V M sternum utrimq; cartilaginem Situs.

habet, quatenus iugulorū annexū admittit, Vfus cartilag. mobilis in summitate sterni multiplex.  
 quæ mobilis est vsus eosdem præstans, quales in maxilla inferiore non absimilem cartilaginem præstare diximus: quamquam non tam prompti nec tam crebri sint hic, quam illic motus: in magnis tamen vociferationibus, nec nō in deglutendis cibis plurimum inspirationi, atq; expirationi conducit, dum pectus modo contrahitur, modo assurgit: ac demum totius brachij motum expeditiorem efficit.

De cartilagine medio pectore posita.

CAPVT VIII.

**I** N T E R primum & secundum os pectoris cartilago quædam sita est, quæ mollis existit, ac ligamenti vicem tenet, & idoneam motui magis Cur medij pectoris cartilago mollis.  
 superiorem partem reddit.

De costarum cartilaginibus.

CAPVT IX.

**C** O S T I S quoque adnascuntur cartilagines Costæ tum veræ, tum spurix cartilagines habent.  
 veluti appendices quædam, quatenus solum partem anteriorem respiciunt, tam veris, quæ pectoris ossi committuntur, quam nothis costis donata. In quibus illud animaduertere est, quod breuioribus costis, breuiiores quoque cartilagines contigere: longioribus autem longiores. Huc adde quod superioribus rotundæ cartilagines, Costis breuiorib. breuiiores sunt cartilagines & e cõuerso, Curvaria sit figura cartilaginum costarum.

*inferioribus vero non acuta prominent. idque, ut costa facilius pulmonis motum subsequatur. Nam thorax semper attollitur, ac deprimitur: qui motus etsi naturalis est, nō adeo tamen liber esset, si vniuersa costarum substantia ossea fuisset: nec praterea voluntarios thoracis motus, quales in emittenda voce contingunt, diu natura sustineret, nisi cartilaginum opera haud laboriosam pectoris dilatationem subministraret.*

Cartilaginumin thorace vtilitates.

Thoracis motus voluntarius est.

Costarū notarū vsus.

*Costa autem nothe amplius prestant, quod turgescenti ex repletione ventriculo cedunt: quod munus haud est exiguum, cum ipsa compressio noxa plurimum afferre possit.*

### De Scutiformi Cartilagine. CAP. X.

Imi pectoris cartilaginis figura.

**P**ECTORIS OS, quod alio nomine sternon appellare cum aliis solemus, in ima sui parte cartilaginē habet triangulari forma: licet quandoque quadrangularis, nōnumquam bifida cōspiciatur. Hanc nonnulli gladiolum, alij Scutiformem, seu scutalem cartilaginem, alij mucronatam vocant, Arabas sequentes malum granatum dixerunt. Graci *Ἐποειδὴν* appellarunt.

Imi pectoris cartilaginis nomen claturæ.

Vsū mucronatę cartilaginis vulgo.

Vsū verus cartilaginis mucronatę.

Cur vulnus acceptū in

*Hac non ideo facta est, scuti vulgo creditur, ut ventriculi os veluti propugnaculū tueatur: cum in sinistro latere ab hac cartilagine longe absit. Caterum cordi presidet, & septum transversum munit, quippe cui eius tendo subnectitur. Quocirca lethale vulnus est, quod huic parti infligitur:*

ur: quoniam natura cartilaginem hanc, tamquam scutum aliquod opposuit. Ea vero ita con-  
 zata est imo pectori, ut non nisi summa vi di-  
 celli possit. Quamobrem deridendi sunt, qui pu-  
 ant hanc nonnumquam decidere solere.

De Cartilagine Scapulæ, Coxendicis, ac  
 Tibiæ sinibus apposita. CAP. XI.

[N Scapula capite sinus est, cui Cartilago mo-  
 bilis obducitur illius augendi gratia: siquidem  
 tanta esse non poterat in ea parte scapula moles,  
 neque adeo profundo sinu, qui alto humeri capiti  
 excipiendo sufficeret. Natura ergo hanc incre-  
 menti rationem excogitavit, ut altior profun-  
 ditas illa fieret: ac miro artificio consuluit, ut ex  
 cartilaginis mobilitate agilius esset articulatio:  
 itaque etiam ex sinus altitudine difficilior humeri  
 luxatio redderetur. Quæ licet raro accidat, ta-  
 men non sine magno labore reparatur. Talem  
 Cartilaginem offendas in coxendicis cavitatem,  
 cui oblongum, rotundumque femoris caput inse-  
 ritur. Ea vero nusquam mobilis est, sed eam ob  
 causam tantum parata, ut dicti sinus supercilia  
 altius produceret, itaque profunditas illa maior  
 feret: quando non tam alte coxendicis os ibi ex-  
 auari poterat, quantum femoris capitis longitudo  
 postulabat. Iam vero ab inferioribus femoris ca-  
 vitatibus ad supremam tibiæ regionem binæ carti-  
 lagines inveniuntur, altera interior, exterior al-  
 tera, semicirculares, & introrsum pertracta ad

cartilagine  
 mucronate  
 sit lethale.  
 Cartilago  
 mucronata  
 non decidit  
 ut mulier-  
 culæ existi-  
 mant.

Cartilagi-  
 nis mobilis  
 in sinu capi-  
 tis scapulæ  
 utilitates  
 plures.

Humerus  
 raro luxa-  
 tur.  
 Humeri lu-  
 xatio diffi-  
 cile restitui-  
 tur.  
 Cartilago  
 in acetabu-  
 lo coxendi-  
 cis non est  
 mobilis.  
 Vfus carti-  
 laginis in fi-  
 nu coxen-  
 dicis.  
 Cartilagi-  
 nes duæ in  
 inferiorib.  
 capitib. fe-  
 moris.



**V**fuscaram. *tuberculū illud desinētes, quod e media tibia superficiei assurgit, ubi pariter annectuntur: facta sunt, ut sinus in summa tibia hinc inde exculptos adaugeret, quo apti<sup>9</sup> imi femoris capita illis infereretur, nec tamē articuli mot<sup>9</sup> impediretur.*

De cartilagine iuxta brachiale posita.

## CAPVT XII.

**V**ERVM ad brachiale veniamus, de quo post omoplate cartilaginē statim dicendum fuerat. Iuxta stylum, qui ab extremo cubiti capite progignitur, quemque falso Galenus voluit cum quarto brachialis ossē coarticulārī, sicuti capite suo probauimus: apposita est cartilago, quae locum illum, alioqui vacuum implet, tum vero cauet, ne manus extrema, dum ad latus deducitur, in acutum illum processum impingat, atque eo modo non minimum leditur.

De cartilagine sita inter pubis ossa.

## CAPVT XIII.

**C**artilaginis inter ossa pubis substantia, & figura. **I**NTER pubis ossa tibi occurrit cartilago insignis pertinaciter inherēs, quae parte superiore lata, & crassa in descēsu paulatim imminuitur, ac demum in acutum desinit ibi enata, ut ossa haec non secus, ac tenacissimum glutinum cōmitteret, atque adeo cōnexa inuicem redderet, ut connata rectius, quam cōiuncta existimentur. Vnde superiore libro illorum opinionem reprobauius, quos asserere minime pudit in emit-  
**Ossa pubis** tēdo foetu ossa haec reserari, quandoquidē dimo-

neri

veri nullo modo posse nouimus, cum saepe nō modo aperiri in  
 dico labore nostro cultro diuidēda curauerimus. partu fal-  
 sum est.

## De articulorū cartilaginib. CAP. XIII.

**D**ANTVR praterea articulis quibusque car-  
 tilagines, siue motus ex iis obscurus pro-  
 deat, seu manifestus. Cartilaginibus autem in-  
 crustata ossa ibi esse debuerunt leuibus, ac lubri-  
 cis, vt faciliore motu cierentur, neque tamen ex  
 mutua consfrictione attererētur: propterea vide-  
 re est mucū superadditum, quo veluti pingue-  
 dine quadā articuli ipsi inungerētur, quē admo-  
 dum locis multis est superiore libro repetitum.

Cur ossa in  
 articulis car-  
 tilagine in-  
 crustentur.  
 Cur in arti-  
 colorū car-  
 tilaginibus  
 adsit mucus  
 quidam.

## De vnguibus. CAP. XV.

**Q**VAMQVAM mediam quandā naturam Vnguium  
 inter ossa, & cartilagines vnguibus inesse natura qua-  
 nonnulli vere iudicarunt, quia neque ea duritie lis.  
 sunt, qualem in ossibus experimur, neque molles  
 ta, vt cartilagines, a quibus praterea colore plu Vnguīū co-  
 rimum disident: nihilominus hos cartilaginum lor diuersus  
 tractationi adiunximus, cum ad ipsarū naturā a colore car-  
 propius accedere videantur. Earum enim ritu tilaginis.  
 mollissimam digitorū superficiem tuentur, ne ab Cur de vn-  
 extrinsecus occurrentibus laedantur: ac ideo fir- guibus agat  
 namentū non modicum ob sui duritiē prebent, post cartila-  
 apprehendendi s̄q; duriorib. reb. vsui sunt perne- gines.  
 cessario, cum interim flecti, & cedere parati sint, Vnguium  
 vt ne frangantur. Vngues tum a cute, tum a ten- vsus.  
 dinibus musculos digitorum extendentibus ori- Vnguium  
 ginem trahunt, quamquā tendines sub vngui- origo.

Cur sub vn-  
guibus sit  
sensus ex-  
quisitus.

*bus usq; ad digitorum extremitates deferantur. hic enim postmodum dilatantur. Quamobrem perspicuum est, cur sub vnguibus tam exquisitus sensus delitescat: quod ego primus obseruavi, & excellentissimo Medico Alexandro de Ciuitate, rei anatomica studio sissimo lubens ostendi.*

## REALDI COLVMBI CREMONENSIS

### DE RE ANATOMICA, Liber III.

#### DE LIGAMENTIS.

Nomen.

Substantia.



Situs in vni-  
uersum.

Vfus.  
Nominis  
interpreta-  
tio.

Cur liga-  
menta sen-  
su careant.

**L**IGAMENTVM (vt a nomi-  
bus interpretationem exordia-  
mur) a Græcis σύνδεσμος, id est,  
vinculum, appellatur. Substan-  
tia constat dura quidem, sed quæ  
tactui cedit & albicat: quæ durities minor etiã  
in eo est, quam in cartilagine. ab osse incipit & in  
os desinit, præter quædam, vt priuatim magis  
suo loco explicabitur. Factum est igitur ligamen-  
tum, vt membra nostra colliget, propterea quæ id  
nomen sortitum est. Dissoluti namque absq; eo  
essemus, neque moueremur. Sed vt ad ligamenti  
substantiam redeamus, licet neruea videatur  
esse, est tamen sensus omnis expers, instar ossis  
& cartilaginis: qua in re miris laudibus extol-  
lenda est nature prouidentia: nam si præditi  
essent



essent sensu Syndesmi, cum ossa mouerentur, non possemus non laborare. Præterea genita sunt etiam ob musculorum productionem ligamenta, quemadmodum adnotauimus, cum de appendicis usu tractabamus. Nutriuntur autem tenui medulla: propterea inter ossa & appendicem natura collocauit ligamenta, ut suum ita ad sese commodius attraherent alimentum. Sed quamuis idem pene sit ligamentorum omnium situs, ut dixi in aliis, tamen plurimum inter se differunt: nam ex iis alia crassa sunt, alia tenuia, alia magna, nonnulla parua, alia lata, angusta alia, quedam teretia, quedam vero minime, & alia differentias diuersas sortita sunt, sicuti tunc expressius dicetur, cum particularis eorum fiet distinctio. Quod ut ordine fiat, a capitis ligamentis initium faciemus. Est enim pars princeps caput, quicquid hac de re sentiant philosophi.

Vfus alius  
ligamentorum.

Ligamentorum  
nutrimentum.

Ligamentorum  
differentia.

Caput est  
pars reliqua  
rū princeps,  
quicquid dicant  
philosophantes.

## De capitis ligamentis.

## CAPVT. I.

**A**CAPITIS igitur ossibus, maxillæq; superioris inter suturas, atq; harmonias ligamenta exoriri videbis, tenuia quidem, sed lata: quæ præterquàm quod hæc ossa vnà valido nexu vinctiunt, ob eorū etiā musculorum originē facta sunt, quæ ab hisce partibus ortum ducunt, ut musculi tū faciei, tū inferioris maxillæ & oculares, quos omnes a futuris, aut harmoniis exoriri videbis.

Situs.

Vfus.

De Ligamentis caput cum duabus primi  
vertebris nectentibus. CAP. II.

Articulatio  
capitis cum  
vertebris no-  
bilissima est.

**C**VM articulatio capitis cum vertebra no-  
biliores, magis excellens maiorisq; momenti  
existat, quam reliquæ sint articulationes: qui-  
mirum si natura humano generi mater diuin-  
spiritu afflata maiore curâ, diligentiamq; in ha-  
una quâ in reliquis adhibuerit? Nam cum tant-  
moles, quanta caput esse cernitur, tã exiguis ver-  
tebrarum ossibus cōnectenda foret, præter processum

Cur ligamen-  
ta capitis cū  
vertebris pri-  
mis validissi-  
ma sint.  
Capitis luxa-  
tio lethalis  
est.

atq; in ossibus canit ates ligamenta meditata est  
eag; validiora quam cetera omnia nostri corpo-  
ris. Cum enim articulatio hac luxationem nulli  
pactō patiatur, est namq; capitis luxatio lethalis  
curavit eiusmodi esse ligamenta, quæ partes hasc  
adeo arte fideliterque continerent, ut difficillima  
horum sit luxatio. Licet vulgo existiment iis  
qui suspenduntur, longamq; literam suspensio-  
efficiunt, caput luxari: quam sententiã ego profe-  
cto inanem esse falsamq; deprehendi, neg; seme-  
dumtaxat, sed sæpius Patavij, Pisis, Romæque  
Tantum etenim esse huius ligamenti robur anim-

In suspensio-  
laqueo caput  
non luxatur.

Secunda ver-  
tebra facilius  
frangitur quā  
luxetur.  
Ioan. Francis-  
cus Manfredi-  
dius.

advertisse, ut frangi facilius quam luxari secund-  
vertebra possit, neg; secunda solū, sed prima quo-  
que: quam rem Ioan. Francis. Manfredius excel-  
lens Medicus, anatomes studiosus & familiaris  
meus non potest satis mirari. A basi itaque occi-  
pitis ligamentū exoritur, quod ut melius alere-  
tur, stabiliusq; existeret, natura occipitiū in pue-

Origo liga-  
menti huius.  
Cur occipitiū

is multiforme genuit, ut hic stabilimentum esset  
 rarius: orbiculare est hoc vinculum, & deorsum  
 descendens inter primam, secundamque verte-  
 ram, non figitur, ut nonnulli sunt opinati, sed v-  
 rig, circumquaque, validissime adhereret, ita ut  
 vel in mortuis ipsis difficillime dinelli queat: ad-  
 heret autem dictis ossibus ante retroque & ad la-  
 tera. Præter descriptum a nobis hæcenus liga-  
 mentum, adest aliud quoque, validum satis, quod  
 secunda vertebrae valide adnectitur: præter  
 hoc adest & tertium, quod ab interiore prima  
 vertebrae parte, exortum secunda dentem continet  
 dictum est autem in tractatu de ossibus de hoc dente  
 et teres, sed admirabili arte latera ipsius constru-  
 ta sunt, ne dens cum caput nimis inclinandum  
 est, spinalem medullam lederet, qua illac transit.  
 Atque hoc se habent pacto ea ligamenta, quæ capi-  
 is motibus descriunt. Et quoniam nimis prolixi  
 sumus, si de singulis uniuscuiusque articuli liga-  
 mentis priuatim tractandi provinciam suscipere-  
 mus, propterea omnia capite uno comprehendemus,  
 aque præsertim quæ in re alia non discrepant in-  
 ter sese, nisi quod hæc maiora sint, illa minora: id-  
 circo maxillam inferiorem silentio præteribimus,  
 de cuius ligamenti post capitis ligamenta tra-  
 ctandum foret. De aliis igitur agam quæ aliquo  
 pacto differunt. Et quoniam scribit Gal. libro de  
 ossibus, vertebrae medio proprio ligamento non  
 coniungi, sed a tertia dumtaxat tunica, quæ spi-

fit in pueris  
 multiforme  
 Figura.  
 Error quorundam  
 de sicu.  
 Locus verus  
 ligamenti  
 huius.

Ligamentum  
 dentis secun-  
 dae vertebrae  
 Ligamentum  
 tertium.  
 Usus tertij li-  
 gamenti

Cut de singulis  
 ligamentis  
 non agit;

Gal. error;



*nalem medullam inuestit (quam tunicam meam inquit inter vertebrae ferri, easque connectere) scito dictum hoc profecto tanto scripto indignum esse: quo enim pacto illi verisimile uideri poterat, vertebrae ossa non parua a tam exigua membranula, quae est in vertebrarum for-*

*mine, quae spinalis medulla transit, contineri posse? Vfus autem verus membranula illius est, spinalis medulla ossibus immediate occurreret, quibus ladi facile potuit: ex qua re maximè incommodum non sequi non poterat. Sciendū ita est vertebrae omnes (primas duas excipio) infus supraque, appendicibus praeditas esse, quemadmodum suo loco dictum est, e quibus valida exortuntur ligamenta vertebrae inter se colligantia, cartilaginemque inter vertebrae mediam detinent. Valida vero fuere satis, propterea quod onus ingens vertebrae gestandum fuerat, & magnis validisque motibus resistendum: horum autem ligamentorum hic est deductus: ab inferiore scilicet secunda vertebra parte, ad coccygis usque extremum, circa cuius corpus sunt sita: ab eius transuersis processibus alia insuper prodeunt ob musculorum & costarum compagem, a posteriori quoque alia emergunt, cum ut vertebrae neant, una tum ob nonnullorum musculorum exortum.*

*De hyoidis ac linguae ligamenti. CAP. III.*

*INTER ossa hyoides constituentia ligamenta transeunt ob linguae constructionem, a duobusque*

Vfus verus membranulae quae est in vertebrarum foramine. Omnes vertebrae habent appendices primis duabus exceptis. Ex appendicibus vertebrarum oriuntur ligamenta. Cuius ligamenta vertebrae sunt valida. Deductus ligamentorum vertebrarum. Vfus ligamentorum a transuersis processibus.

etque processibus maioribus duobus proficiscuntur, quibus summa lingua articulatur. Duo præter alia a styloïdibus exeunt, in duosque minores hydes processus immittuntur, idque instar duarum tenarum suspensum detineant, quemadmodum Labumetti arca ferream a magnetis vi attractam in aere aiunt suspendi. Adest insuper sub lingua ligamentum, quod multis adheret locis ad dentes usque anteriores: hoc linguam attolli non sinit, non sinit labra exire, impedimentoque est ne loquissimus, hoc est dearticulatas voces efferre, propterea hoc secamus, ut hæc impedimenta tollantur.

De ligamento brachialis. CAP. IIII.

QUONIAM brachiale ligamentum ab aliis articulis diuersum obtinuit, propterea hoc separatim agemus. Ligamentum igitur brachiali deseruiens, oritur ab appendice inferiore cubiti radiique, cuius munus esse videtur, instar aliorum articulorum prosequi ad postbrachiale: sed quia octo brachialis ossa in duos distincta sunt ordines, illi inter ea ingredientium fuit, ne in motu et situ suo elaberentur. Pruens igitur natura ligamentum parauit validum, quod hæc ossicula subit, itaque colligat, ut propriis motibus edendis idonea esse possint: sed in appendicem ossis postbrachialis tandem implantatur, deseruitque brachialis articulationi. In hac eadem regione alia ad sunt ligamenta articulandis ossibus minime deseruientia, sed illis duntaxat

Duo ligamenta summa linguae.

Duo ligamenta ossis hyoides suspensum detinentia.

Mahumetti arca.

Ligamentum sub lingua.

Cur in pueris ligamentum sub lingua feceretur ab obstetricibus.

Ortus.

Insertio.

Ligamenta  
tendinum di-  
gitorum &  
extremæ ma-  
nus.

Ligamenta  
tendinū mu-  
sculorum ex-  
tendituum  
vnum viden-  
tur, sed sunt  
sex.

De ligamētis  
continentib.  
tendines per  
longitudinē  
digitorum.

Gal. errauit li-  
bro de vsu  
Part. sed erro-  
rem agnoscit  
libro de Ad-  
ministrandis  
Sect.

tendinibus continendis, qui cum digitis tum ex-  
trema manui famulantur: idque ne dum mouē-  
tur hac illac temere ferrentur. In interno itaque  
brachiali ligamentum validum cernes, idque  
transuersum, quod tendines continet quarti, quinti  
sextique musculorum digitos flectentium. In exter-  
no vero sex ligamenta cernere est, tendines item  
extendentium musculorum continentia. Illud  
maxime animaduertendum est, hac quæ dixi li-  
gamenta primo occurſu vnum videri. Verum  
tendines persequi accurate non grauaberis, oc-  
current tibi sex ligamēta transuersa a dictis du-  
abus appendicibus ortum ducentia. Sed postea  
quam ad hunc locum deuenimus, operæ pretium  
facturus videor, si de iis ligamentis tractauero,  
quæ tendines continent per longitudinem digi-  
torum. Animaduertendum itaque est ab in-  
ternis ossibus digitorum a lateribus, iuxta eorum  
longitudinem adesse ligamenta, ad extremita-  
tem tendinum vsque pertinentia, quæ hoc in lo-  
co prudēter natura collocauit, ne inflexione ten-  
dines extra ipsorum sedem attollerentur. pro-  
pterea Galenus libro de Vsu Partium aiebat ope-  
tendinum quinti musculi tertium internodium  
flectentium primum quoque flecti, at rei veritatem  
lib. de Administrand. Sect. agnouit.

De ligamentis femoris, tibiaeque. CAP. V.

**I**N articulo femoris cum osse coxendicis ilij,  
ac pubis, præter membraneum quidem vin-  
culum,



ulum, sed crassum, quod articulis omnibus commune est ligamentum videbis teres ac longiusculum, quod cum a profundo acetabulo ortum duat, in superius femoris caput insertum deperditur, idq; roboris ergo, quod dum hac pars laxatur & penumero disrumpitur: & quamvis os in locum pristinum redeat, luxatus tamen semper claudicat: hoc. n. ligamentum impedimento est quo minus ossa illa cohareant. Inter capita item inferiora femoris, summamq; tibiam in interiore parte genu adest ligamentum crassum, quod & ab eorum appendicibus exoritur, & in ea desinit; constructum est autem ut has partes contineat, cum etenim his duobus articulis nullus in corpore maior existat, quid mirum si natura prudens hoc loco eiusmodi apposuit ligamenta, qualia nusquam apposuerat, praterquam inter caput & duas primas vertebrae: cum ab hoc tertio ligamento discesseris, adest aliud, quod genu articulatione fere circumcircuit, sed hinc atq; hinc genu rotulam ambit, a qua dumtaxat detinetur. Imperiti complures opinantur id genus ligamenti teretis inter caput humeri, scapulag, reperiri sed mire falluntur, quod admodum qui sensu pollet experiri facile poterit.

Cur quandoq;  
ager claudicat, licet luxatio coxendicis sit restituta.

Ligamentum ambiens rotulam genu. Inter caput humeri & scapulam nullum adest teres ligamentum.

De ligamento quod inter sacrum os & coxendicis situm est. CAP. VI.

**Q**UAE nates cernis, inter os sacrum, & coxendicis ligamentum adest, quod tantum non est teres: id autem oritur ab extremo osse

sacri, transversumque desinit in acutam coxendicis partem, colligat hac ossa, proptereaque factum  
 Vfus. est ut colligata detineat, licet alter usus adduci possit, ut scilicet maiori neruo qui in homine reperitur aditus, pateat.

De ligamentis transversis in pede. CAP. VII.

**I**N extremi pedis articulo, inter ipsum tibiāq; & fibulam, præter id vinculum, quod iuncturis

Sex ligamenta extremi pedis, proportionem respondet ligamentis brachialis extremioris. omnibus commune est, sex alia conspiciuntur, qualia in exteriore brachiali cernebas. Vfus horum est, ut eos tendines contineat, qui extremo inferuntur pedi, digitisq; qui nisi hic tendines adessent, a suo situ nullo negotio dimouerentur. Subiungunt quoque pedis digitis ligamenta, quemadmodum digitis manus. Construxit autem ipsa natura

Vfus. ligamentorum ut in officio continerent tendines illos, qui digitos flectunt, secundum inquam tertiumque internodium. De ligamento reliquorum articulorum.

## CAP. VIII.

**A**rticulis omnibus ligamentum commune est: id vero ab osse uno ortum ducit: ab appendice nimirum, & in aliam desinit. Hæc

Enumeratio partium complurium quæ ligamentis prædicta sunt. vero in orbem amplectuntur, nec desunt alia laxiora, angustiora alia, iuxta ossium magnitudinem paruitatemque. Ideo hoc loci de omnibus ligamentis actum existimato, quacumque thoracem vinciunt, scapulas, iugulaque, necnon inferiorem maxillam, humerum, cubitum, digitos, fibulam, tarsum, ossa pedis: quod si de ligamentis

ily pubisque interroges, hæc ab aliis præterquam in motu non differre, respondebo.

De ligamentis cubito, tibiæ, ac pubi appositis. CAPVT IX.

**I**NTER cubitum, radiumque, inter tibiā, ac fibulam iuxta eorū longitudinem membranosum ligamentum cernere est, quod inter horū ossium interualla situm est, cuius utilitas est non modo ut vniat, ac vinctat, sed ut interiores musculos ab exterioribus distinguat: eodem se habēt pacto vincula, quæ sunt in pubis foramine, nonū muscolum a decimo diuidentia.

Ligamentū  
membrano-  
sum.

Vfus.

Ligamentis  
pubis utili-  
tas.

De ligamento hepatis. CAP. X.

**H**EPAR duobus præcipuis ligamentis cōtinetur, quorū alterū dexterā, alterū leuā partē respicit. Ex quibus sinistrū dextero crassius admodū est: hæc septo trāsverso hepar adnectūt, ne deorsum sua mole ac pōdere procūberet. Horum igitur ligamentorū dexterū suspensoriū vocitāt, at sinistrum nullo peculiari nomine insignitur.

Duorum li-  
gamentorū  
iecoris vfus.

Locus admoneret, ut de mediastino, pericardio, pleura, nec non peritoneo, verba facerem: nā hæc quoq, sunt ligamenta: sed de his in tractatu de membranis sermonem reiicimus: quoniam si res ad viuum secaretur, membrana sunt potius, quam ligamenta: cum hæc sensu aliquo sint prædita, quo vero ligamenta omnino carent, cum a iecoris ligamenti discesseris: hæc enim sola inter ligamenta, non sunt prorsus sensus expertia.

Mediastinū  
pericardiū,  
pleura, peri-  
tonæū sunt  
membranæ  
potius quā  
ligamenta.  
Iecoris liga-  
menta non  
sunt prorsus  
sensu de-  
stituta.



262 REAL. COLVMBI CREM.  
REALDI COLVMBI  
CREMONENSIS  
DB RE ANATOMICA,  
Libcr IIII.

DE SCELETO.

Sceletos.



Sceleti descri-  
ptio.

AMPRIMVM *omniū*  
quid Sceleti nomine signi-  
ficetur, explicandum est.  
Sceletos igitur Græcis ho-  
minibus nihil aliud signi-  
ficat, quam osium exsicca-  
torum cadauer, cuius in-  
spectio non modo nostris, sed priscis etiam temp-  
ribus in vsu extitit, quemadmodum ex Gal. pri-  
mo de Administrandis Sectionibus colligere  
possumus: vbi historiā recitat, quo pacto ipse di-  
scendi cupiditate inflammatus, se in Alexandriā  
contulit, quo loco medici aderant, qui hanc hu-  
mani corporis osium compagem se docere profi-  
tebantur. Atq; ibi duos sceletos suis oculis vidit,  
quorū alter suspensus pendebat aubus expositus,  
quæ carnem, quibus ossa vestiuntur, vniuersam  
deuorauerant ossibus relictis, quæ suis inuicem  
ligamenti detinebantur: alter vero in sepulchro  
iacebat, qui a Nili fluctibus vehabatur, tandēq;  
ad

ad ripam fluminis appulit, ubi constitit, erantque illius ligamenta exsiccata. Sed profecto (pace Galeni dixerim) neuter horum ossium disciplina accommodari poterat. Nam in his duobus sceletis articuli omnes ossium ligamentorum velamine delitescere cogebantur: at absque articulationum ossium exacta cognitione, imperfecta est sceleti cognitio, & historia. Qui enim scias: nunquid ulla adsit cavitates, tuber ullum: atque haec omnia altius ne, an in superficie sita, suscipiant ne an suscipiantur: atque alia id genus complura, quae in ossium explicatione maximè doceri discitque afferunt adiumentum: quemadmodum ingenue fassus est excellens Franciscus Frigimelica, cui ars medica multum debet. Is Patavij hominis sceletum suis cum ligamentis calce detinebat, idque in illius florentissima Academia gratia, cui semper prodesse studuit. Sed in sceleto propriis ligamentis iuncta non posse omnia disci doceri que optimus vir cognovit. Sceletos itaque consistare debet ex ossibus quae prius coquere, hoc est, elixare maxima cura debes, quicumque sceleton domi parare studes: cura inquam magna in ossibus elixandis adhibenda est, ne processus, cartilagineaeque in earum extremitatibus incrustante aliqua in parte ledantur. Cadaver autem, ex cuius ossibus sceletos construendus est, esto juvenis non obesus, statura pusilla potius, quam procera: nam visu pulchrior evadet: hoc ca-

Quomodo  
sceletos para-  
ri debeat.

Ex qua statu-  
ra parandus  
sceletos.

dauet, quale descripsimus, excoriandum primo  
 est, deinde caro adimenda omnis, quoad eius fie-  
 ri poterit, visceraque omnia interna abiicienda.  
 Illud autem obseruandum est, ut dum fabricam  
 hanc humani corporis expolias, aures diligenter  
 adimas, seruesq; item nasi dimidium, extremum  
 illud scilicet narium, quod cartilaginosum exi-  
 stit: item palpebras, os hyoides dictum: laryngem  
 una cum frustulo aspera arteria. Postquam hæc  
 omnia accurate effeceris, cranium secandum est,  
 supercilia versus, idque propterea, quod cavitatis  
 in fronte latitans huiusmodi sectione detegetur.  
 Cerebrum postmodum una cum membranis a  
 cranio ita separandum est, ut interna caluarie  
 pars munda prorsus, atque sordium expers re-  
 linquatur. Deinde secundam vertebra a ter-  
 tia omni industria separato. Deinde maxillam  
 inferiorem adimito, ea tamen lege, ne cartilagi-  
 nem illam mobilem, qua inter caput, maxillam-  
 que inferiorem sita est, vel tantillum labefactes:  
 hanc chartis seruato. Deinde costarum cartilagi-  
 nes sensim a costis ipsis seiungito. Sinito tamen  
 dictas cartilagines ossi pectoris adherentes, ne-  
 que ullo pacto diuellito. Extremas item costas,  
 cum cartilagine non iungantur sterno, aliis adi-  
 mes quoque cartilagines suas, ac in papyro itidem  
 pones. Summa quoque diligentia adhibenda est,  
 ne dum has una cum sterno eximis, duas mobi-  
 les cartilagines ladas, que inter iugula, sternum-  
 que

Obseruatio  
 in expolian-  
 do scelecto.

Cranij se-  
 ctio.

Cartilagi-  
 nes pectoris  
 ossi relin-  
 quendæ.



que sunt sita, quemadmodum de mobili cartilagine, inter caput, maxillamque inferiorem paulo ante dicebamus. Illud autem de sterno cum cartilaginibus meminisse oportet, hæc in cacabum non immitti: non enim coquuntur, sed soli exposita exsiccantur, itaque seruantur: larynx item, & hyoides os, & aures, & naues, & palpebræ eodem modo seruanda sunt separatim: neque enim vllum ex his coquitur. Postquam hæc omnia absolueris, costas a corpore vertebrarum paulatim diuelle, necnon ab eorum transuersis processibus: quod si in osium scientia parum versatus fueris, sinistras costas una vincies, atq; a dextris semoueabis. Dextras item a sinistris separatas colligabis, ne misceantur, idque ordine facies, ut primo primam, secundā deinde, & tertiam successiue. Ablatis costis, incipe eas cartilagines amouere, quæ inter vertebram, & vertebram sunt: idque gladio facito, cuius acies tenuis sit, & dictum ac factum incidat. Incisio vero ad corpus vertebrarum perreptet. Caue tamen, ne ad illud ita accedas, ut appendices ladas, quæ non admodum duræ existunt: itaque progredere vsque ad ossis sacri summum, easque cartilagines chartis impone, idque ordine facito, vel eas acu perforatas filo excipias: item dictum puta de cartilagine, quæ inter sacrum & coccygem sita est, & inter ossa pubis. Quo vero ad dorsum pertinet, vniuersum in tres partes diuidito, & se-

Cartilagine  
nes nō sunt  
coquendæ.

Appendices  
non læden-  
dæ.

Cartilagi-  
nes filo exci-  
piendæ vel  
in chartis  
seruandæ.

paratim colligito, ut in lebetē melius aptentur. His peractis, diligenter inspicere poteris, nūquid in acromio tertium illud os adsit, quod Galenus in hominibus dumtaxat inueniri assenerat, & scapulā ab humero separabis. Præterea circa scapula concavū, ubi cū humero articulatur, Cartilaginē illā tolles, quæ ibi a natura de industria apposta fuit, ut sinus ille profundior evaderet. Post modum separabis humerum a cubito, rursus a cubito extremam manum: quod dum agis, animaduerte, obsecro, an styloides processus quartum os brachialis ingrediatur (quemadmodum Galenus scriptum reliquit) necne; suspice quoque supra styloidem: nam mobilem ibi quoque cartilaginem inuenies, quam chartis recludes, ut supra. De aliis id genus sapius admonuimus. Deinde femur a coxendice diuelles, & hoc etiā loco circa acetabulum mobilis tibi occurret cartilago instar illius, quam circa scapulam obseruaueras: seiunges etiam a tibia femur: neq; hic desunt duæ cartilagines eaque mobiles a natura effictæ, atque efformatæ in eundem vsum, ut scilicet tibiae cavitates amplificarent, atque attollerent, a quibus capita inferiora femoris suscipienda erant: illud quoq; meminisse oportet, patellam adhaerentem relinquendā esse, ne sinistra, dextraq; confundantur. Post deinde extremum pedem a tibia distinguito, & cartilagines vel chartis recludito, vel filo, ut lubet, excipito. Idem agendum

An quartum  
os brachialis  
vniatur cum  
styloide.

dum est, ut supra attigi, de auribus, naribus, palpebris, hyoide, larynge, & cartilaginibus omnibus, quas ademer. & de sterno, quod nullo pacto aqua abluendum est. Reliqua in cacabum indes, ibique aliquamdiu finito, ut molliora reddantur, & quod reliquum est carnis adherens maceretur. bene abluito, bis, terque, & tunc terebello paruo perforabis caput superius, inferiusque tum humeri, tum cubiti, tum radij, tum femoris, tum tibiae, tum fibulae, ferrumque huic rei aptum per foramina dicta in horum ossium cauitatem immittes: idque ut medulla vniuersa exeat, quae retenta ossa denigrat, deformioraque reddit, quod bonus Vesalius non animaduertit: neque enim omnia animaduerrere magnus potuit anatomicus. Idem efficit in ossibus postbrachialis, digitorumque: idem in ossibus pedij, & iugulorum sterni versus, alio minori terebello haec ossa terebrans in capite altero dumtaxat: idque, ut ex albis ossibus sceletos constet: neque hisce foraminibus perexiguus sceletus turpitudinem accessuram esse verendum est: praesui enim exiguitate conspicua non sunt: quod si conspiciantur ossibus omnibus simul iunctis alba cera, aut glutine ex caseo confecto, quo fabri lignarij vtuntur, dicta foramina diligenter obturato. Postquam ossa haec, ut dixi, iterum laueris, in promptu habeas vas amplum aeneum, quale pro familiae lineis pannis sordibus abstergendis domi habent matronae: sit vero

Ossa a medulla retenta denigantur.  
Vesalij inscitia.

Qui ossa caedidiora fiant.



Ossa elixā-  
da vt carne  
denudētur.

Pinguedo  
teruadā nec  
ossibus re-  
linquenda.

aqua feruēti plenum in quam ossa ( vt diximus )  
denudata, & distincta immerges. Hoc etenim  
pacto candidiora euadunt. Illud præterea dili-  
gens sceleti faber obseruare nullo negotio poterit,  
vt manus, pedesque linteis prius inuolutos in a-  
quam immergat, ne articuli extremi, aut sesa-  
mina ossa pereant, confundātur ve: tam diu vero  
bulliant, donec ab ossibus caro sponte decidat: no-  
lim tamen carnem ab ossibus tam facile abscede-  
re, vt appendices relaxentur: nam magnum tibi  
negotium crearet, appendices ita dissolutas suis  
ossibus denuo apponere: quod facilius eueniet, si  
adolescentuli cadauer supra dicto modo coquas.  
Separantur. n. in hisce facilius ab ossibus appēdices.  
Post hanc ossium elixationem partem calua-  
riae superiorem primo eximes, ne sutura relaxen-  
tur: itaque curam adhibe ne squamosa sutura se-  
parentur, ne ve pars superior temporalium ossiū  
deperdatur, cum ab aqua eximenda ducis, lineos  
pannos paratos habeat crassiori filo textos, eosque  
rudes adhuc, neq; attritos vetustate, quibus ossa  
predicta abstergas: deinde caput, costas exime,  
ingulaque, postea brachia, & crura, item manus,  
pedes, inferioremque maxillam, postremo dor-  
sum cum ossibus ilium: quæ ossa singula tibi per  
manus tradita tela exsiccabis. Illud præterea ne  
obliuiscaris, quæso, vt dum ossa coquis, subin-  
de spumam, & pinguedinem incitantem tol-  
las: quæ tamen non sunt abiiciendæ, sed in vase  
conden-

condenda, ubi vero coagulata[m] videris pinguedinem, quæ spuma subest, exime ab aqua, & serua: est enim pluribus in rebus hac pinguedo perutilis. Exempta ossa ab olla aenea, magna & summa diligētia mūdata sint, cultro fabrefacto parauulo, cuius sit acies acerrima. Cauēdumq[ue] est (ut supra etiam attigimus) ne in cartilagine[s] articulis incrustatas offendas. nam si has attigeris, hoc est, incideris, mox articuli fatiscūt, & dissoluantur, hoc pacto, ne scēteant ossa. Fœterent autem, si aliquid carniū ossibus adherens relinqueretur, in quibus denudandis accuratus admodum sis, oportet. In separatione capitis a vertebris, quod non ita facile existimato, ob valida ligamenta, propterea sensim, atque oculate progreditor, ne transuersum ligamentum in prima vertebra positum ledas, quod ligamentum dentem secundæ vertebræ continet. Vertebra[s] ea, qua diximus, diligentia nudatas ordine ponito, funeq[ue] excipito, & in tabella vëto, soliq[ue] exposita tādīu detincto, donec exsiccentur: id vero biduo fiet, plus minus, sed caue ne imbribus aspergātur. Brachiale cū exossas, id est, ossa eius separare, & cartilaginibus exuere in animo habes, prius cōsidera, quā difficilis sit tot ossium tādīuersa specie repositio. Quare si diffidis, satius est, minusq[ue] absurdum, si relicto ligamento, quo brachialis ossa cōtinentur, illa in superficie detegas, ut ex pluribus ossibus constare liquido constet: sed ple-

Ossa ne for-  
teant.

detentim hoc agito, ne hic ossium nexus, cuius colligationem reformidas, si nimis penetras, corrumpat. Eadem, vel paulo minor diligentia in tarso adhibenda est, dum hæc ossa sole, ventoque exsiccantur: quoniam temporis iactura maximi ab optimo quoque, facienda est. Poteris interim gladiolo, qui nouaculam secundo imitetur, aures, nares, palpebrasque excoriare, hyoidis os, laryngem sternon, atque alias cartilagineas a membranis liberare, & ligamentis: idque præsertim, ut sceleti factor inhibeatur. Caueto etiã, ne dentes omnes decidant: immo vero da operam, ne vel unus quidem decidat: quod si exciderint, da operã ut in suum quisque alueolum redeat, in promptuque habeas gluten ex recenti caseo, ex oui albumine, gypsoque recenti confectum, itaque struito, ne amplius labant: idem efficere poteris si appendix aliqua e suis ossibus diuulsa concidisset. Non desunt, qui in ossibus cadaueris excoquendis pro sceleti fabrica calcem, cineremque adhibeant, ut candidiora fiant, quod mihi non valde probatur. Vidi enim ossa nigrescere potius, quam albesieri huiusmodi rebus. Neque illud aspernandum est, ossa dum coquuntur, nisi aqua continenter submersa detineantur, fumo inficere solere. Dum hæc aguntur, ferrum corporis mole altius palmi dimidio (ut nunc Roma loquuntur) fieri curabis, quodque deorsum tres in partes diuisum sit, & eas perforatas, ascendatque crassiusculum

Gluten.

Ossa ex calce,  
aut cinere de  
nudata nigrescunt.

Instrumentũ  
in ossibus  
preparandis  
commodum.



Fusculum ad ossis sacri inferiora: quod reliquum  
 est ferri tenuius esse debet, quo flecti possit, ut ti-  
 bi ex usu erit: huius ferri basis erit tabella tetra-  
 gona, in cuius centro alia sit eminentior figura  
 orbiculari, colore atra: ita enim elegantior esse  
 videbitur sceleti situs, qui hisce tabulis clavis af-  
 fixus detinebitur. Cuius sceleti ossa ut elegantius  
 connectas, tria aenei sili genera adsint, quæ per te-  
 nuius, & crassius inter se differant: quod aneum  
 solum coquendum est, ut flexibilius reddatur, ne-  
 que in connectendis ossibus tam facile disrumpatur.  
 Forcipes quoque binæ parandæ sunt, quarum  
 una sit teres, ut solum illud aneum foraminibus  
 immissum torqueas: alia vero incidat quod reli-  
 quum est. Acus item variæ ex optimo ferro parandæ  
 sunt, ligneo manubrio exceptæ, quæ & perfora-  
 re, & secare possint: hisce ossa, ut lubebit, perfora-  
 to. Præterea animadvertendum est, si digitos  
 rectos esse volueris, perforandos esse rectos, ut  
 a latere ad latus foramen penetret: quod si obli-  
 quus illorum sicut tibi magis arrideat, oblique  
 perforato, ita ut infra magis distet ab ossis capi-  
 te, quam supra. Item qua forma voles, digito-  
 rum situm immutabis. A pedibus igitur initio  
 sumpto quatuor sesamina apponito, illis crura su-  
 perpone, deinde femora: animadvertendum  
 tamen est, inter tibiā, femurque posterius per-  
 forandum esse inter duo capita inferiora femo-  
 ris: nec non eminentiore parte capitis tibiæ, ubi

Quibus ossa  
 connectendas

Ferrum in os  
sacrum impo-  
nendum.

Crurium in  
sceleto flexio  
vitanda.

aderat ligamentum. Item ibi baculum appones, ut hoc fulcro præter aneum filum solidior sit cōnexus. Deinde os sacrum, coccygem, & lata ossa connectito, cartilaginesq; apponito in genu circa acetabulum coxendicis inter ossa pubis, inter os sacrum, & coccygem. Antea vero quam femur suo loces loco, imponendū ferrū est in os sacrum, suaque ossa coniuncta, quod si facilius efficere volueris, ossis sacri tertiu, quartūve posterius perforato. sit vero foramen adeo patens, ut ferro excipiendo sat esse possit, quod postmodum foramen illud ingreditur, per quod spinalis medulla descendebat. Sistendum est autem, fulciendumque, ne infra crurium altitudinem flectatur. nam crura flecterentur, quod turpe esset visu. Postquam stat ferrum, ut decet, crura, & pedes sige vario situ, ne suo loco labantur, atque exeant: fies autem voti compos, si sub calce, & pollicem perforaueris, & paruo clauo, aneoque filo has partes lignæ, quam supra diximus, tabella affixeris. His optime dispositis patellam genu apponito: deinde quinque lumborum vertebrae cum suis cartilaginibus sacro ossi appone. Supra has tres extremas thoracis vertebrae, quibus suas costas necesse, hoc est, earum corpori: quamquam decima ad transversum processum accedit: deinde reliquas novem transversas vertebrarum processibus prius perforatis, ut costæ facilius aptentur, illisque elegantius admoveantur,

moveantur, qua prius anteriore in parte perforato, ubi cum cartilaginibus uniuntur. Posterior autem non perforato antea, quam metiaris, quâ singula perforanda sint: sed prius vertebrae harum costarum in ferro indito, ut dictis vertebrae superpositae sint, & ex his a prima initio sumpto, aeneum, quod diximus filum bis terve circa eas, transversosque processus vertito. Cave tamen hunc nexum arctes priusquam sternon suo loco imposueris. Illud equidem nolim obliuiscaris, sceleti elegantiam, & venustatem in thoracis concinna figura, sitam esse, quam spasticam esse oportet. Id ut fiat facilius, inter sternon, ac vertebrarum corpus lignum impone, quo retrocedere, atque introrsum inclinare prohibeatur. Praeterea animadvertendum est, nonnumquam cartilagines nimis exsiccatae esse: propterea minus cedere, quam sit opus artificis sceleton componenti: quod si fiat, illas in tepidam aquam paulisper finito, tunc enim cedent. Deinde collum, caputque impone: sint vero ossa capitis, quod transversim sectum fuerat, ut quae in ipso continebantur auferri possent, vinculis excepta, ne corruant in vertice, in sutura recta, & lambda-lem versus: in sincipite autem foramen adsit, e quo exire ferrum possit: thorace, ut oportet, exsiccato, adde ingula, scapulas, brachia, manusque: ita erit Dei ope sceletos absolutus: sed stude, ut ingulis, scapula, maxillaque inferiori

Venustas sceleti in quo consistat.

Ossa capitis in sceleto vinculis excipienda sunt.



suae cartilagines apponantur: item styloidi inter  
 ipsum, & brachiale. Pulchrior etiam videbitur  
 sceletos si ex brachiis alter extendatur, flectatur  
 alter: quod si mauis, scipionem manu gerat: ut  
 lubet efficit, quem tabula clauis affigito. Sceleti  
 collo hac suspendito, ut per thoracem pendeant,  
 torquis instar, larynga, os hyoides, aures, nares,  
 ungues, quas optime per polies, palpebras, ossa se-  
 samina dicta, ossa, quae sunt in naribus spongiosa,  
 quae dum internam nasi partem emundas, facile  
 decident. Tu vero caue, ne illa imprudens tam-  
 quam nullius pretij proicias, ut Vesalio conti-  
 gisse opinor, qui illa propterea non cognouit.  
 Illud praeterea memoria teneat, dum caluariam  
 curas, qua aures sunt sitae, id tanta industria, &  
 diligentia efficit, ut ne oscula auditus organo  
 deseruiencia ladas, quae pulcherrima visu sunt,  
 & scitu digna. Ex his duo prima nullo negotio  
 eximes, tertium vero non sine negotio: propterea  
 caluaria saepius manu concutienda est, ut eximi  
 facilius possint: haec una cum aliis, quae paulo an-  
 te memorauimus, sceleti collo suspendes, ne quid  
 desit eorum, quae scire opera pretium est. Quod  
 si puelli sceleton parare cupias, caue diutius ossa  
 coquas: nam ossum appendices facillime rela-  
 xantur. Idem de simiis iuuenibus admonitum  
 puta. Si sceleton non modo non foetere cupis,  
 sed bene olere, priusquam caluariam sericis ligu-  
 lis vincias, cura, ut illa vincula muscum, & am-  
 bram

Vesalij insci-  
 tia.

Sceleti puelli  
 ossa non diu  
 coquenda  
 sunt.

Sceletos ut  
 bene oleat.

bram optime redoleant, aut re huiusmodi bene-  
 plente, ut magis libuerit. Filo aneo crassiori hu- Modus in co-  
 nestendis of-  
 sibus sceleti.  
 merum scapula admouebis, cubitū humero, ra-  
 dio extremam manum, femur acetabulo, tibiam  
 femori, tibia extremum pedem. Costas autem,  
 vertebraeque mediocri aneo filo, ut digitos, &  
 postbrachiale tenuiori. Deo vero Optimo Ma-  
 ximo sit honor, & gloria.

REALDI COLUMBI  
 CREMONENSIS  
 DE RE ANATOMICA,  
 Liber V.

DE MUSCULIS.

Quid sit Musculus, ac de Muscu-  
 lorum differentiis.

CAPVT I.

**M**USCULVS instrumentum est Musculi de-  
 script.  
 voluntarij motus, absque quo  
 nihil in nobis est, quod volunta-  
 rie moueri possit: constructus au- Quae muscu-  
 lum consti-  
 tuant & quae  
 usum ei quod  
 quae horum  
 praestet.  
 tem est ex fibrosa carne, nervis,  
 ligamentis, venis, arterijsque, & membra-  
 na: carne quidem, ut qua corpus ipsius constet,  
 & moles: nervo, ut is virtutem motuā defer-

ret, quæ a cerebro emanat: ligamento, ut si validus, neque in mouendo imbecillus: vena ut ali possit: arteria, ne vitali calore destitueretur: membrana vero munus hoc est, ut omnia hæc cōplectens detineat, musculumque a musculo distinguat. Musculum sunt qui a mure dictum putent, quod musculi quidem muris figuram præseferant: nam illis caput tenue existit, venter latus, cauda oblonga, angustaque non desunt, qui musculus lacertum vocent: quoniam lacerto ipsi similis figura videatur. Alij pisci simile magis musculus autumant: propterea pisciculum vocant. Sed profecto has formas in omnibus musculis non comperies: nam aliqui lati admodum sunt, alij trilateri, alij quadrilateri, alij orbiculares: sunt aliqui crassi, alij vero tenues, atque exiles: breues alij, alij prolixi: aliis unum dumtaxat fibrarum genus contingit, aliis duo, tria aliis, & nonnulli musculi omnibus fibrarum generibus mixtis præditi sunt quibus videtur intertexti. Musculi in tendines, hoc est, chordas desinunt, sed non omnes: multos namque tendine carētes videbis: contra quibusdam musculis tendo adest in exortu, quibusdam in medio: quāvis Galenus de quarto duntaxat, maxillam inferiorem aperiente, mentionem faciat, ubi illius tendinis occasione capta miris laudibus naturam ipsam effert. Sed meminisse poterat bonus Galenus quartum quoque musculi, a quo hyoides deorsum trahitur, qui tendinem in media sui parte a natura benigne suscipit,

Musculus unde dicatur secundum aliquorum opinionem.



nascipit, neque illi, quem tantopere Galenus ex-  
 ollit, ob hoc quicquā inuidet. Sed priusquā mu-  
 sculorū tēdinibus discedamus: nonnulli sunt, quib.  
 unicus inest tendo, aliquib. duo, tresve, aut qua-  
 tuor, quibusdam complures, ut longissimus dorsi  
 musculus, necnon thoracis quintus: quidam lon-  
 gum, teretemque tendinem obtinent, alij teretē  
 quidem, sed breuem: aliis tendo adest tum oblon-  
 gus, tum latus, aliis latus & decurtatus: ita ut  
 facile perspicias figuram musculorum, tendinū-  
 que ipsorum non unicam esse, sed multiplicem &  
 variam, quemadmodum in uniuscuiusque mu-  
 sculi peculiari historia facilius quoque, & aperti-  
 us disces. Ortum ducunt ab ossibus musculi, atq;  
 in ossa desinunt, sed non omnes: nam aliquos cer-  
 nere est non ab ossibus, sed a cartilaginibus exo-  
 rientes, alij a membranis exoriuntur, & in mem-  
 branas quoque finem habent: alij post exortum  
 descendunt, ascendunt alij: quorundam situs  
 transversus est, quorundam vero obliquus. At  
 exortus musculorum neq; in omnibus eodē se ha-  
 bet pacto: nam aliquorum oblongus, aliquorū au-  
 tem brevis: his crassus, illis pertenuis: nonnullis  
 carneus, aliis tendineus, licet non desint, quibus  
 ex carne tendini mixta videatur origo. Ex mu-  
 sculorum tendinibus nonnulli perforati sunt, alij  
 minime, alij unico foramine, alij pluribus donā-  
 tur. Sed locus admonet, ut antequā ab hoc sermo-  
 ne discedo, doceam quid tendinem, seu tendonem

Musculorum  
 ortus, & ter-  
 minatio.

Quid sit tendo.

Differentia inter tendinē, & neruū.

Musculos esse instrumentū motus voluntarij. Musculos a neruis suscipere motum.

Nervos in musculorum substantiam disseminari.

Vesalii error de nervorum in musculos distributione

dicunt, chordamve, ut Arabes Anatomici. Tendo igitur in musculo pars alba est, dura densa, & pellucida, quæ cū primum detecta est, visu pulcherrima est, ac spectatores in sui admirationem trahit. A neruo autē distat tendo, et si magno quoque sensu præditum esse tendinem experientia facile pateat, cum ipso laeso sæua accidentia consequantur. Si tendinem seces, corpus solidum at treētabis, neruo vero caso contrā se res habet: nam licet albicet neruus, tamen neque adeo durus est, quemadmodū tendo, & rotundior est, neq; adeo perlucet: quod si incidatur corpus multis funiculis intertextum, villosq; circumdatum videre videberis. Adnotandum insuper est musculos organa esse motus voluntarij, qui nervorum ope illis demādatur. Hac etenim vis nervis a cerebro demandatur, et si Aristoteli secus videatur esse. Idcirco musculo cuique quāvis minimo nervus obtigit: immo & nervi quandoque. Cum ad musculum nervum ferri dico, non intelligo prope musculos nervos ferri, aut per illorū medium rectā praterire: sed per musculorū substantiam aio nervos disseminari: quamvis Vesalius parum in hoc Anatomicus sensui, rationiq; aduersetur, inquiens multos cōptures carere neruo, & inter reliquos quadratū musculū prope brachiale, qui radium in primum ducit. Ego vero huic quoque musculo inesse neruum asseniero adeo perspicuum, ut quivis alter: neque difficilis est inuen-

u: idem de eo musculo dictum puta, qui latum  
endinem efficit, deq; aliis quos Vesalius excipit:  
quod dū efficit, naturā irridere maluit, quā suā  
in hoc non obscuram negligentiam patefacere.

## De faciei musculis. CAP. II.

**F**ACIEM cum dicimus, eam corporis par-  
tem intelligimus, qua capillos, mentumque  
interiacet, moueturq; voluntario motu, maxil-  
la inferiore immota: neq; enim superiorem ma-  
xillam moueri nisi crocodilinam, teste Aristo-  
tele inuenies: licet ego psittaci utramque maxil-  
lam motu præditam esse primus obseruauerim:  
quin facies ipsa hominis mouetur quidem ad in-  
ferioris maxille motum, sed non primario, ve-  
rum secundario motu.

Quæ pars fa-  
cies appelle-  
tur.

Primus an-  
maduertit su-  
periorē psitta-  
ci maxillam  
moueri.

## De musculis frontis. CAP. III.

**M**VSCVLI igitur (ut ad rem redeamus)  
qui huic deseruiūt parti, complures sunt:  
primi duo sunt, atque hi in fronte siti: exortus  
horū in superiore parte exstitit. in inferiore ve-  
ro parte terminantur in communi sutura, qua  
dirimit ossa capitis ab ossibus maxilla superioris:  
quamuis nerui huic parti subiiciantur. Horum  
musculorum fibra rectæ nequiquam sunt, quem-  
admodum Vesalius asserit, sed obliquæ a summo  
scilicet naso tempora versus: eorumque motus  
est, ut supercilia attollantur, quamuis neque  
Galenus ille, de re medica tantopere meritis, ne-  
que Vesalius nostris temporibus magni vir na-

Musculi fron-  
tis.

Vesalij error.

Vesalij com-  
mendatio, e-  
iusdem insci-  
tia.



minis in dissectione corporum, neque alius ex his qui ante me scripsere agnouerint. Quod si maiorem diligentiam adhibuissent, inuenire facile poterant. Hi duo muscoli & uniuersam frontem & temporalium musculorum tantam partem occupant, quantum ipsi oblique ascendunt, præterquam media fronte, ubi nos cutim contrahimus, corrugamusque quoties vehementer commouemur, aut admiramur: adeo ut in multis sese supercilia mutuo contingant. Quæ cutis frontis contractio, si unus hic esset dumtaxat musculus, fieri nullo modo posset. Hæc res, ut viros alios omittam minus notos, in fronte amplissimi Cardinalis Ardingelij, quem honoris causa nomino, perspicue videri poterat: cui cum sinister musculus ex his conuulsus esset ob vulnus, dimidiam frontem mouebat: reliqua motus expers relictæ erant. Sed mitto hoc, sensum ipsum situ quoque consules, hoc hand dubie nullo negotio comperies: nam si uniuersam frontis cutem detraxeris, in media fronte nullum videbis musculus, nisi in summo naso, ubi dexter musculus cum sinistro ita coniungitur, ut unus hoc loco musculus esse videatur, & ubi carnosiores, quam usquam inueniuntur: & quo magis ascendunt hi muscoli, eo tenuiores euadunt, superciliaque sursum trahuntur non ab his dumtaxat, sed etiam duorum musculorum præsidio, quos deinceps describemus, hæctenus (ut opinor) anatomicis ignotos.

Duos esse  
frons musculi  
los & nō tan-  
tum vnum.  
Cardinalis  
Ardingelij,  
dimidiam  
frontem mo-  
uit.

## De duobus Musculis Nasi.

## CAPVT IIII.

**P**OST hos bini occurrunt nasum dilatantes, Nasi musculi inuenti.  
 Adhuc a nemine cogniti: nā et si Galenus, atque de duobus musculis nasum dilatantibus meminert, eos tamen cum labij superioris musculis confundere. Præter hos Vesalius duos descripsit Vesalij error.  
 nasum claudentes, quos interiore in parte esse vult, imaginationeq; dūtaxat intuitusest: quo. n. nactō oculis cernas, quod nusquā est? Latas itaq; rares, reddētes musculi illi duo a supradicta oriuntur sutura, estq; exortus eorū acutus carnosusque, cū musculorū frōtis sine permixtus, deorsūq; eidentes latiores redduntur, & supra nasi ossa deferuntur, inq; eius pinnis terminum habent, triangulusq; pene efficitur, cuius duo sint latera oblonga, breue tertiu: hi pinnas sursum trahūt, fibraeq; rectas habent, itaque dilatant: illi vero, quos alij anatomici descripsere, portio sunt eorū musculorum, qui in superiore labro positi sunt, ut mox dicam. Clauditur nasus a musculis dicto labio opem ferentibus, non autem a propriis. Nam quoties aliquid nobis per nares attrahendū est, superius labium constringere cogimur.

Nasi musculorum exortus, progressus, forma, & terminatio.

Quibus musculis nasus claudatur.

De musculis latis in collo positis.

## CAPVT V.

**D**Vopræterea alij sequuntur pene quadrati musculi in collo siti, quos Galen. lib. de Musculi latis in collo duo.  
 Vsu part. deque Anatom. Sect. se inuenisse exul-

tat: qui labiis ancillantur, ea deorsum oblique trahentes. Horum substantia membrana carnosissima est; a iugulorum regione, posterioris collis parte initium sumunt, eorumque libra oblique ascendunt, atque eo tandem pertingunt, ubi cum superiore labro inferius iungitur. Quare cum hi latissimi musculi faciei deseruiant, et si in collo collocentur, tamen inter faciei musculos connumerandi sunt, qui cum mento plurimum coherent: atque in hoc oris apertioni videntur auxilium ferre.

De quatuor musculis labiorum.

CAPVT VI.

Quatuorlabiorum musculi.

**Q**VI labris famulatur musculi, quatuor numero sunt, duo in superiore, totidem in inferiore. Superioribus quadruplex origo est: nam ab extrema futura ossis iugalis exoriuntur & ab ea, quae primū os maxillae superioris separat a tertio: reliqui duo ab osse male proficiuntur, omnesque oblique versus labrum incedunt, quos inter unus est, qui nariū pinna adhærescit, & propterea hunc musculū illū esse dicebant, qui nasum dilataret. Ego vero praedictorum labri musculorum portionem voco. Tamēne pertinax esse videar, quod semper abhorruī, si cui separare hūc libeat, & peculiaris musculi loco esse ducere, id sibi per me liceat: quo cōcesso, quatuor erūt nasi musculi, qui omnes ipsum dilatant. Reliqui duo labrum inferius constituentes, ab ea menti parte oriuntur,

Musculus ab aliquibus imperite nasi appellatus.

Quatuor nasi musculi.



tur, ubi quaedam est in osse asperitas conspicua. Horum autem quatuor musculorum fibra varia sunt, atque inter se commiscuntur, & implicantur: idcirco varios motus edunt, ut recte Galenus adnotauit, & plerumque cum cute ipsa confunduntur: tamen si tibi musculosum corpus neque pingue, secundum obtigerit, atque diligenter excories; & eleganter, & perspicue satis conspici poterunt. Accedunt dictis musculis alij duo buccarum, quos quidam oblitus est describere in magno quodam volumine, de humani corporis dissectione: inter utramque maxillam siti sunt, a gingivisq. nascuntur, & in gingivas desinunt. Quare unde lubuerit initium sumas licet, vel supra, vel infra, nihil enim interest: satis tennes, & circuli in modum sunt, fibris variis intersecti, variisq. ob id muneribus funguntur. Sunt enim manui instar, quae cibum nunc huc, nunc illuc propellant: neque sunt inter loquendum inutiles, cum exsufflare, vel inflare buccas volumus, hisq. musculis tibicini, tubaeque canenti non mediocris est utilitas.

De musculis supercilium trahentibus.

## CAPVT VII.

**B**INI adhuc in lucem reuocandi sunt musculi, ab aliis negligētia praeteriti, quos in capitulis posteriore parte licet animaduertere, qui a lambdoide sutura supra mammillares processus oriuntur: triangulares sunt, & in carnosam membranam desinunt, quae frontis etiam musculi-

Ex varietate  
fibrarum va-  
riantur mo-  
tus.

Musculi buc-  
carum duo.

Musculorum  
buccarum ex  
ortus, & finis  
confunditur.

Musculorum  
buccarum  
multiplex  
vius.

Musculi su-  
percilij tra-  
hentes a nul-  
lo adhuc  
cogniti.

Musculorum  
supercilium  
trahentium  
utilitas.

los excipit eorumque utilitas non contemnenda hac est, ut frontem, cutemque capitis posteriora versus abducant, ut ego millies non sine voluptate cōtemplatus sum in capite praecellentis viri praeceptoris mei Ioannis Antonij Plati, quem Lonigum nunc vocāt. is enim cutem capitis uniuersam valide mouet. Sed quid ego in aliis exemplar persequar, cum domestica, vel interna potius exempla non desint? Ego quoque is sum, in quo cutem capitis manifeste moueri nullo negotio cernere posses, quippe qui caluus admodū sim, absque ulla cutis ariditate, sed, mollitie adeo laxa ut nuper nati infantis cutem praeferat.

De Palpebrarum Musculis. CAP. VIII.

NON dubito, quin nostra de Musculis palpebrarū historia grata omnibus futura sit, cū illa, quae hactenus ab aliis tractata sunt, parū sint cū re ipsa cōsentanea. Ego vero dedi operā, quantū in me fuit, ut quā verissime describeretur. Musculi igitur palpebrarū sex numero sunt, tres nēpe utrinque, quorū duo extra orbitā oculorū, reliqui intro iuxta musculos oculorū sint siti, & propterea omnes, qui ante me scripsere anatomici decepti sunt, arbitrātes hos non palpebrae sed oculis inservire. Primi igitur orbiculares, fibras habētes circulares quoque nascūtur in magno cantho, in sutura cōmuni capiti, & maxilla superiori, acuto principio, & sursum versus frontē dilatātur, quo loco cum musculis frontis cōmiscentur

Musculi palpebrarū qui numero sunt sex.

Anatomicorum error in palpebrarum musculis.

miscentur. Postea versus aurem tendentes, quod  
 magis prope minimum canthū accedunt, eo ma-  
 gis amplificantur, & deorsum circa orbitam re-  
 flectuntur, ut tandem acuto sine iuxta initium ter-  
 minentur: facti sunt, ut palpebras claudant, &  
 valide astringant: utque oculos ab externis iniu-  
 riis tueantur. Hos Vesalius diuisit in quatuor: sed  
 ubi ipse carnem detraxit, carnosiores sunt, quam  
 in reliquo deductum. Secundi erunt duo muscoli  
 recti, lati, carnosi in superiore regione oculorum,  
 in interna orbita exorti ex neruo visorio, ut reli-  
 qui oculorum muscoli. Hi muscoli latiusculo sine in  
 supremā palpebrā terminantur: facti sunt, ut tra-  
 hant palpebrā sursum, & oculum aperiāt. Tertiū  
 muscoli sunt tereti figura, & tenues, ex eodem lo-  
 co nati, qui oblique versus magnū canthū in pal-  
 pebra tereti fere tendine finiuntur: in nonnullis quā-  
 doque portio huius tendinis in corneam inseritur.  
 In his adiuuare videtur motū oculi sursum: attā-  
 men geniti sunt ob hunc usum precipue, ut pal-  
 pebram trahant, & oculos aperiāt, qui usus & si-  
 tus cum in brutis quoque idem sit, non possum non  
 mirari, quo pacto Galenus, Vesalius, ceterique A-  
 natomici hos quatuor musculos palpebræ deser-  
 uientes, inter musculos oculorum numerarint,  
 decepti forte, quod in orbita eorum siti sunt.

Musculi o-  
 culos clau-  
 dentes.  
 Vesalij ex-  
 ter.

Musculi o-  
 culos aperi-  
 entes.

Musculi pal-  
 pebram tra-  
 hentes.  
 Gal. Ves. cæ-  
 terorumque  
 Anatomico-  
 rum easus.

De oculorum musculis. CAP. IX.

EGO hic diligentem lectorem postulo: nam  
 de parte nostri corporis nobilissimā agendum

Oculorum  
 Musculi.



Oculorum  
motus arbi-  
trarij.

est, cuius cognitio & necessaria nobis est, & per-  
iucunda. Oculi igitur arbitrario motu cientur  
nunc sursum, nunc deorsum, nunc dextrorsum,  
nunc sinistrorsum, nunc in orbem. Galenus Vesa-  
liusque, & Anatomici alij, qui omnes beluinarum  
oculum descripsere, oculorum musculos quatuor de-  
cim descripsere, ut septem in unoquoque oculo col-

Qui pro-  
prie oculo-  
rum musculi  
connume-  
randi.

locarent. Ego vero decem musculos in oculis po-  
no, quinque scilicet in utroque: quatuor enim illi  
eodem in loco positi musculi, qui aperienda pal-  
pebra conducunt, nequaquam sunt inter oculi  
musculos adnumerandi. Quatuor habes deinde  
oblongos musculos, qui versus radicem visoris  
nerui emergunt, rectasque habent fibras, & in ner-  
uosas tenuitates desinunt. & membrana cornea  
in orbem adnectuntur, aliam membranam con-

Quo pacto  
oculorum  
musculi se  
habeant ad  
motus.

stituentes, quæ ad iridem non pertingit. Positi  
sunt instar quatuor angulorum, quorum duo su-  
pra sunt, alij infra: hi vel sursum, vel deorsum,  
vel a dextris, vel a sinistris trahunt, cum scilicet  
quilibet ex his seorsum operatur, vel duo simul: at  
si omnes una subsequenti motu operentur, motus  
efficitur circularis; quod novum dictum vobis nullo  
pacto videri debet, cum idem fiat a quatuor mu-  
sculis brachiali servientibus. Præterea facti etiam  
sunt, ut sistant oculum, quando scilicet uno & eo-  
dem tempore operantur. Quintus oculi muscu-

Quintus  
musculus  
oculi nunc  
primum in-  
ventus.

lus, quem ego primus inveni, atque rei natura de-  
scribam, ita habet. Situs est sub aliis quatuor ocu-  
li mu-

li musculis, & inter hunc, atq; illos pinguedo in-  
 tercedit: situ transuerso locatur, & oculi medie-  
 tatem complectitur: oritur a cornea membrana,  
 atq; in eandem desinit, adeo ut qui finis eius sit,  
 qui ve exortus, non ita facile inuenias. 1. ne ego  
 musculum admirabilem iudico: nam ab oculo in-  
 cipit, atque in eundem desinit, propterea difficile  
 dictu est, quis si huius quinti musculi proprius  
 motus. Si a nervis musculorum initia proficisce-  
 rentur, dicere auderē eius originem vere in me-  
 dio esse: ibi enim ramus a secundo neruorum ce-  
 rebri coniugio ingreditur insignis, crassiusque sa-  
 tis, si cum musculo conferatur, quem neruum fa-  
 teor me quandoque suspicatum fuisse, huius mu-  
 sculi tendinem esse. Hunc neruum si attrahas, o-  
 culus sursum vertitur, & circumagitur, quam-  
 uis musculus subsit: forte hic fuit usus huius mu-  
 sculi admirabilis, ut eius auxilio cælum, diuinag;  
 maiestatis fabricam intueremur, ad quod nati  
 sumus: ad quod peragendum non paruo est hic  
 nerui adiumento. Hic idem musculus, quem de-  
 scribimus, a latere (sed siue latus, siue finem, siue  
 initium dicas, nihil nūc refert) tendine latiuscu-  
 lo peditus est, quo adhærescit corneæ. Equidem  
 magnū aliquē naturæ arcanorum perscrutatorē  
 mihi nunc dari exoptarē, a quo huiusce pulcherri-  
 mi musculi utilitatē edocerer: mihi nunc sat erit  
 musculum inuenisse, & descripsisse: de humanis  
 nunc loquor. Vesalium enim & Galenum oculi

Quia mta  
 suli motus  
 coniectura-  
 lis cognitio.

Gal. & Vesal.

beluini, nō  
humani o-  
culi anatō-  
mē asequu-  
tos esse.

musculos beluinos, non humanos descripsisse, sci-  
re poterit, quicumque eorum historias cum re-  
ipsa conferre non grauabitur. Inter hos, & alios  
quatuor pinguedinem licet cernere, quemadmo-  
dum inter hunc, & visorium neruum: sed illum  
musculum in hominis oculo nullo modo reperias,  
quem Galenus, Vesalius, atq; alij descripsere, qui  
ab his nunc primo, nunc septimo loco connume-  
ratur, & in tres, pluresq; musculos diuidi potest:  
quem tamen, ut ipsi eleganter descripsere, in bo-  
ue, equo, veruece, & aliis quadrupedibus facile  
inuenias. Hic musculus in brutis inuentus iuxta  
ipsum oculum sistit, quo munere in homine illi qua-  
tuor primi tunc funguntur, cum omnes eodem  
tempore agere desistunt quietique permanent.

#### De musculis aurium. CAP. X.

Aurium mu-  
sculi.

**E**GO musculos aures mouentes non describo:  
nam raro, imo quam rarissime inueniuntur:  
in quodam tamen ego musculum offendi, qui a  
buccis nascitur, & in auris pinnam desinit, eam-  
que mouet voluntarie versus anteriora: quan-  
doque etiam alium vidi musculum in posteriore  
parte a mammillari processu proficiscentem: sea-  
hi duo ultimi, in brutis semper conspiciuntur, in  
homine perraro.

Aurium mu-  
sculi in ho-  
mine raro  
dari.

#### De musculis maxillæ inferioris. CAP. XI.

Maxillæ in-  
ferioris mu-  
sculi.

**I**NFERIOR maxilla hominis ob faciei ro-  
unditatem breuissima facta est, cui tres vo-  
luntarij



luntarij motus contingere: aperitur enim, clauditur, & in circulum agitur. Musculi ipsius quatuor utrimque sunt. Prior ex his temporalis musculus nuncupatur, validus, robustus, nobilisque admodum, propterea quod cerebro proximus est, & varios habet nervos insertos: atq; idcirco divinus Hippocrates in libro de Vulneribus Cap. dextro tempore, inquit, vulnerato, sinistrum conveniunt: quare natura non iniuria tanta usa est in hoc musculo diligentia. Oritur igitur a primo maxilla superioris osse a cuneali, a fronte, a sincipite, & ab osse temporum lapidoide dicto, parteq; capitis lateralem occupat usq; ad posteriorem auris partem, & superiorē etiam, per tres digitum apices. Initium eius latum est, & semicirculare: & licet initium, ut dixi, latum sit, tamē in acutum desinit, in validumque tendinem, qui in acutum illum maxilla inferioris processum immittitur, quem coronon appellant, qui tendo altiuscule satis, & intrinsecus incipit. Alius etiam est membranosus tendo, qui musculum parte exteriorē levandum reddit, deserturque sub osse ingali: huius officium unū dumtaxat est, claudere scilicet maxillam inferiorem: neq; triplex est, ut somniauit quidam, qui Galenum (pace illius dixerim) hisce in locis parū intellexit. Fibrae eius eiusmodi sunt a circumferentia ad centrum progredientes, quae chirurgis accurate sunt animadvertendae, dum vulnera dilatant, & abscessus hanc partem infe-

Tres motus voluntarij inferioris maxillae.

Temporalis musculi.

Coronon Processus.

Cautio in temporum chirurgiā.

stantes secant, ne fibras transversim incidant: nam si ita fieret, usus ipsarum cessaret, quo amoto vita deficeret: & quoniam claudendi motus, resque duras effringendi robore eget, natura sagax prater temporalem, alium effinxit musculum in ore latitantem, (ita enim Galenus appellat, & recte) qui validus est satis, & ab ea cavitate exoritur, quae posita est in alis cunealis ossis, & terminum habet in interiore maxilla inferioris parte, ubi asperitas est: eius fibrae rectae sunt, tendinemque satis validum habet, qui eodem officio fungitur, quo temporalis, & crassus, brevisque existit. Tertius musculus is est, quem masseterem, siue mansorium nominant, qui maxillam inferiorem in circulum agit: nascitur a iugali, & a primo maxilla superioris osse, non autem a quarta, & tertia vertebra colli, quemadmodum voluit Galenus: originem habet tendinosam, carnosamque terminum vero in inferiore maxilla pene triangularem: adheret in super acuto ipsius processui, ubi cum temporali coniunctus videtur esse.

Musculus in  
ore latitans,

Musculus  
masseteres  
& mansorius  
dictus.

Galenus et  
ior.

Musculus  
quartus os  
aperiens.

Quamobrem excusari non potest magnus Galenus, qui in nonnullis locis scriptum reliquit temporalem musculum tendinem habere in medio sui utrimque partem carneam: fibras habet diuersas, atque ob id maxillam mouet ante, retro, in latera, & in orbem, crassusque est satis. Quartus musculus os, & maxillam aperit, & est admodum elegans, cum duos carnosos veteres sortitus sit, initium minimum & finem,

& finem, nam media eius pars tendinosa est. Ortum ducit carnosum a styloide processu, deferitur sub maxilla, & sub aure: rotunda, oblonga que simul figura particeps existit, neque est admodum crassus: carnea substantia in medium mentum descendit, ubi asperitas quaedam interior cernitur. Hunc natura adeo crassum non constituit, ut illos quibus claudendi partes delegavit. Maxilla. n. cum suapte natura pene grauis sit, duob. illis musculis, quos superius utrinque sitos dixi, relaxatis deorsum inclinat, propterea exiguo musculo contenta fuit: at mediā partem tendinis instar effingit, ut ne maius spatium occuparet. Locus. n. angustus admodum erat, in quo multa erant organa collocanda.

De musculis ossis Hyodis, cuius ossis & eius musculorum descriptio in nonnullis, qui scripserunt, desideratur.

## CAPVT. XII.

**O**S hyoides ab octo musculis mouetur, a quatuor scilicet utrinque, qui primus occurrit, carnosus est, tenuis, rectus, qui ab interna summitate ossis, quod sternō dicitur, exoritur. Iter eius est super asperā arteriā, & laryngē, & in inferiore parte dicti ossis absque tendine terminatur, fibras rectas habet, & deorsum recta trahit. Secundus in ordine a mēto exit, atque in hyoidis partē superiorem finit, expers est tendinis, sed carnosus totis fibris rectis recta sursum ducit, motumque oppositum facit

Musculi ossis hyoidis.

Primus hyoidis musculus.

Secundus musculus hyoidis.



Tertiushyoidis musculus.

Quartus hyoidis musculus.

illi, quem proxime memoravi. Tertius musculus subtilis est, & parvus, qui a styloide processu oritur, & in laterales partes hyoidis desinit: situ est obliquo, partes huic demandatae sunt sursum at-  
 trabendi. Quartus vero musculus parte superiore scapulae ortum ducit, & oblique sub septimo capitis musculo sursum ascendit: subtilis quidem est, & longus, tamen neque prolixior est, neque gracilior musculis aliis, ut Leonardo Fuchsio visum est. Terminatur in partibus hyoidis lateralibus: tendo illi in medio obtigit, quemadmodum quarto inferioris maxillae musculo: licet Gale. in XI. de Usu Part. asserat illum tendinem in medio habuisse, praeterea neminem: atque hanc ob rem naturam adeo admirabatur & extollebat, quae in eo musculo rarum quiddam effecerit, quod aliis denegarit. Hoc equidem non negauerim, huius, quae nunc describimus, musculi tendinem adeo longum non esse. Usus eius est, ut hyoidem deorsum oblique trahat motu opposito illi, quae tertius edebat musculus. Galen. error. Galenus libro de musculis, hunc voluit scapulam attollere, cum parum animaduertisset fieri non posse, ut tam tenuis musculus ab hyoide exortus, ut ipse voluit, quod os mobile est, ingens illud scapulae pondus attraheret, atque attolleret.

De linguae musculis. CAP. XIII.

Musculi linguae usus. Linguae usus.

LINGUA organum est, quod multas nobis praebeat utilitates: nam & edendo, & bibendo, & loquendo nobis praesto est lingua gustandisque

disque saporibus opportuna. Huius situm nemi-  
nem arbitror ignorare: eius figura oblonga est,  
lata magis, quam profunda, in radice, quam in fi-  
ne crassior, quod a natura longe prospiciente id-  
circo factum est, quoniam velociter undiq; mo-  
uenda erat. Quocirca nouem musculis prædita  
fuit, præter substantiam ipsius peculiarem, quæ  
cum mollis sit, rara, spongia instar, confusaque  
carne, inter musculos adnumeranda non vide-  
tur, etsi alia ratione, quod voluntate iubente mo-  
ueatur, non videatur a musculorum numero se-  
iungenda. Quod si fiat, duo musculi nouem præ-  
dictis addendi sunt: nam videntur esse duo mu-  
sculi, cum lingua candidam lineam in medio ha-  
beat, quæ dextram partem a sinistra distinguit,  
sub qua ligamentum est, quod infantibus sæpe in-  
cidendum est, eo quod locutione impedimento sit.  
Igitur duo prædicti musculi a basi ossis hyoidis e-  
mergunt, atque in summam linguam desinunt.  
Omne fibrarum genus habent adeo intertextum  
ut aliud ab alio seiungi nequeat, veluti in aliis  
musculis seiungitur. Ambit linguam tunica quæ-  
dam, in quam quartum par nervorum cerebri in-  
feritur, quos natura gustui præcipue destinavit,  
eorumque pars ad palati tunicam tendit, ut suo  
loco dicemus: quæ tunica tum huic, tum æsopha-  
go, tum laryngi communis est. Tertium vero, &  
quartum lingue musculus ceteri anatomici non  
cognouere: tu vero, si diligenter secueris, horum

Musculi lin-  
guæ nouem  
velut aliqui  
volunt vn-  
decim.

Ligamentū  
linguæ in in-  
fantibus in-  
cidendum.

Duo muscu-  
li linguæ at-  
tributi.

Tunica lin-  
guam am-  
biens.

Vnde lin-  
gua habeat  
gust. sensū.

Tertius &  
quartus lin-  
guæ muscu-  
li alius igno-  
ri.

exortum medio in mento conspicaberis, ubi duæ  
 adfunt asperitates, quæ rectæ ad linguæ radicem  
 proficiscuntur: fibræ ipsorum rectæ sunt, ipsi mu-  
 sculi teretes: ad hos musculos spectat, linguam ex-  
 tra dentes, & labia exerere: neque enim natura  
 miraculo nullius ope musculi lingua exeritur, ut  
 nonnulli credidere. Quintus autem, & sextus  
 cum a styloide oriantur processu, gracilesque sint:  
 in linguæ radicem & ipsi desinunt: sed in ipsius  
 lateribus. Horum usum si quaris, hic est, ut cum  
 uterque operatur, linguam versus se ipsos ducant;  
 cum vero alter tantum mouet, sursum in latus  
 trahat. Septimus & octauus egrediuntur e pro-  
 cessibus ossis hyoidis, & in linguæ lateribus in-  
 feruntur, eam deorsum trahentes. At nonus, de-  
 cimusque nascuntur a maxilla, & in latera desi-  
 nunt: munus horum est, nunc huc, nunc illuc im-  
 pellere, cum mandimus aut deglutimus. Postre-  
 mum musculum carnis pinguedinis, glandulæq;  
 confusam miscellam rectius diceremus, quàm ve-  
 re musculum: positus est in radice linguæ: eius sua-  
 nis admodum est, ductusque ipsius est ab hyoide  
 osse. Nihilosecins, posteaquam ceteri, qui ante nos  
 de hac materia scripsere, inter musculos descri-  
 psere, nos quoque musculum appellemus, ne con-  
 fusioni locus relinquatur: quod esset, si eandem  
 partem, quam alij musculum vocant, nos mu-  
 sculum esse inficiaremur. Equidem, ingenuè  
 fateor, cum hac particula in humano corpore  
 perexi-

Quintus, &  
 sextus lin-  
 guæ muscu-  
 li.

Septimus &  
 octauus lin-  
 guæ muscu-  
 li.

Nonus ac-  
 decim<sup>o</sup> lin-  
 guæ muscu-  
 li.

Vndecimus  
 ac postrem<sup>o</sup>  
 linguæ mu-  
 sculus.



perexigua sit, & nullius fere pretij, huius ne meminisssem quidem, cum ad alia magis necessaria nostra festinet oratio, ut huic perutili historiae finem aliquando imponamus. Itaque præter musculos undecim, quos supra memoravi, & præter nervos, & ligamenta, & membranam, adhuc restant vena, arteria, duoque alij nervi, quos septima coniugatio gignit, qui huic parti motus gratia addicti sunt: cumque eorum situs in inferiore parte collocetur, summopere cauendum ne una cum ligamento, quoties excindendum est, hi quoque ab imperitis incidantur.

Linguam  
constituen-  
tia.

In ligamen-  
to linguæ  
abscinden-  
do quid ca-  
uendum.

# De musculis laryngis. CAP. XIII.

**L**ARYNX caput est asperæ arteriæ, estque instrumentum, in quo primo vox effingitur, quod rerum omnium opifex Deus admirabili arte composuit. Hæc in faucibus sub lingua, & hyoide esse collocatur, cuius ossa & cartilagine cum superius suo loco descripsimus, reliquum est, ut nunc de eiusdem musculis agamus, nosque humani laryngis musculos, non beluini describemus, ut Galenus, & post eum Vesalius descripserunt: ne erres. De quo Vesalio ego profecto non possum non satis mirari, quo pacto, cum is Galenum numquam non lacessat, reprehendatque, quod simias, & bruta, non homines secuerit: ipse tamen in hoc ridiculus reprehensor beluæ laryngem, non hominis depinxerit, neque admonuerit. Quod ipse forte effecit, propterea quod larynx bestia-

Laryngis  
musculi.  
Larynx quid  
sit.  
Vox ubi pri-  
mo efformetur.

Gal. & Ves.  
beluinum.  
non huma-  
num laryn-  
gem scri-  
psisse.

Vesalius ri-  
diculus Gal.  
reprehensor.

Quare ab  
aliis dissen-  
tiat de la-  
rynge.

Musculos  
laryngis nō  
viginti vt a-  
liqui volūt,  
sed quatuor  
decim vere  
esse.  
Primi duo  
laryngis mu-  
sculi.

Musculi se-  
cūdi laryn-  
gis,

rum, cum multo maior sit, quam humanus, com-  
modior sectio fieri potuit: quod non modo in la-  
rynge, sed in oculis etiam egit bonus Vesalius, ut  
magis admirere: sed ad rem redeamus. Profecto  
humanus larynx exiguus satis est, & ob hoc se-  
catu difficilis. Quamobrem ni mireris, si cum  
cateri de belluino larynge, ego vero de humano  
loquar, ab aliis non parum dissenserō: neque enim  
ut optimos alioqui viros oppugnem, sed ut erro-  
res veritate duce, quoad eius fieri poterit, tollam,  
ab eorum opinione in hoc præsertim argumento  
cogor abscedere. Laryngis itaque musculos alij  
viginti statuunt, octo scilicet communes, propri-  
os duodecim. Ego vero quatuordecim esse affir-  
mo, quorum quinque communes sunt, proprij re-  
liqui. Priores duo communes (ita dicti, quod ali-  
unde cum oriuntur, huc tamen desinunt) a sum-  
mo pectore enascuntur, unde duo primi hyoidis  
musculi ortum ducunt: carnosus ubique sunt ten-  
dinis expertes, principio acuto præditi: incessus  
ipsorum est super arteriam asperam, inseruntur-  
que in inferiorem partem duorum osium scuti  
imaginem referentium, deorsum trahendo: ap-  
prime utiles sunt, quod dum agunt, infra quidē  
astringunt, supra vero laryngem dilatāt. Secun-  
di a lateribus hyoidis proficiuntur, ipsi quoque  
carnosi, terminus ipsorum prope priores accedit,  
fibræ his rectæ similiter coniungere: ab his infe-  
rior pars dilatatur, constringitur superior, con-  
trario

rario prioribus motu laryngem sursum attollūt. Ex his, quos communes dixi, ultimus musculus œsophagum complectitur, opemque cibi, & potus deglutioni prastat. Oritur ab ossium scutiformium lateribus, & transversas fibras semicirculū mitantes est nactus, quibus partem lateralem laryngis coarctat. Hic musculus me iudice, unus est dumtaxat, non duo, ut Galenus & cum Galeno Vesalius existimauere: qui cum hoc diligenter considerauerint, arbitrati sunt hos exoriri a parte posteriore œsophagi, qui membranosis, molliorque est, voluntque, ut laryngem, rem duram, ac grauem attrahat. Quare nihil est in hoc, quod eos excusē, cum absurdum maximum consequatur, si eos musculos illinc, proficisci dixerimus. Quod si vel fibras ipsas diligenter intueberis, perpetuas illas, non diuisas inuenies. Vesalius binos alios musculos communes describit, quos inquit enasci a parte hyoidis interna, atque in Epiglottidē inseri, quos in boue, bubulo, & eiusmodi animantibus haud dubie inuenire poteris: sed in homine nequaquam quamuis per diligens, & accuratus in secando fueris: & ita si octo communibus, quos appellant, tres detraxeris, quingē erūt reliqui. Proprii nouem sunt, ita dicti quod a larynge proficiscuntur, & in eandem desinunt, & huic uni seruiunt: facti sunt hac una de causa, ut glottidem aperiant, claudantq;. Est autem glottis rima oblonga in media larynge posita, de qua

Musculus  
œsophagū  
cōplectens.

Opinio di-  
uersa ab o-  
piniōne Ga-  
leni, & Vesa-  
lij.

Musculos  
binos laryn-  
gis a Vesalio  
descriptos  
in homine  
non dari

Musculi na-  
uem laryn-  
gis qui is-  
pius pto-  
prii dicuntur.  
Clottis  
quid, & ubi  
sit.



*Galenus inquit, similem substantiam in animalibus non inueniri. Ex his nouem musculis duo primi ab eo osse prodeunt, quod ego anulare appello, reliqui a cartilagine innominata exigui sunt, frangique habent obliquas, & in osium scutiformium inferiorem parte finem habent. Vfus ipsorum est, partem inferiorem recte constringere, superiorem dilatando: neque hoc motus contrarij loco censendum est: nam ossa dura sunt, quod si infra constringas, supra dilatari consequitur: idem in brutis faciunt scutiformes cartilagines. Ex his autem musculis alterum dextrum, sinistrum*

*Vesalii error de duobus primis laryngismusculis.* alterum comperias, li. et Vesalius quatuor hoc loco proprios musculos describat, quorum primos a scutali cartilagine oriri arbitratur, & in innominatam desinere. Quamobrem nequeo satis mirari, quoniam innominata motu caret, iccirco hi duo musculi, si adessent, ex ipsius sententia

*Musculi versus suum exortum operantur.* illam omnino mouerent: musculi namque versus suum exortum operantur. Hi quatuor musculi, teste eodem, intercostalibus similes sunt, inquit ipse, quod ita falsum est, ut neque in homine, sed ne in brutis quidem inueniri possit. Secundi vero illi musculi in posteriore parte oesophagum versus collocati, prolixi sunt, & perspicuitatem nescio quam pra se ferunt: oriuntur carnosa derivatione a posteriore, lateraliq; parte anularis ossis, rectaque in quartum & quintum os per tendinem finiunt, hoc est, inferiore in parte, ubi

cum tertio coarticulatur. In hunc usum creati  
 sunt, ut recta trahant: nam rectis fibris constāt,  
 & glottidem versus lateralem partem dilatant,  
 quae horum duorum musculorum auxilio crebro  
 referatur. Quare horum beneficio graues voces  
 emittuntur. Tertij fere ab anteriore parte ossis  
 anularis emergunt, cumque obliqui sint, in quar-  
 tum quintumque os terminum habent, prope cā-  
 partem, ubi duo secundi desinunt, non autem in  
 scutalem, ut Vesalius ipse voluit: hi glottidis an-  
 teriora adstringere, posteriora, dilatare possunt.  
 At quarti ortum habent ab interiore parte scu-  
 talium ossium, quibus cum articulantur, & obli-  
 que incedūt, donec in dicta ossa ingrediātur, quae  
 arytenoidem construunt, hoc est, in lateralibus  
 partibus: hi quoque cum anteriora arctent, poste-  
 riora amplificant. Extremus musculus laryngis  
 adeo parvus est, ut minorem in vniuerso corpore  
 inuenire nequeas: positus est transversim in radice  
 eorum duorum ossium, de quibus proxime me-  
 minimus, & fibra illius transversa sunt, haud dis-  
 similes fibris ultimi musculi ex communibus, qui  
 oesophagum complectitur: ab hoc autem posterior  
 pars constringitur, unaque anterior dilatatur.  
 Voluit quidem Vesalius hunc musculum muscu-  
 los esse duos, qui ab arytenoide exeant, & in e-  
 andem redeant. Ego vero vnum duntaxat esse  
 musculum hunc constanter affirmo, & fibras illi-  
 us esse continuas.

Voces gra-  
 ues cuius  
 merito e-  
 mittantur.

Tertij laryn-  
 gis musculi.

Glottidis  
 anteriora a-  
 stringentes,  
 posteriora  
 dilatantes  
 musculi.

Arytenoi-  
 dis cōstru-  
 tio.

Musculus  
 extremus  
 laryngis om-  
 nium mini-  
 mus.

## De musculis scapulas mouentibus.

## CAPVT. XV.

Musculi scapulas mouentes.

**E**TSI de musculis, qui caput mouent, primo loquendum videretur: tamen cum eorum magna pars sub scapula musculis contineatur, de his mihi antea, deque humeri musculis loquendum videtur, quam de musculis capitis verba faciam.

Musculos scapulas mouentes quatuor non septem, vt Gal. voluit, esse.

Musculus cucullaris, primus scapulae est musculus.

Musculus cucullaris varius motus.

musculus non absurde dici poterit, egrediturque tum ab occipite, tum ab apice spinarum, verterarum omnium, colli, atque thoracis, ad octauam usque: habet vero in occipite lineam transuersam, spaciumque occupat, quod occiput, auremque interiacet. Eius exortus exilis est, & procul admodum ab occipite usque ad octauam thoracis vertebram, terminum in Acromio ponit iuxta totum maioris scapulae processum, & clavicula partem: & cum variis sit constructus fibris, motus etiam edit varios: superioris partis ope fibris obliquis scapulam sursum oblique trahit, mediis autem versus dorsum adducit, inferioribus autem fibris deorsum



deorsum trahit, cuius vero figura huiusmodi est. Galenus hunc cucullarem musculū in duos diuisit superioremque partem trapeziam vocat, qui licet in homine unus sit, in simiis tamē duo sunt.

Nam a maiore processu acromio dicto usque ad occipitium unus est, ab hoc ad octauam vertebra musculus alius est. Cucullaris hic musculus in homine a Vesalio pro secundo describitur, qui scapulæ deseruit. Secundus musculus scapulæ dicatus primo humeri musculo subiacet, enascēs a secunda, tertia, quarta, & quinta, raro autem a sexta costa, ubi in cartilaginem degenerat, & sursum oblique ascendens in angustum cogitur, & in ancyroidem minorem scilicet scapulæ processum, tum carnosus, tum tendinosus terminatur. In hunc usum a natura genitus fuit, ut scapulam ad anteriora versus sternon adducat. Galenus autem existimauit hunc musculum humero famulari, cum tamē nullo pacto famuletur.

Musculus hic, quem nos secundum dicimus, a Vesalio primo loco describitur. Tertius prodit a trāsuerso processu secunda, tertia, quarta, quintaq; cervicis vertebra, & cum carnosus descendat, crassescit, validus fit, & in superiorem, atq; anteriorem scapulæ partem inseritur. Fibra illi rectæ sunt fere omnes: sunt enim aliquæ etiam obliquæ. Vtitur hoc natura ad scapulā attollendā, prioriq; auxiliū ferendū: nam scapulæ os satis graue existit. Quartus laus est musculus, tenuis, quadrāgu-

Cucullarē musculū in homine vni cū esse, non duos vt in simiis quicquid Galenus dixerit.

Musculus secundus scapulæ.

Secūdi scapulæ musculi vsus contra Galenum.

Tertius scapulæ musculus.

Tertij musculi beneficio scapulæ attollitur.

Quartus scapulæ musculus.

laris, progreditur a spina quinta, sexta, septima-  
que vertebra colli, & a tribus primis, superiori-  
bus ve thoracis: carnosus incipit, & partim ten-  
dinosus, fibris obliquis: terminus ipsius est iuxta  
vniuersam scapula longitudinem, quam dorso  
adducit, hoc est, retro trahit.

De musculis humerum mouentibus.

CAP. XVI.

Musculi hu-  
merū mo-  
uentes.  
Humeri plu-  
res motus.

Humeri  
musculos  
septem non  
vndecim ef-  
fe, vt Gale-  
no placuit.  
Primus sca-  
pulæ muscu-  
lus.

**H**UMERVS voluntario omni motus gene-  
re mouetur: sursum scilicet, deorsum, ante,  
retro, & circulari motu: eius musculi septē sunt,  
nō vndecim, vt Gal. placet lib. De Musc. Primus  
magnus est, carnosusque, qui anteriore thoracis  
partē occupat: a media clauicula versus sternon  
progreditur, & longitudinem totius fere ossis pe-  
toris sequitur, & a Cartilaginibus septima, &  
octaua costa, cui māmilla innititur. Principium  
huius amplum est, & magnū, semper tamen im-  
minuitur: fit acutus, tandēq; in tendinē breuem  
quidē, sed latū desinit, qui in interiorem humeri  
partē sub ipsius ceruice inseritur: habet musculus  
hic fibras varias, humerumq; multifariā ad pe-  
ctus adducit: supra scilicet, in medio, & infra ha-  
bet insuper hic musculus quinq; latera. Illud ob-  
ter adnotato, in inferiore huius musculi parte  
nōnumquā in quibusdā hominibus reperiri por-  
tionē quandā in acutū tendentē: ita vt musculus  
alius esse videatur, cū tamē nō sit. Gal. l. de Musc.  
ex unico hoc musculo ternos, si Diu placet, effe-  
cit.

Gal. incon-  
ueniens.

cit: huicque absurdo aliud absurdius addit. Nam in animum induxit suū, brachium oblique huius ope moueri, quod in simia quidem inuenire potest, at in homine nullo prorsus pacto. Secundus humeri musculus triangularis est, crassus, fibris variis intertextus, ab Anatomicis τριγωνικός, & deltoideus, & humeralis, e media clavicula, ab acromio, totoq; maiori scapulae processu enascitur: initium ipsius latum est, tendinosumq;: desinit tamē in acutum: supra humeri caput fertur, & medio in humero in validum, transuersumque tendinē desinit: qui tendo mediā humeri crassitiem amplectitur, multiplicibus fibris constat, quibus brachium attollit, & supra, & ante, & in medio, retroque. Tertium vero musculus humeri carnosus, teretēque cōspicies, qui ab inferiore parte scapulae egreditur carnea origine, fibris a principio ad finē usque rectis, sitūq; obliquus est, super gibbā anterioremq; scapulae partem progreditur, & in tendinē validum latum exit, qui in posteriore humeri parte implantatur, partes huius musculi sunt, ut brachiū deorsum versus posteriora trahat. At quartus musculus ingens est, & latissimus oritur ab apice spinæ sextæ vertebræ thoracis, descendit que iuxta apicem omnium vertebrarum inferiorū usq; ad os sacri dimidium: hoc adeo prolixum principium nervosum est undiq; sed gracile: deinde sursum ascēdit, in angustū redigitur, & in validū tendinē, breuē, la-

Secundus  
humeri mus-  
culus τρι-  
γωνικός, del-  
τοειδης & hume-  
ralis.

Tertius hu-  
meri muscu-  
lus.

Quintus  
humeri mus-  
culus.



tumque desinit: sub humeri caput prope eum locum, cui musculus primum pectus brachio adducentem adherere diximus, inter quos Axilla cavitates relinquitur. Varias hic musculus habet fibras, propterea brachium vario modo deorsum trahit, idque tamen obliquius potius, quam alio positionis genere. Tribus angulis inaequalib. praeditus est: nā ex his unus brevis est, duo vero praelongi: origo ipsorum ita se habet. Brevis est a sexta vertebra, usque ad ipsius finem, ex longis, alter ab hac vertebra usque ad ossis sacri dimidium, alter ab hoc loco ad ipsius terminum pertingit.

Quintus humeri musculus.

Quintus musculus eam omnem cavitatem occupat, quae inter summam scapulam, & maiorem ipsius processum posita est, & a posteriore parte ipsius enascitur: carnosus est, inualidumque tendinem desinens, cum sub eo ligamento deferatur, quod humerum cum scapula annectitur, in caput humeri superioris finit, multumq. scapula ipsi adheret. Sextus musculus ambit uniuersam scapula partem gibbam: emanat autem e parte posteriore iuxta ipsius longitudinem: carneus est, scapula admodum inhaerens, desinit q. in tendinem crassum quidem, sed lauum: in caput humeri inseritur versus posteriora. Septimo interna cavitates scapula uniuersa dicatur, ubi costis inhaeret: nascitur a tota posteriore scapulae parte. Situs ipsius est inter costas, scapulāq. & finis vero tēdo est satis latus, & in interiorem humerū inseritur.

Sextus humeri musculus.

Septimus humeri musculus.

seritur. *Vsus horum trium musculorum, quos ultimo loco memoravi, est brachij circumactio.*

# De musculis capitis. CAP. XVII.

**C**APUT tum primo, tum secundo mouetur. *primario cum dicimus, intelligimus de motu cum prima, secundaq; vertebra: secundo autem cum toto collo. Motus ipsius proprii tres mihi videntur esse, vnus ante retroq; alter ad latera, tertius cum id circumagunt, licet ad duos reduci haud incommode possint, ad rectum scilicet, & obliquum: rectus super prima sit vertebra, sub secunda obliquus, quicquid Gal. in hoc asserat, qui longa errauit via, adeo vt neq; Mathematicen, neque Anatonem in hoc calluisse videri possit. Musculi vero propriis motibus deseruientes septem vtrinq; sunt: primi oriuntur a spinis quinque superiorum vertebrarum thoracis, sursumq; a colli vertebris ad tertiam vsq; ascendentes, postmodum seiunguntur, & oblique versus occipitium incedunt, ubi desinunt inter posteriorem partem, & aures: fibrae vero iam inde ab origine sua, donec diuidantur, rectae sunt: deinde sursum spectantes obliquae sunt: praedicti musculi sunt satis carnosus. Vsus illorum est, vt caput ad posteriorem partem tunc attrahat, cum ambo vna operantur: at cum alter dumtaxat agit, caput in latus circulariter, vertunt: his musculis tria sunt latera, vnu ab initio vsque quo a coinge diuiditur, aliud inde*

Brachium  
a quinto, sexto & septimo humeri musculis circumagi.  
Musculi capitis.  
Caput primo & secundo motu mouetur.  
Capitis motus proprii.

Gal. casus.

Musculi propriorum motum capitis septem vtrinque sunt.  
Primi caput mouentes musculi.

Secundi mu-  
sculi caput  
mouentes.

caput, tertium ab occipitio ad exortum usque. Secundi musculi varij admodum, qui multas figuras, & impressiones varias habent partibusque multis tendinosi, carnosique etiā cōpluribus cōstant, ita ut plures quam quing. musculi videantur esse. Tamen par unum dumtaxat est, dextrū inquam, & sinistrum: initio acuto a transuerso processu quarta, quintaque thoracis vertebra exoriuntur, cumq. sursum ascendat, tandem medio in occipitio figuntur: rectus est ipsorum situs, minus vero caput ad posteriorem partem rectā attrahendi. Tertij musculi sunt graciles, qui oriuntur a spina secunda vertebra cervicis, demumque desinunt in occiput, sed aliquantulum disiuncti incidunt: fibris rectis cōstant, caput que posterius rectā ducunt. At quarti sub tertiis occultantur, carnosique omnes sunt, quemadmodum tertij, sed breues, a posterioreque parte prima vertebra oriuntur, ubi illi vertebra in spinam desinēdum fuerat, qua cauit, ne tertios musculos laderet: medio in occipitio finis ipsorum est, & ipse quoque rectā caput retrahunt. Neque cuiquam mirum videri debet naturam tot musculos collocasse, qui caput retraherēt: nam ita necessarium fuit, propterea quod anterior pars grauis admodum erat, quippe cui facies, maxillaque inferior coniuncta est. Quinto pari musculorum capitis obliquus contigit situs, atque hi a secunda vertebra spina exoriuntur, & in prima transuersum processum

Tertij mu-  
sculi caput  
mouentes.

Quartimu-  
sculi caput  
mouentes.

Quinti ca-  
put mouen-  
tes musculi.

termi-



terminantur, caput in orbem unà cū prima vertebra trahunt, carnosique omnes sunt, licet graciles. Sexti item obliqui, sed contrarij sunt, triangulumq; efficiunt: e medio occipitio desinunt, emerguntq; ex prima vertebra processu, & versus anteriora trahunt. Itaque hi duo ante dicti, quintus inquam, & sextus proprij musculi sunt, qui caput in orbem cient, a primis tamen, atq; ab extremis, quos mox describemus, adiuti. Septimo loco musculi occurrunt longi, teretes, validi, quique vel nondum excoiato cadauere apparēt, imo vel in viuētib; conspicuntur, quos maiores nostri in numismatibus tanta diligentia obseruare, obliquo sunt situ, eorum autem fibrae a summo pectore, atq; a clauicula oriūtur: duo habent principia, inter quae cavitās dest: neruet sunt, in exortu lati: carnosi fiunt, & in processum māmillarē implantātur, quē & amplexātur: cū uterq; operatur, caput antērius inclināt: verum quoties vnus ex his mouetur, caput in latus agitur: validi admodū sunt, atq; hi satis idonei fuisse, ut caput in pronū flecterent. Illud est insuper obseruandū, hos musculos unà cū quarto hyoidis musculo magnam crucem in collo efficere.

Sexti caput mouentes musculi.

Quinti, & sexti musculi proprie caput in orbem mouentes.

Septimi caput mouentes musculi.

#### De musculis ceruicis. CAP. XVIII.

LOQUVTI iam sumus de musculis, qui primo caput mouent: nunc de iis loquemur, a quibus secundo mouetur, qui quidem ceruicis deseruiunt, quo moto, caput etiam ipsum, non

Musculi ceruicis.

Secundarij capitis motus.

moueri non potest: cum ceruix capiti articulata,  
 atque annexa sit. Ceruix igitur tum ante, tū re-  
 tro, tum ad latera mouetur, & eius musculi sunt  
 octo, quatuor scilicet utrimq;. Primi in antero-  
 re parte positi sunt, recti a corpore quinta thora-  
 cis vertebra prodeunt, prope locū illū, in quo cum  
 costa connectitur, ascendensque vniuersis verte-  
 brarum corporibus annectitur. Sed mediā partē,  
 qua œsophago iter præbetur, detectā relinquunt:  
 suntq; hi musculi, quos sub œsophago latitantes ap-  
 pellant, tendine acuto in anteriorem primæ ver-  
 tebræ processum finiunt, vbi illi in corpus (ut vo-  
 cant) desinendum erat. Eorum vsum si petas, e-  
 go dicam tibi, flectunt ceruicem versus antero-  
 ra, Verum illud est obseruandum, musculos, quos  
 proxime memorauimus, occipitio etiam quandoque,  
 sed raro annecti, vbi foramen est, per quod spina-  
 lis medulla descendit. Secundi a prima costa car-  
 nosi, amplique nascuntur, ascendentes ita arctā-  
 tur, ut triangulum tantum non efforment: ful-  
 ciuntur a transversis processibus vertebrarum  
 colli a parte anteriori. Tertiis origo est e radice  
 transversæ processus sextæ vertebra thoracis, &  
 sursum ascendēdo a cæteris quoq; transversis pro-  
 cessib; vertebrarum thoracis, tandemq; a singulis  
 processibus vertebrarū colli posteriore in parte cō-  
 nectuntur: horū utilitas, & eorū, quos secundos  
 nominauimus, est, ut collū rectā ad scapulas fle-  
 ctāt, id est, ad latus, cū uterq; eodē agit tempore.

Sed

*Sed cum alter tantum agit, tunc oblique mouetur. Inter binos hos musculos nerui, qui a spinali medulla prodeunt, inter vertebrae colli exeunt. At quartus exortus est, a septima vertebra thoracis, supra omnes thoracis, collique spinas, desinuntque tandem in spinam secundae vertebrae colli: munus autem ipsorum est collum ad posteriora attrahendi.*

Quarti ceruicis musculi.

# De musculis dorsi. CAP. XIX.

**V**ARIIS motibus dorsum mouetur, in anteriorem partem posterioremque, item ad latera, & in orbem nescio quo pacto: quos motus per-eleganter in saltatoribus quibusdam videas. O-cto prae dictum est musculis dorsum ipsum: quatuor enim vtrinq; habet. Primi oriuntur a cavi-tate superiore, posterioreque ossis ilij, & a superiore quide, sed interiori parte ossis sacri, origo eoru la-ta, carnosaque existit, & in parte abdominis in-teriore ascendunt, & adherent transuersis pro-cessibus. vertebrarum lumborum & infima costa, car-nosi sunt toti, & figura quadrilatera. Hunc au-tem in usum confirmati suere, ut dorsum in an-teriora flecterent, cum scilicet uterque simul ope-ratur: quod si seiunctim moueant, tunc ad latera trahunt. Secundi longiores sint musculis omni-bus nostri corporis, nam ab imo osse sacro ad ca-put usque extenduntur. Exoriuntur autem ab extremo osse sacro principio veruoso, validoque: deinde in carnem degenerant, haerentque trans-

Dorsi mu-  
sculi.

Musculi  
dorsi octo.

Primi dorsi  
musculi.

Primorum  
dorsi muscu-  
lorum usus.

Secundi mu-  
sculi dorsi.



uersis processibus vertebrarum lumborum uersus posteriorem partē: postmodum omnibus transuersis processibus vertebrarum thoracis ad primam usque thoracis vertebrā, & ad unū quemque ex transversis processibus tendinem mittunt siue nervosam ansulam: quo loco Vesalius opinatur ipsum musculus desinere, a processibus discedens, & ascendēs in temporale os, supra māmillarem processum desinit: & hanc, quam describitur partem. Vesalius cum musculis capitis confudit. Neque inutiles sunt supra a nobis positi musculi: nam illis munus demādatum est, ut uniuersum dorsum, & caput etiam ad partem posteriorem flectant, & ut mole corporis semicir-

Vesalij negligentia.

Tertij dorſi musculi.

culi figuram imitari possimus. Tertij nascuntur a posteriore parte ossis sacri, initio in acutum tendente: annectuntur spinis vertebrarum lumborum, & in spinam duodecima vertebra thoracis acuta terminantur: & nonnumquam in undecimam: ansulis praterea nervosis præditi sunt, ut superius meminimus: lumbos flectunt, ne vsum queras. Quarti a spina duodecima vertebra thoracis oriuntur principio & ipsi acuto, &

Quarti dorſi musculi.

spinis omnibus vertebrarum thoracis colligantur, & in primā sine etiā acuto finiunt: in mediolati sunt circa sextā vertebrā: eorū usus est thoracem erigere, & cum tres supra dicti una operantur, dorsum uniuersum rectum detinent. Quod si quatuor agant simul, ut unus scilicet alterum

Quartorū dorſi musculorum vsus.

subse-

subsequatur, in orbem mouent, agentibus autem musculis, qui ex altera dumtaxat sunt parte, corpus in latus voluitur. Tres priores sunt musculi lumbales, quos Græci *ῥέσπας* vocāt, tres ultimi annexi admodū sunt, hic fit, ut nisi optimus, diligēsque sit Anatomicus, haud facile inueniātur, & distinguātur. Ego tū in his, tum in ceruicis musculis describēdis a Gal. deprehēdendo volens abstinui (licet hos male Galenus descripserit) ne studio contradicendi potius, quam quod re ipsa ita inuenirem, hac scripsisse cuipiam videri possim: sed si nostram horum musculorū descriptionem cum Galeno cōtulerit, facile inueniet quantum intersit.

Tres musculi lumbales, Græcis *ῥέσπας* dicuntur.

Galenus error in ultimis dorsis musculis describendis.

De musculis thoracem mouentibus.

## CAPVT. XX.

**T**HORAX pars est intus concava ouum referens, in quo ea sita sunt instrumenta, quæ vitæ ancillantur, & per consequens respirationi, inspirationique, sine quibus ne vitæ quidem ipsa stare vllō modo potest. Hic tum electione, tum natura mouetur: licet Galen. secundo de motu Muscul. illum electione solum moueri censuerit: ego vero assero nos cum somnum capimus, tunc naturaliter thoracem moueri non voluntate, ad quam prudentissima respiciens natura inter costas, sternonque cartilagine posuit, quæ pulmonis motui facile cedunt: qui pulmo vigilante, dormienteque pariter homine mouetur, præterquam sermocinantibus nobis, ac vo-

Musculi thoracem mouentes. Thoracis descriptio.

Thoracem & naturali, & voluntario motu moueri aduersus Galen. sententiā.

Thoracem his motibus, qui voluntarius est, a musculis propriis, & pulmonis motu dilatari. *ciferantibus. Tunc enim paulo amplius mouetur: quoniam muscoli thoracem magis dilatant. Ex his motibus, qui voluntarius est, a musculis proficiscitur, alter ob pulmonis dilatationem, ac contractionem. Igitur qui hoc praestant muscoli sunt proprii quidem unus supra octoginta & octo communes in abdomine positi: qui quamuis illi famulentur: tamen thoraci quoque famulantur: sunt ergo omnes octoginta nouem. Animaduertendum est autem hoc, quod est pulcherrimum, quum inspiramus, inferiores thoracis partes dilatari, superioresque comprimi: contra cum expiramus, constringi inferiora, superiora dilatari. Primi, qui occurrunt, bini sunt, utrinque unus, ab inferiore clauicula prodeuntes: initio, sineque ita oblongo sunt & in partem primam costae superiorem inferuntur, quam dilatant. Secundus musculus magnus est, latus, carnosus totus, qui a basi scapulae emergit: incessus eius est inter ipsam, & costas, inseriturque in primam, secundam, tertiam, quartam, quintam, sextam, septimam, & octauam costam, & quandoque in nonam: proxime vero eam partem, qua in cartilagine desinunt fines ipsius sunt digitorum instar: factus est octo costas dilatandi gratia. Sed tertius exilis est, & paruus, a spinis trium vertebrarum colli, quae extremae sunt, & a prima thoracis enascitur: principium latum, membranosumque est, terminat hunc primam thoracis costam, & interdum in quarta posteriori*

Thoraci proprii musculi sunt 18. & octo non proprii. In inspiratione inferiores thoracis partes dilatantur, superiores vero comprimuntur, in expiratione contra se habet. Primus thoracis musculus.

Secundus thoracis musculus.

Tertius thoracis musculus & eius usus.



em partem desinit: hoc usu a natura cōstructus  
 uit, ut hasce costas dilataret. Quartus musculus  
 & ipse exilis, & quadrangularis, prodit a spinis  
 vertebrarum duarum extremarum thoracis, &  
 nonnumquam a prima lumborum: principium  
 eius latum est, nervosum, membranosumque:  
 deinde carnosum efficitur, & in tres infimas co-  
 stas terminum habet, finis vero est in digitorum  
 morem: & eas costas dilatat. Quintus carneus  
 prodit a parte posteriore, superioreque ossis sacri,  
 & ab interno ossē ilij: adeo pertinaciter secundo  
 lorsi musculo adheret, ut illius portio non iniu-  
 ta esse videatur. Nihilosecuius, quā primū ad co-  
 stas pervētum est, plane patet hūc a musculo dor-  
 si diuersum esse. Quo magis ascendit, eo tenuior  
 vadit: demum nervosarum ansularum admini-  
 culo inseritur omnibus costis posteriore in parte,  
 non procul admodum a transversis processibus  
 vertebrarum, ubi costae asperitatem eminentem  
 habent: constringunt partes posteriora thoracis.  
 Sextus positus est interna in cavitate thoracis se-  
 cundum sternon, & cartilagine septem verarū  
 costarum oblongus est, carnosus totus, sed exilis.  
 hunc in usum natus est, ut anteriora thoracis  
 coarctet. Sequuntur deinde intercostales muscu-  
 li ita dicti, propterea quod costarum occupant in-  
 ternualla: qui utrinque sunt triginta quatuor: nā  
 undecim sunt internualla, verarū costarum sex,  
 quinque autem notharum: in his duo sunt in

Secūdi tho-  
racis muscu-  
livsus.

Quartus  
thoracis  
musculus.

Quintus  
thoracis  
musculus.

Sextus tho-  
racis muscu-  
lus.

Musculi in-  
tercostales  
sunt utrin-  
que trigin-  
ta quatuor

Musculi in-  
ter costales  
exteriores.

Musculi in-  
tercostales  
interiores.

Anatomico-  
rum omniū  
in interco-  
staliū mu-  
sculorum v-  
erba error.

quolibet intervallo, in illis quatuor: hanc differē-  
tiam efficit, quod cartilagines versus pectus ver-  
tantur. In his enim fibrarum deductus voluitur:  
hi sunt anteriores, interioresq; fibris obliquis, sed  
contrariis, adeo ut exteriores, cum interioribus  
x literam efficiant: exteriorum ortus est ab infe-  
riore parte costarum: ac desinūt in superiora sub-  
sequentium, versus dorsum cum incipiant, in os  
pectoris demum inseruntur. Interiores vero ini-  
tium sumūt a parte superiori costarum: & in in-  
feriorem supra posita terminantur. Fibra exte-  
riorū a dorso oblique versus pectus ita procedūt,  
ut a supernis ad inferna ita descendere videan-  
tur. Interiorum vero fibra contrario se habent  
modo, adeo ut in crucis morem cōiungātur: sub-  
riles quidem sunt, sed longi, non altiore loco siti,  
quod enim interest spatij inter costas, perbreve  
est. Illud ne te effugiat, moneo candide lector:  
Anatomicos omnes in horum musculorum vitiis  
deceptos fuisse. Vesalius inter reliquos, qui Ga-  
lenum reprehendit, reprehensione non vacat:  
nam ipse certo assēuerat interiores non secus, ac  
exteriores genitos esse, ut costas constringant so-  
lum: neque sensit motum illum dilatare, quem  
ipse opinatus est adstringere: costam enim a costā  
seiungit: atque hunc in modum agit exterior  
musculus. Motum hunc dilationis tunc edunt,  
tum soli operantur: hoc est vel interiores, vel ex-  
teriores seiunctim: cum vero omnes unā mouēt,  
coarctant

oarctant valide. Exteriores enim sursum trahunt, interiores deorsum, atque ita trahunt costas simul, valideque constringunt: nam vis constringendi in thorace valida esse debebat, eo quod oras expiramus, & vociferamur: & hunc motum ego sepius in viui canis sectionibus obseruavi: sectionibus, inquam, quæ demum fiunt, non quæ aliam: ibi enim omnia, ut in priuatis sectionibus, exquisitè considerari nequeunt, ob auditorum bectatorumque frequentiam: sæpe enim tercetis, & amplius auditoribus in Academia Patauina & Pisana, & Romæ denique, ubi iam decem annos profiteor, me circumdatum vidi. Causa quamobrem Vesalius in hoc hallucinatus fuerit, hæc fuit: quod existimauerit in hoc motu primam costam immotam permanere, Verum aliter res habet: erigitur enim a primo musculo thoracis qui a iugulo emergit: quæ cum attollitur, costas ordine trahit: quibus sui intercostales musculi opem ferunt, itaque sursum versus extendatur, exterioribus auxiliantibus: contra vero deorsum inferiorum adnunculo: quoniam vltima costa deorsum trahitur a musculo abdominis oblique ascendente: atque hoc, quo diximus ordine, dilatantur. Quum vero simul utriusque operantur, tunc vniuersa thoracis constrictio sequitur, ut iam explicauimus.

De septo transuerso. CAP. XXI.

**D**IAPHRAGMA musculus est membrana naturalia a vitalibus, diuidens: ut inquit diu-

Vesalij erroris causæ in intercostalium musculorum vsu. Primam costam moueri. Quando costæ moueantur.

Diaphragma.



Falsa opi-  
nio Arist.

Phrenes.

Partes septū  
trāsuersum  
ingrediētes.

nus Plato, qui animam irascibilem a concupiscibili diuidebat. Aristoteles diuisionem hanc a natura genitam existimauit, ne qui vapores a cibo attolluntur, cor laderent, in quo duas prædictas virtutes, atque alias etiam plerasque collocauit. Quod falsum esse, suo loco dicemus: sed, quamuis hoc non adesset septum, aio hos vapores cor nō offensuros fore: nā per œsophagum progrediuntur. Quod si hoc fuisset, quemadmodum ipse in animum induxit suum, quo pacto se volatiliū corda haberent, cū septo careant: hic musculus a reliquis omnibus differt situ, figura, nobilitate. Situs enim est in ultimo thorace, & corpori nostro transuersus manet. Figura ipsius orbicularis est, in medio nerueum tendinem habet: partibus tamen carnosus circumdatur, fibræ a centro ad circumferentiā tendentibus, re contemplatu pulcherrima. Nobilitas vero eiusmodi est, ut veteres Medici phrenes illud, quasi mentem dixeris, appellauerint: hoc etenim lasso, rareuadimus. Sed præter neruosum, quem diximus tendinem, qui multisensus est particeps, veniunt ad sunt, arteriæq; non parue: amplius multis que neruis refertum est septum, qui quidem a spinali medulla emanantes inter costarum in crura nulla ad diaphragma properant. Inter quos nervos, duo sunt, qui inter quartam, quintam que cervicis vertebrā incedentes inferius supra pericardium inseruntur, ubi carnosa pars septi in tendi-

nen

nem degenerat: seu maior ubi in carnosam natu-  
 ram desinit tendo: & hanc sane ob causam Gale-  
 nus de exortu ipsius varius admodum fuit, sibi-  
 dissidens: nunc enim hunc inquit a costarum no-  
 harum cartilagine, nunc a spina exoriri. Septū  
 hoc, de quo loquitur, thoracis est musculus, qui  
 expirationi, inspirationi-que ministrat: cum enim  
 suo munere fungitur, retrahit sese versus verte-  
 bras, ascendensque extrema thoracis ad se trahit,  
 inferioremque partem uniuersam constringit:  
 atque hæc, cum expiramus; at cum inspiramus,  
 relaxatur, descendensque permittit inferiora  
 thoracis dilatarī. Atque hæc est septi transversī  
 utilitas, quam in viua sectione spectare licet. Hic  
 musculus tum supra, tum infra, quasi veste tegi-  
 tur, supra quidem a pleura, infra vero a perito-  
 neo: a vertebra exoritur. Alij principium ipsius  
 partem nervosam esse existimant. Ego vero duas  
 eius partes esse dicere longiusculas illas, quas Ve-  
 salius ligamenta nūcupauit, quæ corpuscula pro-  
 deunt e latere corporis vertebra duodecima tho-  
 racis, & a superioribus lumborum: atque inde po-  
 stea pars ipsius nervosa initium sumit, quæ carti-  
 lagini, quam gladialem vocant, coniungitur.  
 Gladialis vero cartilago, ut suo loco latius expli-  
 catū fuit, idcirco genita est, ut septi prædicti pro-  
 pugnasculū foret, nō oris vetriculi, ut vulgus me-  
 dicorū arbitratur, & huic et parti cor innitur:  
 fit carnosum utrinque septū, & in cartilagines co-

Septū tho-  
 racis esse  
 musculū in-  
 spirationi,  
 expirationi  
 feruens.

Gladialis  
 cartilago.

starum, quas mendosas dicunt, demum implan-  
tatur ultimam costam amplectens. Sed hoc idem  
septum, licet nobile admodū sit, ut diximus: ni-  
hilominus necesse fuit, ut aliis nostri corporis  
partibus cederet, accommodareturq<sup>3</sup>. Idcirco duo-

Duo septi  
transuersi  
propria fo-  
ramina.

bus traditum est foraminibus, quorum in dex-  
tra unum, alterū in sinistra situm est. Per dex-  
trū vena caua ascendit, quae in thoracem progre-  
ditur, per sinistrū oesophagus descendit, cuius ter-  
minus in ventriculum est: cum oesophago autem  
incedunt nerui bini, quos sextum par neruorum  
cerebri constituit. Atq<sup>3</sup> haec propria sunt septi tras-

Tertiū fo-  
ramen in se-  
pto contra  
Vesalij opi-  
nionem nō  
dari.  
Hipp. & Ga-  
leni error.

uersi foramina. Vesalius praeter hac, tertiū ponit  
propriū diaphragmatis foramē: per quod arteria  
aortā dicta iter sternitur. At ego hoc foramen esse  
nego: nā ipsa arteria aortā transit corporibus ver-  
tebrarum adherens. Itaq<sup>3</sup> septū dum vertebrae  
amplectitur, arteriam quoq<sup>3</sup> amplectitur: nō ta-  
mē propter ea perforatur. Non negauerim equi-  
dem Hippocratem diuinum hominē, nec nō Ga-  
lenum post ipsum scriptum reliquissē, per idē fo-  
ramen, quo aditus oesophago patet, magna etiam  
arteria iter praebere: sed profecto, pace tantorum  
virorum, sensus aliter esse aperte ostendit.

De musculis abdominis. CAP. XXII.

Musculi ab-  
dominis.  
Abdomen.  
Εντοσπέρειον  
Mirach.

**A**BDOMEN ea pars est humani corporis  
quam nos ventrē inferiorem dicimus, Graeci  
ἐντοσπέρειον, Arabes mirach appellauerunt, in  
quo sū nutri- tionis, sū generationis membra con-  
tinentur



tenentur, in cuiusque medio situs est umbilicus.

Musculis octo präditum est abdomen, qui ipsius ministerio addicti sunt: licet thoraci opẽ quoque ferant: nam illud dilatant: quod si compriment, secum urina & fœtus expulsionẽ auxiliantur, præsertim a septo trãversõ adiuti. Quid? quod hi musculi detinẽdis omnibus iis, quæ a natura in hac regione sita fuere, magno sunt vsui? Sed ut ad ipsorum descriptionem descendamus:

Sunt utrinque quatuor. Primi duo musculi obliqui descendentes ob id nuncupantur: quod e superioribus originẽ ducẽtes in inferiorib. desinunt partibus. Fibras habet obliquas, & propterea obliquorum nomen illis inditum fuit, lati admodum sunt, positiq. in lateralibus partibus. Emergunt a sexta, septima, octava nonaq. costâ, antea quam in cartilagine desinere incipiant, deincepsque a subsequẽtibus costis, & ab apice trãversorum processuum vertebrarum lumborum, & a dimidia ossis ilij appendice, latissimum habent principium, & carnosum, digitorum ut plurimum instar, inter eos fines secundi musculi thoracis ingrediuntur, qui octo costas dilatant. Postea vero quam non parum progressi sunt, in latum tendinem, nervosum, membranosumque degenerant, qui tendoreliquæ parti appendicis ossis ilij, de qua dicebamus, & pubis adheret: non autem coxendici, ut male Leonardus Fuchsius opinabatur: in medio vẽtre finiunt, a mucronata scilicet cartilagine,

Musculi abdominis octo, nempe utrinque quatuor.

Primi duo abdominis musculi descendentes dicti.

Fuchsi falsâ opinio.

Vesalii er-  
ror.

recta usque ad os pubis, quo loco candidam lineam cernere est, ubi horum musculorum tendines, una cum obliquis ascendentibus, & transversalibus cōiunguntur: hac autem pars ideo albicat, quod illi caro non subiacet. Igitur candida linea terminus est prae dictorum musculorum: non in osse pubis, quemadmodum Vesalius voluit. Nam os pubis non mouetur, quocirca munere suo quī fungi potuissent obliqui descendentes abdominis muscoli, si in os pubis inserti fuissent, & religati? qui prae terquam quod & intestina, & quae diximus, alia premunt, inferiora thoracis etiam constringunt, & septo auxilium ferunt: scitog, eam esse illorū tendinis unionem, ut musculus unus dūtaxat esse videatur, cui duae carnosae partes contingere. Verum si quis terminum fibrarū diligēter animaduertit, duos esse musculos plane comperiet, qui in medio uniuntur: & alios sex vētris inferioris musculos supereminēt.

Secundi ab-  
dominis  
musculi af-  
cendentes  
vocati.

Secundi sunt obliqui ascendentes, quorum fibrae opposito modo se habēt, ac primorū fibrae; nam illae deorsum, haec vero sursum oblique spectant: & quēadmodū intercostaliū musculorū fibrae, cruciantur, ut dicunt, id est, crucis, vel x literae figuram imitātur. Oriuntur igitur hi carnosi ab appendice ossis ilij, & transversorum processuum vertebrarum lumborum initio membranā imitantes, sursum quidem carnosi neētuntur inferioribus costis: deinde in latū, nervosum, membranosum.

nosumque tendinem desinunt, qui ubi ascendit, rectisq; musculis occurrit, in duos scinditur: quorum alter supra rectum musculum, alter sub ipso incedit. Qua in re non poteris studio selector, natura sagacitatem, atque admirabilem sapientiam satis obstupefcere: nam recti musculi hoc complexu robustiores efficiuntur, & in medio trium constituuntur. Et nisi tendo iste scissus fuisset, recti musculi in medio collocari nullo modo poterant: sed uniuntur denuo hi tendines, ubi lineam candidam sitam esse diximus. atque hic, eodem modo, quo descendentes, finiunt, & quibusdam nervosis rectorum musculorum partibus adhaerescunt. *V*sus eorum est, ut intestina comprimant, & costas deorsum trahant, quo thorax dilatetur. Tertij musculi abdominis sunt recti, ita dicti, quod secundum corporis rectitudinem siti fuerint, rectisq; fibris consent: incipiunt ab osse pubis, quamvis Galeno sexto *Metho.* in quinto de *Vsu Part.* & in quinto de *Aggref.* *Anat.* aliter videatur. Arbitrabatur enim ipse illos a pectore, si Diis placet, emergere. cum in illud potius supra mucronatam cartilaginem desinant. Duo principia ut plurimum habent, nervosum alterum, alterum carneum, a superiore parte ossis pubis: quandoque tamen unum solum habent carnosum initium: terminantur in sternō, ut dixi, & in cartilagines ultimarum costarū verarū, idq; lato fine: tendinis expertes sunt: tribus tamen

Ascenden-  
tium & de-  
scendentiū  
musculorū  
vſus.

Tertij abdo-  
minis mus-  
culi recti ap-  
pellati.

Galeni er-  
ror de rectis  
musculis.



tendinosi, nervosiq; intersectionibus nō carne-  
re, quibus muscoli obliqui ascendentes adherēt.

Tuque adnotato Galenum, quas divisiones supra

Musculorū  
rectorū \*in-  
tersectiones  
a Galeno de-  
scriptæ.

memoravi, nullo modo adnotasse: licet vel in si-  
mis ipsis reperiātur. At quorsum hæ intersectioni-  
ones? inquis: horum musculorum roboris gratia  
effecta fuere, neve admodum in profundum ab-  
domen contraherentur, ut venter magis spheri-  
cus relinqueretur. Sunt in exortu proximi, sed  
quo magis ascendunt, eo magis seiungūtur. Crassī  
sunt satis, validiq; hac utilitate a natura facti,  
ut anteriora abdominis comprimant. Sed eui-  
dentior eorundē usus est, thoracē deorsum tra-  
hendi, ut supra dilatari posset. Vltimi sunt trās-  
uersales, hoc nomen sortiti sunt, quoniam trans-  
uersim in corpore collocantur, a transuersis pro-  
cessibus vertebrarū lumborum nervosi prodeunt,  
deinde carnosī euadunt, & ossi ilii, costisque infe-  
rioribus coherent, fibras quoque transuersas ha-  
bent: finis vero illorum tendo est latus, nervosus,  
membranosusque in linea candida, & ossi pubis  
haerentes fiunt, quemadmodum obliqui ascen-

Transuersa-  
lium muscu-  
lorum usus.  
Tēdines o-  
bliquorum  
ascen. descen.  
& trāsuerfa-  
liū perfora-  
tos esse.

dentes, & descendentes, licet non ita adhæreant:  
haerent etiam peritonæo: partes eorum sunt ab-  
domen comprimere, & hypochondria constrin-  
gere. Animaduertendum insuper est, tendines  
musculorum obliquorum descendantium, ascen-  
dentium, & transuersalium, perforatos esse. Pri-  
mo ubi umbilicus positus est: secundo prope o-

pubis.

pubis, & per ea foramina descendunt vasa semen  
 testibus preparantia, ascenduntque deferentia,  
 que in glāndulas parastatas tandem inseruntur:  
 atque hæc foramina sunt per quæ herniæ fiunt:  
 sunt etiam in mulieribus perforata, quamquam  
 Vesalius hoc numquam animaduernerit, quem-  
 admodum dicemus ubi de matrice verba facie-  
 mus. Inuenies etiam alios ætatis meæ Anatomi-  
 cos; qui & ipsi aliquid inuenisse videri volunt,  
 decemque musculos in abdomine constituunt. Sed  
 hi mehercle falluntur: nam carnosum rectorum  
 musculorum principi in musculum esse distin-  
 ctum voluit: quod nullo pacto est: neque enim  
 musculi definitio illis accommodari potest. Quod  
 si musculi essent, ut illis placet, aliquo munere si-  
 bi fungendum esset: ut quod Priapo ad illum eri-  
 gendum præsto sint, quod agere nequeunt, eo quod  
 illi non adhæreant, sed os pubis superius affixi  
 sint. Quod si penis illis sursum trahendus esset,  
 sursum quoque esset ab iisdem virtute trahenda.  
 Nam in scemella non secus, atque in mare depre-  
 henduntur, quæ vulua voluntarie non mouetur,  
 sibi in animum induxerunt prædictos ab ipsis vo-  
 catos musculos rectis opem ferre, quod verum  
 esse neutiquam potest. Nam adeo validi sunt  
 recti abdominis musculi, ut auxilio non egeant:  
 sin autem velint suos musculos vesicam compri-  
 mere, tantumdem est: nam ab omni us octo  
 comprimitur, quod verum dumtaxat ex his of-

Vasa semen  
 preparantia.  
 Vasa de fere-  
 tia semen.

Error poste-  
 riorū 4 ana-  
 tomicorū

Vulua mo-  
 tuuoluntarie  
 nō moueri

ficiis fungendum esset sibi: quoniam nihil super-  
est agendum præter hæc: absurdum aliud nõ mi-  
nus sequitur, quod hæc carnosæ origines, quas di-  
stinctos musculos isti vocant, in omnibus nõ in-  
ueniuntur, quos sequeretur his utilitatibus care-  
re, ob quas geniti sunt dicti muscoli. Quare va-  
num hoc dictu est: & hæc de decem musculis ab-  
dominis sententia defendi nullo modo potest.

Improba-  
tur opinio  
de decem mu-  
lis abdomi-  
nis:

Musculi re-  
sticuli.  
Auctor mē-  
brana.

De musculis testiculorum. CAP. XXIII.

**B**INI sunt, tenues, oblongiq; muscoli, qui tes-  
tibus deseruiūt: siti sunt in Darto membra-  
na, eorumq; origo est supra os pubis, ubi foramen  
videre est, per quod seminaria vasa descendunt,  
eadem mēbrana inuoluta. Profecto, si verū fateri  
licet ingenue, veri muscoli formam vix præ se fe-  
runt. Sunt. n. fibrae quadam carnosæ, rectæq; in  
hac Darto posita, hos musculos antiqui cremaste-  
ras, quasi suspensores dixeris, appellauerunt. Hæc  
enim ob causam effecti a natura videntur, ut tes-  
tes suspenderent, ne temere dilaberentur. Aliis  
placet hos non modo testes detinere, ne prolaban-  
tur: verum etiā testes ab hisce attrahi, idq; volū-  
tarie, dextrum a dextro, atq; sinistrum a sinistro.

Remanens  
musculi, ac  
suspensores  
dicti.

De musculis penis. CAP. XXIII.

Penis descri-  
ptio.

**P**ENIS præter eius substantiam, quæ rara est,  
porisque referta spongiæ instar, & crassam,  
qua circumuoluitur, membranam, quatuor in-  
super musculos habet: quorum primi a sphin-  
ctere ortum ducunt, orbiculari scilicet musculo,

Quatuor  
penis mu-  
sculi.  
et quæritur.

qui



qui extremo recto intestino adiacet; longiusculi sunt, subtus incedunt, & media ipsius parte plus minus in meatum urinarium implantatur, qui meatus semini quoque communis existit, hunc amplectuntur, subtiles sunt, in hunc usum producti, ut cum lotium nobis, vel semen emittendum est, hunc meatum dilatent: reliqui duo musculi a coxæ dicis appendice oriuntur, sub ipsius penis exortu, qui ab inferiori parte ossis pubis initium sumit: sunt hi quidem breues, at prædictis crassiores, in ipsumque penis corpus desinunt, in meiendi munere ipsi quoque magnam opem ferentes, maiorem vero in coeundo afferunt: nam penem sustinent, erectumque detinent, donec opus absoluitur.

Primi duo  
penis mu-  
sculi.

Primorum  
duorum pe-  
nis muscu-  
lorum usus.  
Duo poste-  
riores penis  
musculi.

Posteriorum  
duorum pe-  
nis muscu-  
lorum usus.

## De musculis uteri. CAP. XXV.

**A**NIMADVERTENDUM est in laterali-  
bus uteri partibus, ubi adsunt seminaria  
vasa, duas etiam adesse membranas duarum a-  
larum instar, quæ diuisionem ab hisce vasis fa-  
ciunt continent. Quibus in membranis non in  
omnibus quidem, sed in quibusdam dumtaxat  
mulieribus certæ sunt carneæ fibrae, velut in vi-  
rorum darto: has carneas fibras Vesalius ita de-  
scribit, quasi musculi sint, qui uterum sursum  
sensim attollant. Ego vero, si quis paucas hasce  
fibras, quæ neque etiam in omnibus feminis re-  
periuntur, voluerit pro uteri musculis accipere,  
non multum morarer: parui enim refert, has ne  
musculos voces, an musculos esse deneges.

Musculi u-  
teri.  
Membranæ  
in uteri late-  
rib. alarum  
instar posi-  
tæ.

## De vesicæ musculis. CAP. XXVI.

Vesica.  
*vesica*  
 glândula se-  
 men conti-  
 nentes.

Musculus  
 vesicæ collū  
 cōplectens.

Error cōtin-  
 gēs empiri-  
 cis lapidē  
 vesicæ extra-  
 heantibus.

Mulieres ca-  
 rēt glândulis  
 parastatis.  
 cū tamē mu-  
 sculū ibi ex-  
 istens ha-  
 beant.

Anus.  
 Ani tres mu-  
 sculi.  
 Musculus or-

**I**n hominis Vesica, cum in collum euadit, natu-  
 ra duas glandulas parastatas dictas, colloca-  
 uit, quæ quidem semine continenter referte  
 sunt, nisi vel puer sit, vel senex, vel macie cōsum-  
 ptus. In harum glandularū fine natura prudens  
 musculum tenuē posuit orbicularem, circulari-  
 bus fibris, qui vesicæ collū constringit, ne vrina  
 nobis inuitis exeat. Etenim nisi hic adesset mu-  
 sculus, in has singulas lotiū exire cerneret, quæ  
 admodum in quibusdam cōspicimus, quibus hic  
 musculus relaxatus est: & ut iis euenit, quibus  
 miseri empirici quidam, qui lapides euellere pro-  
 fitentur, transuersum dictum musculum inci-  
 dere: qui, cum huius situm prorsus ignorent,  
 hunc nolentes secant, & pro morbo morbum in-  
 ducunt: nam quibus hic musculus præcisus est,  
 semper vrina exit, numquam colligitur. Quam-  
 obrem femoralia vrina aspersa, fœtentiæque ha-  
 bent semper, quo nihil quicquam fœdius dici, ex-  
 cogitarique potest. Adeo ut plana videas ab hoc

musculo detineri urinam, qui, cum micere volu-  
 mus, relaxatur, atque ita lotium exit: hic muscu-  
 lus & in mulieribus etiam reperitur, quāuis as-  
 sistentes glandulas non habeant.

## De musculis ani. CAP. XXVII.

**A**Nō tres musculi contigere, ex quibus v-  
 nus orbicularis est, qui sphincter appellatur  
 in extremo recti intestini positus: hic latus po-  
 nitur,

tius, quam crassus dici meretur: fibris transuersis constat, & cū cute admodum vnitur, a coccyge ligamenti mutuo acceptis. Eodem munere fungitur, quo fungi vesica musculus diximus: facies scilicet hic detinet, ne nobis inuitis exeant, ut ille urinam. Reliqui duo lati quidem sunt, sed subtiles: cumque ab ossis sacri ligamento, atq; ab ilio initium sumpserint, in partem sphincteris superiore terminantur: hoc usu a natura producti sunt, ut rectū intestinū sursum trahāt, si forte quibusdam conatibus, ut quādoque sit, in excernendo exierit.

bicularis recti  
intestini  
sphincter dī  
ctus.

Duo reliqui  
recti inte-  
stini muscu-  
li, eorumq;  
usus.

### De musculis femur mouentibus.

#### CAPVT XXVIII.

**C**VM Gal. in lib. de Usu Part. diffuse satis loquatur, quo pacto fiat deambulatio; ego abs huius rei tractatione nunc vestra pace lubens ab-  
stinebo. Dico itaque femur & flecti, & extendi, & in orbē agi, intro, forasq; ferri: & ut breui omnia complectar, femur vndequaq; verti. Decem vero sunt musculi, a quib. mouetur: iique magni satis, propterea quod cū mēbrum tum crassum, tū ob-  
lōgum mouendum esset, validis musculis opus e-  
rat, a quibus hoc efficeretur. Ex his primus ille est musculus, qui nates constituit, satis crassus, car-  
nosus: exoritur a dimidia ossis ilium appendice, ab osse sacro, coccygeque. Principium huic latum est, & semicirculare, sed ita semper arctatur, ut tandem in acutum desinat. Desinit au-

Musculi fe-  
moris.

Femoris  
motus.

Musculi fe-  
mur mouē-  
tes decem  
sunt.

Primus mu-  
sculus fe-  
mur mouēs  
nates cōstituit.



Secūdus fe-  
moris mus-  
culus.

Tertius fe-  
moris mus-  
culus.

Quartus fe-  
moris mus-  
culus.

Quintus fe-  
moris mus-  
culus lum-  
balis.

tem in maiorem τροχαντήρα, & adhuc inferius in femur, per latum autem tendinem coxendicis articulum supereminet. Secundi femoris musculi maior pars sub primo latet, liuetque: oritur a tota ilij appendice carnosā, semicircularique origine, eundem articulum superequitat, & in tendinem latum, & validum finit summo magno trochanteri adhaerescens, quem & amplectitur. Tertius vero totus sub secundo latitat, linidus & ipse, carnosoque, & semicirculari initio, ut de secundo dictum proxime est, exit ab osse ilij, & quemadmodum de duobus aliis diximus, in progressu imminuitur in tendinē desinens, quo magno trochanteri adnectitur, sed in summitate illius interiore, ubi is nonnihil inuertitur. Vfus horum triū musculorum est, ut femur extendat, sursum attrahant, & ad exteriora ducāt. Quartus est obliquo situ: oritur autē a tribus inferioribus ossibus sacri dicti ossis, principio carnosō, quod & teres videtur: finis ipsius est in tendinem teretem, quo in apicem maioris trochanteris, posteriora versus desinit, femurque ad se trahit, & eius circumactioni auxilio est. Quintus musculus lumbalis est in abdomine situs, teres quidem sed carnosus, & crassus, & validus: situs eius aliquantulum obliquus est: totus liuet. Initium vero sumit ab undecima, duodecimaq; thoracis vertebra a tribus superioribus lumborum, quae corpus vertebrarum est, descendit supra pubis os. & in

& in teretem tendinem finem habet, qui in minorem trochantera inseritur. At sextus ossis ilij cōcauam internam partem uniuersam occupat: oritur a tota illius appendice, positus est in abdomine principio semicirculari, descendit supra os pubis: totus carneus est, itaque fere ad eius extremum progreditur, ubi in tendinem degenerat, qui in minorem trochantera implantatur. Vsus tum quinti, tum huius quem nunc memorauimus, est, ut femur flectant. Septimus exit ab osse pubis iuxta ipsius cartilagine[m] lata origine, situmque obliquo: desinit tandem in interius femur sub minori trochantere, exiguo tendine: eius utilitas est, ut femur unum versus aliud trahat, & femur femori superimponat, si quis recte cōsideret: non autem flectendi causa, quemadmodum in hoc deceptus voluit Vesalius. Octauo musculo femoris, qui Gal. Vesalioque est quintus: nullus in humano corpore maior est, tāta fibrarum varietate refertus, ut si quis decipere cupiat, non docere, tres, quatuorve musculos pro hoc ostendere facile possit. Oritur ab osse pubis parte nimirum eius interna, & a coxendice minorem trochantera amplectitur: deorsumque tendit, femori adhaerescens sua illa oblonga, aspera[m]que linea, posteriora carnosā. Tandem tendinem efficit, qui quidem in caput femoris interius inseritur. Dīcti musculi vsus est femur erigendi: neque hac utilitas paruipendenda est, huius enim munere

Sextus femoris muscululus.

Septimus femoris muscululus.

Octauus femoris muscululus omnium musculorum maximus.

femur erigimus: femoris autem rectitudine a brutis animantibus differimus: nam nos erecti incedere possumus: illa vero in terram prona perambulant. Ad hanc utilitatem illud in super accedit, quod octavi huius musculi beneficio septimo auxilium prestetur: ut femur femori, cum volumus, superimponamus. Nonus totum illud foramen occupat, quod in osse pubis, & coxendice positum est exteriori in parte. Principium eius latum, carnosumque est: exteriorem partem versus incedit, transversus manet, & semper arctatur: adeo ut in satis validum tendinem tandem tendat, qui tendo desinit in cavitatem quandam in maiori trochantere positam. Decimus, & ultimus femoris musculus interiore in parte est, dictamque foramen ipse quoque occupat. Musculus hic non modo aspernandus non est, sed est summopere animadvertendus: admirabilis enim est, & in quo summi opificis providentiam contemplari licet. Nam carnosus oritur, latusque, ut supra de nono memoravi, quinque ab intrus ad extra feratur supra coxendicem, ubi cavitatis ad trochleæ imaginem efformata: hic musculus, cum sibi incessus flexendus est, tres sepe tendines efficit, quandoque quatuor, & quinque: qui postremo uniuertur, unumque tendinem dumtaxat numerum perpulchrum constituunt, cuius terminus in posteriore maioris trochantæris parte sistitur. Sed hoc, queso, priusquam ab hoc muscu-



musculo discedimus, animaduertite, quod est pulcherrimum. Quum primum tendinescit, tendinisque substantiam sapere videtur: natura statim prudentissima carneum marsupium parauit de industria, in quo tendinē hūc collocat, ut tutus incedat, neq; ab ossis duritie ullo pacto ladata-  
tur: quod os ab hoc musculo amplectitur. Nō defunt, qui carneū marsupiū, quod diximus ad decimi musculi, cū tendinescit, propugnaculū paratū, musculū peculiarem a dicto seiunctū esse contendunt: Quod mihi nullo pacto probatur, cum decimi musculi portionem esse plane perspiciam.

Marsupium  
carneum.

De musculis tibiam mouentibus.

CAPVT. XXIX.

**T**IBIA flectitur, extenditurque secundum rectitudinem, quemadmodum palam cer-  
nitur: mouetur etiam oblique versus exteriora, licet obscurus sit motus iste. Quamobrem Vesalius deceptus, qui motum hunc obliquum pernegat. Hi motus, quos dixi, a decem musculis perficiuntur, quorum quinque flectunt, quatuor extendunt, vnus vero dumtaxat sub poplite latitans oblique mouet. Ex his primus tum neruosus, tum carnosus ab interiori appendice ossis ilij exoritur. Idem tamen deinceps carneus euadit, & fasciam præ se fert: oblique incedit per femoris interiora delatus: cum autem ad internum caput femoris peruenit, procedit, & in neruosum finit tendinem, sed qui vere non est teres

Tibia.  
Musculi ti-  
biæ.

Tibiæ mo-  
tus a decem  
fiunt mu-  
sculis.

Primus ti-  
biæ muscu-  
lus.

(ut Vesalius autumat) sed latior: finit vero in anteriorem tibiā. Hunc musculum voluit Gal. tibiā supra tibiā deferre: ut pueri ludentes, facere consueverunt, quod falsum est, si de homine intellexit: quamquam in simia verum esse deprehendatur: nam hic musculus in simia, vel in media tibiā desinit. Secundus tibiā musculus e-

Secūdus ti-  
biā muscu-  
lus.

naſcitur ab anteriore parte oſis pubis prope cartilaginem, initiumq. illius latum est, iuxta lōgitudinem commiſſurae oſis pubis, carnosus deſcendit, rectis fibris; ſit teres apud internum femoris caput, & in nerueum tendinem deſinit, qui peneſt teres: tamen deinde dilatatur, & terminus eius est in anteriore tibiā parte, quam ἀντινέμιοι

Tertius ti-  
biā muscu-  
lus.

Galenus vocauit, penes primo loco dictum musculum. Tertius vero ab infima coxendicis appendice nerueo principio oritur, lōgo, & tereti: deinde circa mediū femur carnosus efficitur, sed multiplicibus fibris, deſertur per poſterius femur, quum primum autem ad genu peruenit, tendinem nerueum efficit, quo in poſteriolem, sed in-

Quartus ti-  
biā muscu-  
lus.

teriolem tibiā implantatur. Quartus ab eodem loco oritur prope tertium, verum eius origo tum carnea, tum neruea est, deorſumque tantum non teres exiſtit. Inceſſus vero est per poſterius femur, fibris conſtat rectis: prope genu in nerueum tendinem exit, qui priuſquam finiatur dila-

Quintus ti-  
biā muscu-  
lus.

tatur: finitq. tandem parte tibiā anteriore inter primum, ac ſecundum. Quinti origo est appen-

dic

dice coxendicis penes exortum tertij, quarti-  
que, eaq; acuta primo, deinde fit crassior, & pro-  
greditur per posterius quidem, sed exterius fe-  
mur: quum vero medium illius attingit, notatu  
dignam carnis molem sibi asciscit a medio femo-  
re enascentem, quam forte aliquis musculus v-  
num censeret, sed profecto non est ea caro distin-  
ctus musculus a quinto quem describimus. Ta-  
men si cui posthac libuerit dictam carneā quin-  
ti musculi partem pro nouo musculo numerare,  
quem alij non animaduenterint, ut aliquid ad-  
notasse, videri possit: id per me sibi liceat, mihi  
sat sit, quid ingenue sentiam, admonuisse. Hoc  
eodem in loco extrinsecus incipit in tendinem  
degenerare, qui cum ea carne, quam dixi, una in  
finem usque descendit, in termino ipsius in capi-  
te fibulae collocato. Si vero petas causam, quamo-  
brem natura illā carnis portionem huic musculo  
affixerit: ego dicam propterea factū esse, ut mu-  
sculus validior efficeretur, voluit, ut e medio fe-  
more exiliret, ut illi magis proxima esset: nam in  
extrinseca parte vnicus hic dumtaxat adest mu-  
sculus, cum interius quatuor adsint. Vfus horum  
quinq; musculorum est, ut tibiā flectant. Illud  
autem scire operapretium est, hunc musculum,  
quē nos, ut ordine cuncta distinguamus, quin-  
tum esse diximus, a Galeno & Vesalio pro quar-  
to tibiae musculo connumerari: hic ille est muscu-  
lus, quē Galenus ait inuisse, ut cursori cuidā adi-

Quinq; pti-  
morū mu-  
sculorū ti-  
biæ vsus.  
Quintus in  
ordine ti-  
biæ muscu-  
lus pro qua-  
to a Vesalio  
annumera-  
tur.



meretur, quo adempto cursor nihilominus velocius currere poterat. Quares profecto Galeno medica artis principe ( Hippocratem semper excipio ) indigna non esse non potest. Nam si hunc musculum, quem exterius solum esse diximus, demas e crure, flexionem rectam efficere nullo pacto poteris: at in cursu rectam fieri flexionem Galenus admonuit secundo de administ. Anat. Immo vero oppositum re ipsa comperi: saucios scilicet in hoc musculo, quem nos quintum, Galenus quartum vocavit, neque magno vulnere, qui licet in sanitatem redacti essent, non sine labore tibiam flectebant. Quod si Galenus de uno ex intrinsecis quatuor intellexisset, ego ne verbum quidem de hac re fecissem: quippe qui maxime omnium a contradicendo principibus in arte viris abhorreã. Vos obsecro, qui nostra hac qualiacumque legitis: huius musculi magnitudinẽ considerate: usum illius animadvertite: & Galenum in hoc longe decipi facile indicabitis. Flexionis musculis absolutis, reliquum est, ut ad musculos tibiam extendentes deveniamus, qui quatuor numero sunt. Sextus igitur tibia musculus (iã enim quing, absoluiimus) dignus est, quẽ diligenter consideres, & admireris. Oritur e media appendicẽ ilium ossis: principium illius tum nervæum est, tum carneum, brevis quidem est musculus, sed tamen crassiusculus, & maiori trochanteri coniungitur: ibi eius caro desinit, sed tendo latus,

extus tibi  
musculus.

Tendo sexti.

mem-

membranosus, nervosusque sequitur, quo tendi-  
ne maiore in uniuerso corpore nullū videbis, am-  
plectitur omnes fere musculos, qui circum femur  
positi sunt, recta sunt illius fibrae: tendo quē dixi,  
maxima est nobilitatis, propterea chirurgi animū  
aduertant, ne illum transuerse secent: rotulam  
genu complectitur, & in anteriorem partem ti-  
biae, fibulaque tandem inseritur. Septimus exit e  
magno trochantere, principio nerueo: & totum  
trochantera circumdat: femori adhærescit supe-  
rius, & exterius: crassus admodum est hic mu-  
sculus, totusq; liuidus, ad patellam usq; carnosus  
rectis fibris progreditur, deinde in latum, mem-  
branosumque tendinem desinit, qui patellam cō-  
plectitur. Octauus nervosus emergit e cernice fe-  
moris, & a magno trochantere, quasi duab. cōstet  
originib. sed immediate fit carnosus, femori ad-  
hærescit, progressus illius est anterior, & interior;  
carnosus ut dixi, ad patellā usq; progreditur, va-  
riis fibris: finis eius est tendo, qui genu & ipse  
cōplectitur. Nonus vero oriū habet ab anterio-  
re parte ossis iliū supra articulū coxendicis: egres-  
sus huius musculi acutus, nerueusq; primo est: de-  
inde fit carnosus, & teres: figura est huius muscu-  
li, qua musculum esse decet: rectus enim incedit  
supra anterius femur inter septimum octauum-  
que musculum, priusquam ad genu perueniat, tē-  
dinem gignit nerueum, validum, qui ex angustō  
fit latior, coitq; cum septimi, & octani tēdinibus;

bis muscu-  
li omnium  
tendinum  
maximus.

Septimus  
tibiae mu-  
sculus.

Octauus ti-  
biae muscu-  
lus.

Nonus ti-  
biae muscu-  
lus.

Musculi tibiae recta extendentes.

Galenus error.

Decimus tibiae musculus.

Pes extremus.  
Musculi extremi pedis  
12. seu 13.

Unag. patellā amplexantur, ac in anteriore tibiā suis finibus inseruntur. Quatuor hi musculi, quos proxime memorauimus, tibiā per rectam lineam extendunt: veluti ab aliis quing. recta quoque linea flectebantur, quicquid Gal. de horum usu dixerit tertio de Usu Part. qui ita in hoc deceptus est, quia eadem in ea sententia, qua a coxendice quatuor musculos exoriri opinabatur: cum re ipsa (si de homine loquamur) tres dumtaxat exeant a coxendice. Decimus sub poplite latitans, origine neruea, teretiq. emanat ab externo femoris capite, extra sub ligamento delatus: postea vero carnem naturā induit, situ est obliquo fibris obliquis, & carnosus in posteriorem, anterioremq. tibiā implantatur. Hic musculus tibiā oblique mouet versus exteriora, licet hoc Vesal. inficietur, qui hunc musculum in genu articulatione minus quā recte perpendit: laxa etenim est: & quauis velit ipse articulationes illas per ginglymum recta dumtaxat flectere, & extendere, agere praeter ea nihil: ego tamen affirmo ab hoc occultato musculo, quem verbis descripsi, tibiā oblique moueri. De musculis extremo pedi deferuiētibus, qui in tibia siti sunt. CAP. XXX.

**E**XTRIMVS pes flectitur, extenditur, moueturque ad latera suorum musculorum adminiculo, qui in posteriores, & anteriores diuiduntur. sunt vero numero duodecim, vel summū tredecim. Primus emergit ab interno capite femoris



femoris supra genu retro, carnosus quidem incipit, & angustus, verum progrediens dilatatur, & circa mediā tibiā plus minus in tendinem cessat latum, ac nerueum, qui postmodum semper angustus efficitur, & in posteriorem, superioremque calcē desinit. Secundus priori similis est: nam etsi exeat ab extremo femoris capite, in reliquis tamen eadem agit quæ prior, ideo ut unus dumtaxat musculus esse videatur duobus principii: nam corpus unum est, tendo unus. Quod si illud me euitare posse considerem, ne hoc lectorum mētes perplexas haberet: equidem hos duos musculos unum solum musculum esse profiterer. Hi duo musculi, quos in unum cogere merito possemus, ventrem tibiæ posteriorem construunt, quam suram appellemus. Tertio occurrit musculus exiguus, ipse quoque exorians ab externa capite femoris prope articulum: sui exitus initio acutus est: deinde in ventrem prominet, brevis est, sed in tendinem teretem, atque nerueum desinit, quo tendine inter teretes longior in humano corpore non inuenies: latet hic musculus sub duobus, quos antea diximus. Situm habet obliquum, obliquas quoque fibras. A parte externa internam versus progreditur, tendini supradictorum adharens, eademque interno calci implantatur: eius usus est pedem in interiora euertendi. Hic musculus in simiis latum tendinem producit, ut Galeno placuit, at in no-

Primus pedis extremi musculus.

Secundus pedis musculus.

Musc. surā cōstruentes. Tertius tibiæ musculi.

Tendo longissimus humani corporis.

Quartus ti-  
biæ muscu-  
lus.

Tendo quar-  
ti tibiæ mu-  
sculi est o-  
mnium ro-  
bustissimus.  
Musculi pe-  
dem exten-  
dentes.

Quintus ti-  
biæ muscu-  
lus.

Sextus tibiæ  
musculus.

bis in calcem cessat. Quartus maior est tibia musculus, linetque; nascitur sub appendice fibula a posteriori parte: principio nerueo, & valido, postea carnosus euadit, & fibula adheret tibiaque latitudinē ossa excedit. Quum vero mediam tibiā attigerit, tum in angustum tendit, & versus calcem in tendinem terminatur, quo nullus omnino robustior in homine inuenitur: qui tendo cum priorum tendine vnitur, & in posteriore calce desinit. Munus primi, secundi, & quarti est pedem extendēdi, in terramque figendi, cui rei tamen quatuor alij musculi auxiliares copias subministrant. Cum Hec̃tor raptaretur hoc tendine vinctus fuisse dicatur, necesse est: nuncque indies videmus lanios integra bruta hoc tendine suspēsa in macello proponere, quæ res huius tendinis robur maximum testatur. Quintus a tibia, & a fibula originem ducit: ligamentoque illi adherescit, quod tibiā & fibulā interiacet, anteriores musculos a posterioribus seiungēs. Carnosum conspicies fere ad extremam tibiā, prope internum malleolum desinit in robustum, nerueum, & teretem tendinem: incedit tum sub interno malleolo, tum sub naviculari dicto osse; deum sub planta pedis in tarso moritur: hoc visu natura hunc musculum genuit: ut pedem versus interiora trahat: neque ligamenti expers existit. Sextus a posteriore tibia effluit longo exortu, & carnosus, etsi postmodum in tendinem

nem teretem degeneret, incedit sub interno malleolo: & sub calce ligamento prae ditum est ab appendice tibiae exorto. Diuiditur dictus tendo sub planta in quatuor tendines teretes, perforatos, qui procedunt, donec in tertium articulum quatuor digitorum, pollice excepto, inserantur. Utilitas non mediocris est: nam quatuor digitos flectunt, eosdemque valide adstringunt. Septimus vero longus, carnosusq; inchoat a fibula emergens sub appendice spatio trium digitorum, ut nunc loquuntur: carnosus est, donec ad calcem perueniat ubi in tendinem teretem commutatur, qui sub ligamento, sub malleolo, sub planta praeterlabitur, & in os pollicis inseritur, quod flectit. Haecenus de posterioribus musculis extremi pedis verba facimus: nunc de anterioribus loquamur. Ex his primus a tibia egreditur, id est, ab appendice penes fibulam, ipsique admodum adheret: satisque crassus est, & hisce anterioribus maior existit. Vbi mediam tibiae longitudinem praeteriit, angustus redditur, desinitque in tendinem teretem, nerueum, & validum, cuius incessus est per superiorem tarsum, detinetur a ligamento, quod emanat ab appendice inferiore tibiae, fibulaeque. Hic ille est tendo: qui adeo attollitur, itaque euidentis est sub pelle: finis eius est in osse pedis pollicis praeposito. Usus est extremum pedem flectendi. Secundus exit acuto initio ab appendice tibiae, adheretque ligamento, quod

Pedis perforati tendines.

Tendines quatuor digitos pedis flectentes.

Primus musculus anterioris pedis.

Tendo in pede sub pelle apparens.

Tendo extremum pedem flectens. Secundus musculus anterioris pedis.



tibiam, fibulamque interiacere diximus: deinde fibula ipsi ad finem ipsius fere, carnosus quidem est huiusce musculi radix: veruntamen in quatuor teretes tendines desinit, qui detinentur sub eo ligamento, quod a tibia, & fibula appendice exoritur. Quatuor hi tendines ampliantur, po-

**Tendines superiores quatuor digitorum pedis.** *stremaque in omnium digitorum superiorem partem inferuntur: pollicem hic quoque excipio: usus est, ut digitos illos extendant. Tertius a media fibula carnosus exilit prope ligamentum: deinde in tendinem teretē degenerat, qui sub transverso idem ligamento defertur, & in ultimum pollicis articulum inseritur, quem & extendit: hic tendo in duos diuiditur, quorum alter finem habet, ut dixi, alter vero inseritur in os pedis, pedique flectendo auxilium prestat. Secundus hic tendo a musculo quoque oritur, quæ portio in quibusdam, raris tamen hominum corporibus, alius*

**Musculus pedis qui tertius decimus annumeratur.** *musculus videtur esse. Ego tamen unum solum muscolum dicerem: licet non magnopere agretulerim, si cui hunc duorum muscularum locum habere videatur: tunc duodecim, quos diximus, tertius decimus addetur, itaque ut initio huius capitis attigimus, tredecim erunt numero, secundum quosdam, musculi extremo pedi deseruietes. Quartus nascitur ab appendice superiori fibule versus exteriora: et si quis omnia ad viuum refecaret, musculus hic neque posterioribus, neque anterioribus adnumerandus esse videretur.*

*Sed*

Sed ut ne lectoribus obscuritatis tenebras offundamus, inter anteriores adnumerabitur. Ex ortu carneo, neruoque constat, sit carnosus deinde: postremo exit in teretem tendinem, & sub planta suis finibus in pedij ossa immittitur, hic musculus pedem ad exteriora euertit, & ligamento constat transversali. Quintus & ipse a fibula prorumpit exortu oblongo, exterius carnosus est, quemadmodum de quarto diximus: itemq. sub externo malleolo incedit, ubi unà cum quarto in tendinem teretem finit, qui in os pedij inseritur, quod minimo digito preponitur: pes exteriora versus ab hoc musculo trahitur. Illud est in super animaduertendum, licet ex his musculis omnibus dixerimus pedem vel extendi, vel flecti, vel intro, vel foras ferri: nihilominus, si omnes unà conueniant, atque in una actione concurrant, tunc idem ab hisce omnibus humi affigetur.

De musculis in extremo pede positis.

## CAP. XXXI.

**M**USCULI positi in extremo pede sunt decem & octo, qui omnes digitis deseruiunt, quāuis quatuor alios supra descripsimus, quorum alios flectere, alios extendere monuimus. Ita vides quo pacto musculi, qui pedis digitis famulantur, sint viginti duo. Primus igitur ex his decem & octo propositis, sub media planta iacet, initio sumpto a parte calcis inferiore, id est, ab eius appendice, superstat huic tendo la-

Musculus  
ad exteriora  
pedē euer-  
tens.

Quintus an-  
terioris pe-  
dis muscu-  
lus.

Quo pacto  
humipes af-  
figatur.

Musculi ex-  
tremi pedis  
digitis deser-  
uietes sunt  
18.

Musculi di-  
gitis pedum  
famulantes  
sunt viginti  
duo.

Primus mu-  
sculus pedis  
digitis inset-  
uitas.

tus, quē (ut supra admonui) Galenus existimauit oriri a tertio musculo, qui a nobis inter posteriores tibiae tertius, a Galeno quartus numeratur lib. de Dissect. muscul. Huic principium nervosum, carneumque contigit: sub pedij osse diuiditur, & in quatuor tendines teretes perforatosque euadit, qui in secundum articulum quatuor digitorum inseruntur, mirabile dictu, visu vero admirabilius. Quis enim obsecro, incredibilem opificis nostri prouidentiam non admiretur, atque suspiciat, cum in vno musculo tot, tantaque contemplari possit? Vsus est flectendi secundum articulum illorum digitorum, quos dixi. latus, qui huic musculo superstat tendo, sensus est acerrimus, tanto vero sensu dedita opera a natura donatus est, ut quam citissime externas iniurias persentiret. Aiunt quidam plantam propterea depilem esse: quod ego falsum crediderim, cum lepori non desit hic tendo, cuius planta nihilo secius pilis referta est. Secundus & ipse a calce prodit penes primum, sed interiore ipsius parte, teres fere existit, ossi pedij quod pollicis praefertur, colligatur, tendinemque producit, quo in pollicem implantatur: hoc usu fabrefactus est, ut pollicem ab aliis digitis abducatur. Tertius quoque ab eodem calce exoritur prope primum: iter ipsius est exteriorē partem versus, & ossi pedij minimo digito praeposito affigitur, ubi processum illius videre est: deinde sunt tandem tendinosa substantia in eundem minimum

Quatuor  
Perforati tē  
dines, & eo-  
rum vsus.

Latus ten-  
do pedis a-  
cutissimi  
sensus.  
Plantā non  
esse depile  
tendinis la-  
ti causa.

Secundus  
pedis mu-  
sculus digi-  
tis inferuiens  
pollicem ab  
aliis digitis  
deducens.  
Tertius mu-  
sculus digi-  
tis pedis in-  
feruiens.  
Tendo ab-  
ducens mi-  
nimum

minimum



nimum digitum, abdicatq. illum a reliquis. Cum  
 ab his tribus discesseris, sequuntur alij quatuor,  
 qui sub pedis planta tibi occurrunt sub ossibus pe-  
 dij; quorum exortus emanat a tendinibus mu-  
 sculi perforantis, qui in tertio articulo quatuor  
 digitorum cessat: sed hi muscoli cum parui, tere-  
 tesq. sint carnis portionem sibi admovent, quam  
 a calce mutuo accipiunt. De his musculis Galenus  
 & Vesalius scribunt, usum horum esse, ut qua-  
 tuor digitos a pollice diuellat: quoniam desinunt  
 in quatuor tendines teretes, ac nerueos, qui proce-  
 dunt per externam partem quatuor digitorum,  
 & alligantur tendini superiori, quem extendere  
 diximus: progrediuntur autem usque ad extre-  
 mos digitos: neq. desinunt in primo articulo, quē-  
 admodum hoc in loco voluit Vesalius, qui in hoc  
 parum diligens fuit, cum his musculis obliquum  
 dumtaxat motum concedat. Sed scitote lectores  
 candidissimi, meum esse inuentum hoc, neq. quē-  
 quam ex his, qui de Anatome ante nos scripse-  
 re, hunc usum agnouisse. Non enim mouent hi  
 muscoli obliquo motu, sed quatuor digitos vere  
 extendunt: atque ita extendunt, ut ab his magis  
 extendantur, quam ab aliis tendinibus: ut sensu  
 oculorum a quouis in secundo perito deprehendi  
 facile potest. Post hos decem sequuntur muscoli in  
 plantae ossibus: nam singulis digitis bini muscoli  
 inditi sunt, qui ab initio pedij proficiscuntur, si-  
 nemq. habent in primo articulo omnium quin-

pedis digitum  
 ab aliis.

Quatuor  
 musculi pe-  
 dis digitis  
 inferuientes.

Musculus  
 perforans.

Quatuor  
 musculorū  
 quatuor pe-  
 dis digitos  
 extendentiū  
 vsus non a-  
 liis cogni-  
 tus.

Decem mu-  
 sculi singu-  
 lis digitis pe-  
 dis bini in-  
 seruientes.

Postremus  
musculus  
pedis.

Decimi o-  
ctavi pedis  
musculi v-  
fus.

que digitorum, carnosius sunt, itaq; a natura effor-  
mati, ut flexioni promptius obtemperaret: quocir-  
ca agunt, quando bini vnâ mouent eodem tempore  
cum vero alter ex his dumtaxat agit, digitos ob-  
lique trahunt intro, & extra. Postremus muscu-  
lus extremo in pede positus, id est, decimus octa-  
uus positus supra tarsum & pedion, ortum duci-  
a ligamento, quod tibiâ, & fibulam cum ped-  
connectit. Est musculus latus, & subtilis desinens  
in quinque tendines, nonnumquam in quatuor  
inseritur in omnes digitos externa in parte, digi-  
tos mouet oblique ipsos extendens.

De musculis, qui cubito deseruiunt.

CAPVT XXXII.

Cubitus.

Musculi eu-  
bito serui-  
tes.

Musculi cu-  
biti duo  
sunt exten-  
dentes, &  
totidem fle-  
ctentes.  
Primus mu-  
sculus subi-  
eum flectes.

**C**VBITVS flectitur, & extenditur recte  
quidquid Galeno videatur de motu obliquo  
quem numquam in homine inuenies: neq; ego ha-  
de re lōgo sermone cōtra Gal. disputabo, cum sen-  
sui pateat cubitum recte extendi, flectiq; & obli-  
qui motus prorsus experte esse: quod cum mihi in-  
mentem venit, non possum satis mirari, quo pa-  
cto Galenus vir aliqui diligentissimus rem adeo  
absurdam, atq; a veritate abhorrentem affirmar-  
uerit, cum in se ipso periculum facere nullo nego-  
tio potuisset. Musculi flectentes duo sunt, toti-  
demque extendentes. Primus musculus est vali-  
dus, qui sub cute conspicitur: & vulgo ab Italia  
dicitur Ilpescetto: situs est in parte humeri inte-  
riore: exoritur a scapula duobus initiis distanti-  
bus.

us, quorum alterum nerueum est, ac teres, quod riginem ducit a parte suprema supercilij acetabuli, quod in scapula cernitur. Incedit supra caput humeri, & per illam rimam praterlabitur, uae sita est in hac parte superiori, quam rimam natura huius tendinis gratia sinxit. Alterum uero huius musculi initium egreditur ab ancyroide rocessu, qui partim nerueus est, partim carnosus: arnsa uero pro humero adhaerescit, uideturque triuentibus distinctus musculus, & separatus, ui humero opẽ præstet illũ uersus pectus trahẽs. Deinde hæc duæ origines dicti musculi sub capite umeri uniuntur, & musculũ crassum efformant ropemodũ teretem, validũ, fibris rectis cõstan-ẽ, qui apud cubiti articulum in tendinẽ nerue- m cessat: qui dũ fini proximus est, dilatatur, ra- ior, annectitur, ubi is tuberculũ internum ha- et ob insertionem huius musculi fabrefactum. Secundus exit ab osse humeri carnosus totus, fi- risque rectis, sub priore latitat, carnosus defer- ur supra cubiti articulum, & in cubitum, ac ra- ium insigitur. Horum duorum musculorum u- litas est, ut cubitum recte flectant. Tertius e- apula prodit parumper sub illius ceruice: per hu- eri posteriora deferitur, tendineque constat su- ra lato: carnosus suo cum tendine in ὠλέκρον ex- endit: atque illud etiam praterit: fibræ eius sunt ectæ. Quartus duobus initiis exit a ceruice umeri, cui multum adhaeret, & cum tertio ad-

Secundus cu-  
bitum fle-  
ctens muscu-  
lus.

Tertius cu-  
biti muscu-  
lus.

Quartus  
cubiti mu-  
sculus.



**Tertij** ac **quarti** mus-  
culi cubiti  
vñsus.  
modum unitur, adeo ut tertius cum quarto v-  
nus solus musculus videatur multiplici origine  
cōstans: tamē duo reuera sunt. Demum hic quar-  
tus musculus ibi desinit, ubi tertium desinere dixi-  
m<sup>o</sup>: fibras rectas habet. Munus amborum, tertij  
inquam & quarti, est cubitum recte flectendi.

De musculis summā manū mouentibus.

## CAPVT XXXIII.

**Manus.**

**M**ANVS (ut Aristoteles & Galenus inquit)  
organum est organorum: eiusque structura  
admirabilis est summum artificium præ se ferēs  
Hanc Deus Opt. Max. homini concessit, ut huius  
ope omnes artes exercere, seg. ab externis iniuriis  
tueri posset: de qua cum Galenus vir eloquentissi-  
mus tā longo processu primo de vsu Part. loquun-  
tus fuerit, hoc argumentum lubens præteribo. E-  
**Musculima** num mo-  
uentes.  
go de summa manu mouentibus musculis postre-  
mo loco verba facturus sum hanc vnā ob cau-  
sam; quod, cum illorum compago miraculi instar  
esse videatur, in calce de his loquēdum existima-  
ui: ut memoriæ magis inhaereat, quæ in libri calce  
leguntur. Cum autem Galenus qui & ipse mirā  
hanc compagem vidit, & animaduertit, statim  
**Quare in** in initio rem hanc tractauerit: non iniuria quis  
calce de ex-  
tremā ma-  
nus muscu-  
lis dedita o-  
perā tracta-  
uit.  
stimetis me in finem hanc materiam reiecisse,  
quod illius oblitus fuerim, ut Galeno cōtingit libere  
de vsu Part. De musculis femoris, quos obliuio  
ne pra-

re prateriit, sed ut superius attigi, dedita opera  
 actenus distuli, ut res pulcherrima, & maxime  
 utiles, lectorum mentibus magis harerent. Im-  
 mo vero consulo, ut dum publice in scholis secan-  
 tur corpora, hic ordo seruetur: nā hi musculi diu-  
 ius incorrupti perseverant, tum quod, dū viui-  
 nus, hos musculos magis exerceamus, tum quod  
 minus pinguedinis cōtineant. Hos musculos Ga-  
 eni more in internos, & externos diuidam, ut  
 os, qui pedem mouent supra diuisi. Interni octo  
 ſunt, de quibus prius agemus: nouem externi. In-  
 teriorum summa manus musculorū primus per-  
 legans est: exoritur ab apice interni tuberculi,  
 quod est in humero, exortu acuto, neruoque: de-  
 inde carnosus euadit, & paruus, musculique ve-  
 tam formam refert: nam illi caput paruum est,  
 venter latus, cauda (ut ita dicam) longa & an-  
 gusta vsq; ad brachiale: hic musculus parū obliq;  
 versus manum incedit, defertur per medium cu-  
 bitum retro magis, quam sit longitudinis cubiti  
 medietas: desinit autem in tēdinem teretem, at-  
 que oblongum, qui supra ligamentum brachialis  
 internum ambulat, quo pratergresso tendo latus  
 efficitur, qui per volam extenditur, relictis tamē  
 nobis mōtibus maioribus detectis: postremo in  
 quatuor digitos inseritur. Ver<sup>o</sup> vsus hui<sup>9</sup> musculi  
 est digitis flectendis auxiliari, & ut acuto sit sen-  
 su. Ergo si quid nocuum nobis manum constrin-  
 gentibus occurrat, id dictum, ac factum abiici-

Musculi ex-  
 tremā ma-  
 nus in inter-  
 nos, & exter-  
 nos, diui-  
 duntur.  
 Musculi ma-  
 nus interni  
 sunt octo.  
 Primus mu-  
 sculus ma-  
 nus inte-  
 rior.

Vola:

Primi mu-  
 sculi inte-  
 rioris ma-  
 nus vsus:

Latrones ca-  
rent vt plu-  
rimum pri-  
mo interio-  
re musculo  
manus.

mus priusquam lasio procedat, non autem est vo-  
sus, vt vola depilis fiat, quemadmodū aliqui vo-  
luere: obseruauī in quibusdam furibus, ac latro-  
nibus magni nominis ob praecleara ipsorum faci-  
nora, eos hoc musculo caruisse, licet tendo adesset,  
qui exortum ducit a ligamento brachialis inter-  
no. Hoc primum Patanij obseruauī in illustri fu-  
re Cotola dicto, dum Anatomen publice profite-  
rer. Idem Pisis animaduerti in Tympanista Cer-  
taldensi, si recte memini, & superioribus anni.  
Roma idem vidi, & spectatores admonui in pres-  
bytero Lucensi, qui furum Rex merito diceba-  
tur, & propterea aureo torque, diadema gestan-  
tium aureum suspensus est, vt suarū praeclearissimarū  
virtutum premia cerneret, antequam ex ha-  
bita migraret: exēploq; suo alios ad furtā allice-  
ret, qui furum regem viderent in tantum hono-

Secundus  
muscul<sup>o</sup> in-  
terior ma-  
nus.

rem. Secundus egreditur ab interno tuberculo  
humeri, principio in acutum tendente, tum ner-  
ueo, tum carneo, cubito adhaeret, & per eius lon-  
gitudinē progreditur vsq; ad radicē brachialis  
puluinaris instar cubito praesto est: quā primum  
ad brachiale peruenit, in tēdinem degenerat, &  
in quartum os brachialis implantatur carneo, &

Tertius in-  
terior ma-  
nus muscu-  
lus.

nerueo fine. Tertio origo est ab eodem loco, & in-  
cessus obliquus iuxta radij longitudinē: cum ve-  
ro ad brachiale adueniat, in tendinem teretem  
& validū exit, qui inseritur in os illud post bra-  
chialis, quod indicē fulcit. Pisis duo musculi, cum

uterau



uterque agit, brachiali flectendo dicati sunt, id est, extrema manui, cum vero alter tantum agit, alique mouet nunc sursum, nunc deorsum, duobus amen musculus opem ferēs, qui in exteriori parte siti sunt. Quartus musculus exortum habet admirabilem: nerueus etenim acutusque nascitur ab interno humeri tuberculo, carnosus postmodum fit: & iuxta cubiti, radiique longitudinem deferatur: ubi medium cubitum prateriit, in angustum endit, terminaturque in quatuor tendines teretes, nerueos, ac perforatos: qui sub ligamento brachialis deferuntur, sub quo tamē tres primi musculi non deferuntur: terminum habent hi tendines in secundo articulo quatuor digitorum, quos flectunt: & quoniam tendinibus quinti musculi, ad tertium articulum quatuor digitorum penetrandum erat, propterea natura hos perforauit, qui neruei sunt, pulchri, pellucidi: resque est & spectanda, & admiranda: hoc autem natura sagax effecit, ut digiti ordine quodam sese consequeretur. Quintus musculus quarto multo validior est, neque mirum: quoniam huic maior etiam motus futurus erat, maiorisque momenti. Etenim quatuor digitos flectit, non quinque ut Gal. lib. de Usu Part. primoque de Anatom. admissit. & lib. de Musc. voluit, quos & optime constringit: nascitur prope quartum, sed maiori parte a superiore, interioreque cubito: latet sub quarto, arctatur pedetentim, & cubito adhærescit, ante-

Quartus  
manus inter-  
ior muscu-  
lus.

Tendines  
manus per-  
forati.

Quintus  
manus mi-  
sculus inte-  
rior.

Quatuor  
manus ten-  
dines perfo-  
rantes.

quā ad brachiale perueniat exit demum in qua-  
tuor teretes, nerueosq; tendines, & perforantes,  
qui deniq; inseruntur in tertiū articulū quatuor  
digitorum, pollice excepto: tametsi Gal. primo de  
Administ. Anatom. vnum ex huius musculi  
tendinibus ad pollicem tendere dixerit. Quod  
tamen verum esse in simiis deprehenditur, in ho-  
minibus nequaquam. Nam hominis pollex a pro-  
prio musculo flectitur, quem mox describemus.  
Quintus hic musculus (vt ad illum redeamus)  
haeret ligamento, quod diuidit musculos antero-  
res a posterioribus, quemadmodum in tibia. Sex-

Sextus ma-  
nus interior  
musculus.

tus oritur a radio, ligamentoq; illi adhaeret, quoa-  
interiores ab exterioribus musculis seiungit: per  
radij longitudinem iter habet: prope brachiale  
desinit in tendinem teretem, & nerueum, qui  
transit sub copula carpi, vna cū quarti, & quin-  
ti musculi tendinibus: deinde in vltimum polli-

Septimus  
manus inte-  
rior muscu-  
lus.

cis articulum inseritur quē flectit. Septimus car-  
nosus emergit ab interno tuberculo humeri, &  
a superiore, interioreq; cubito, obliquus repit, &  
in media longitudine radij terminum eius vide-  
bis partim carneū, partim nerueum, fibris obli-  
quis cōstat. Octauus musculus quadratus est, po-

Octauus  
manus inte-  
rior muscu-  
lus.

Musculi ra-  
diū in pro-  
nū vertētes.

situs prope brachiale, carnosus exoritur a cubito:  
& carnosus item in radium desinit: fibras trās-  
uersas habet situmq; transuersum. Munus du-  
orum musculorū, quos supra memorauī, septimū  
inquam, & octauū, est radium in pronū vertēdi.

De musculis externis, qui manui famulantur. CAP. XXXIII.

Musculi manus externi.

EX his qui primo occurrit carnosus, & nervus: prodit ab externo humeri tuberculo: & inde carnem induit, & crassescit, inter cubitū, & radius incedit, donec ad brachiale accedat: nunc in quatuor, nunc in tres tendines teretes, & nervos tendit, qui per sinum pertranscunt, qui est in appendice radij: colligantur vero ab uno ex iis ligamentis, qui a dicta appendice oriuntur. Hi tendines, quos dixi, procedendo lati evadunt: & finiuntur a primo usque ad tertium articulum quatuor digitorum, id est, in indice, medio, anulari atq. auriculari. Quum vero tribus tantum tendinibus praeitus est, auricularē digitorum tendinum expertē demittit: sed frequentius quatuor tendinib. munitū inuenies hūc musculū, quā tribus: qui tendines usq. ad extremos digitos sub unguib. progrediuntur: neq. tamē eorum radicib. inseruntur: atque hac illa causa est, quam obrem tantus dolor excitetur, si quid carnem, & ungues intercedat, ut vetus est verbū: sed dolor carnē, & ungues non interiacet, sed inter tendines, carnemq. Idem sit ab aliis tendinibus extendentibus. Atque hoc a nobis primo scito fuisse animaduersum. Usus huius musculi est, ut quatuor digitos extendat. Secundus ab eodem tuberculo emergit prope primū principio acuto, nervoq. defertur inter primum, & cubitū iuxta eius lon-

Primus manus externus musculus.

Primus manus exterior musculus mittit tendines ad tres tantū medios digitos.

Causa doloris ingentis in solutione continui inter carnem & ungues aliis ignota.

Secundus manus interior musculus.



Musculus  
minimum  
manus digi-  
tum a cate-  
ris deducēs.  
Tertius ma-  
nus exterior  
musculus.

Tendo ma-  
nus bifidus.  
Quartus  
manus ex-  
terior mu-  
sculus.

Quintus  
manus ex-  
terior mu-  
sculus.

gitudinem, & versus brachiale. Terminatur au-  
tem in tendinem teretem, nerueumque, qui non-  
numquam bifidus est: desertur supra brachiale  
inter radium, & cubitum: inseritur in minimū  
digitum usq; ad extremum eius. Hic musculus est  
admodū teres, eius usus est minimū digitum a re-  
liquis abducendi, nobisque vsui est non mediocri  
ad palmam gignendam. Tertius carnosus prodit  
medio cubito plus minus, quo loco cubito inest li-  
nea oblonga, & aspera, facta ut tribus musculis  
exortum daret. situs huius musculi tertij obli-  
quus est: terminus eius est tendo teres, qui in in-  
dicem inseritur, ut indicet, id est, indicē oblique  
extendat: at tendo, quem dixi, a radij appendice  
ligamentum sortitur: atque hic tendo bifidus est  
in nonnullis. Quartus principio carneo a cubito  
egreditur penes tertium, qui & ipse est obliquus:  
desertur supra radij appendicem: desinit in tere-  
tem tendinem nerueum: inseritur in tertium ar-  
ticulum pollicis, quem extendit, atque ab aliis  
multum abducit: hoc enim usu constructus fuit.  
Quintus profilit ab eadem cubiti linea prope  
quartum, longo carneog principio, cuius progres-  
sus obliquus est pollicē versus: hic musculus va-  
rias habet inscriptiones, & in varios tendines  
desinit. Quamobrem, si quis ex multiplici mu-  
sculorum numero voluptatem perciperet, ( ut  
cōplures hoc ingenio sunt ) posset ex hoc vno mu-  
sculo tres aut quatuor efficere: sed profecto, ( ut  
libere

libere dicam quod sentio) unus mihi musculus videtur esse, qui supra musculum bicornem defertur: dehiscit vero in quatuor, & quandoq; in quinque tendines, quorum unus ad tertium pollicis articulum procedit, alius ad secundum, alius ad primum, quartus ad os brachialis, quo pollex fulcitur: & nonnumquam hoc loco prater predictos tendines alij duo inueniuntur. *Usus est extendendi pollicem.* Sextus ortum ducit a radice externi tuberculi humeri: cubito cōnectitur, quē & amplexatur, & per eius longitudinem perrepat: quum vero ad carpum peruenit, degenerat in tendinem teretem, nerueum, & validum, qui defertur supra cubiti appendicem in sinum quēdam iuxta styloidem (est autem stylois cubiti processus) ab hac suum ligamentum suscipit, quod transversum est, inseritur deinde in os illud post-brachialis, quod minimum digitum sustinet, & non multo procula brachiali. Septimus, quem bicornem appellant, carnosus longa linea ab inferiori humero supra articulum oritur: & supra radium repit: circa medium radij desinit in tendinem validum, crassum, bifidumque, cui propterea bicornis nomen impositum fuit: qui postquam supra brachiale iter fecit, inseritur in ossa post-brachialis, a quibus index, & medius fulcuntur. Hi duo muscoli, quos proxime dixi, extremam manum extendunt, vel ita dicamus, brachiale tunc extendunt, cum uterque operatur.

Musculus pollicē extendens.

Sextus manus exterior musculus.

Stylois processus.

Septimus manus exterior musculus.

Tendo bifidus, & bicornis dictus.

Musculi extremā manum extendentes.

**Motus manus sursum & deorsum** Motus manus in orbem. Cum vero septimus una cum secundo ex interioribus agunt, aliis duobus cedentibus, manum oblique deorsum ferunt: at sexto una cum tertio ex interioribus mouente, tunc manus sursum oblique fertur: atque hic primarius est eius usus: secundarius autem extremam manum, vel carpum circumuertendi: quem motum edunt, quando ita cōueniunt, ut unus alium immediate in agendo subsequatur: quāuis hic usus ab aliis prætermisus fuerit: propterea quod illis ignotus extiterit.

**Octauus** Octauus musculus cui nomen longissimus, qui proficiscitur ab humero, origine carnea, supra exterius tuberculum incedit supra radiū oblique, mēbranoque tendine in radij appendicē inseritur. Nonus prodit a copula, quæ cubitum humero connectit, & e superiori parte cubiti, quam ὀλίγα vocant, obliquus progreditur, totus carneus est, immittitur in mediū radiū. Hi duo musculi manū supinā reddunt: mouētque radium exterius. De musculis in extrema manu positis.

## CAPVT XXXV.

**MUSCULI** extrema manus sunt unus & viginti, neque plures unquam, pauciores tamen aliquando sunt, decem scilicet & nouem, quorū septem (si uniuersi essent viginti, & unus) pollicis deseruiunt: si nouem & decē, quinque dumtaxat: minimo digito quatuor famulatur, reliquorum vero unicuique tres opes ferunt, v-

Prim<sup>o</sup> extre- nusq. lato tendini. Primus est musculus paruus, trans-



transuersus, supra Veneris montem positus, a membrana carnosâ exoricens fibris carnosissimâ refer-  
tus est, & inseritur in tendinem latum, quem ut dilatet, constructus fuit: hunc musculum animadu-  
uertas: nam neque ex veteribus quisquam, neque Vesalius hunc musculum nouit. Quatuor alij sequuntur  
longiusculi, graciles, teretes, qui egrediuntur a tendinibus quinti musculi interioris, qui flectit ter-  
tium articulum quatuor digitorum. Hi positi sunt in vola, penes primum quatuor digitorum articulum  
Desinunt autem in teretem & nerueum tendinem, & per internos digitos delati iuxta eorum longi-  
tudinem, adhaerescunt tendinibus primi musculi ex-  
terioris, a quibus quatuor digiti extendebantur, & in tertium articulum suis finibus immittuntur, non  
autem in primum, quemadmodum Galenus & Vesalius voluere, qui musculos quidem cognouere, sed il-  
lorum insertionem, & usum ignorarunt: nam inquit abduci ab his quatuor digitos, pollicem versus. Ego  
vero assero ab his ipsis, licet in interiore parte positis, nihilotenus quatuor digitos extendi, melius  
quam a priore exteriorum, vel tantumdem, quemadmodum in sectione deprehenditur. Interius au-  
tem situm fuere, eo quod natura periculum imminens eorum viderit, qui exterius sunt. Unde saepe  
euenit, ut exterioribus digitorum tendinibus incisis, digiti adhuc extendantur. Quod cum accidit medicis quibusdam Anatomicae artis ignaris,  
ususque priuatum horum quatuor musculorum se

ma manus  
musculus  
scriptoribus  
ignotus.  
Veneris  
mons.

Quatuor  
extremae  
manus mus-  
culi.

Gal. & Vesa-  
lij incisitia.

Musculi  
quatuor ma-  
nus digitos  
extendentes.

Sextus ex-  
tremæ ma-  
nus muscu-  
lus;

Metacar-  
pion.

Musculus  
auriculare  
digitum ab  
aliis abdu-  
cens.

Septimus  
extremæ  
manus mu-  
sculus.

Octavus ex-  
tremæ ma-  
nus muscu-  
lus.

Nonus ex-  
tremæ ma-  
nus muscu-  
lus.

Musculi  
Martis mō-  
tū dictū cō-  
stituentes.

mire efferunt, quippe quibus miraculi instar illi-  
us vulneris curatio successisse videatur. Sextus  
exit a ligamento brachialis, & a quarto in super-  
osse eiusdem. Venerisq; montē constituit: per infe-  
riorem metacarpj partē progreditur, est fere te-  
res, in tēdinem finit, qui in primū os auricularis  
digiti implātur. Eius vsus est, ut paucis absol-  
uā, hunc digitū ab aliis abducendi. Septimus ori-  
tur a brachiali, positus est in superiori parte, mu-  
sculose est carnosus totus, & in secundū os pollicis  
desinit. Octavus prope septimum emergit carno-  
sus & ipse, volam versus positus est, tendine per-  
exiguo inseritur in secundū os pollicis. Nonus sub  
septimo oritur ab eodē carpi ligamēto, totus car-  
neus est, & in primū articulum pollicis finem ha-  
bet. Hi tres muscoli eam carnosam pollicis partē  
constituunt, quā Chiromantiam profitentes mō-  
tem Martis appellant: trahunt pollicem versus  
ipsorum originē. Tres alijs sequuntur, qui prodeunt  
ab ossibus post brachialis indicem medium, & a-  
nulare fulciētibus: situ obliquo sunt, vel trans-  
uerso potius, sibi sub linea vitali dicta: hi desinunt  
in secundum pollicis articulum: principium vero  
illorum semicirculare est. De his tribus dico ego,  
posse quempiam eos unum duntaxat musculum  
dicere, quod lato esset principio, sine acuto, fi-  
brifq; variis esset intertextus. Sed ne data opera  
toties a Vesalio dissentire videar, ego quoque tres  
esse aio: licet tamen cuique per me hos tres unum  
dice-

dicere: horum, vel huius usus est pollicem flecten-  
 di volam versus: aliorum vero triū, quos antea  
 memorauimus, munus est eundem extendendi,  
 & procul ab aliis efferendi. Septimus pollicis mu-  
 sculus scaturit ab osse metacarpū, cui ossi index in-  
 nititur, spatiumque illud occupat, quod est inter  
 pollicē, indicemq;: transuersum situm obtinuit,  
 & in os pollicis inseritur: partes huius musculi  
 sunt hæ, ut pollicem versus indicē trahat, atque  
 indici superponat. Octo insuper alij musculi præ-  
 ter dictos inueniuntur ab ossibus postbrachialis  
 exorti, illisq; adherentes, qui in primos articulos  
 quatuor digitorum demū insertionem habēt. Ex  
 hisce musculis duo unicuiq; digito cōtigere, præ-  
 ter pollicem, in quem nemo ex his octo inseritur.  
 Usus eorum est, cum duo ex his agunt, simul, ut  
 primum articulum, in quo inseruntur, recte fle-  
 ctant. Sed cū vnus dumtaxat agit: motum obli-  
 quum efficiunt flectendo. Hos musculos fate-  
 tur Galenus ingenue primo de Anat. ad-  
 ministr. se diu ignorasse, & tandem  
 in eorum cognitionem  
 deuenisse.

Musculi pol-  
 licē flecten-  
 tes, extēde-  
 tes ac ab a-  
 liis efferen-  
 tes.

Septimus  
 pollicis mu-  
 sculus.

Musculus  
 pollicē ver-  
 sus indicem  
 trahēs, illi-  
 que super-  
 ponens.

Octo alij  
 musculi ma-  
 nus digitus  
 inseruiētes,  
 quorū nul-  
 lus datur  
 pollici.

Musculi ma-  
 nus digitos  
 & recta, &  
 oblique fle-  
 ctentes.



REALDI COLUMBI  
CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA,

Liber VI.

## DE IECORE, ET VENIS.

Iecur, seu  
hepar.Iecur pri-  
mum om-  
niū mēbro-  
rum in ani-  
mali gene-  
rati.Iecoris situs  
Iecoris liga-  
menta duo.

ECUR, siue Hepar inter principes nostri corporis partes adnumerari nemo sana mentis ambigit. Sed illud scitu dignum est, iecur primum esse membrum, quod in nobis gignatur. Cum primum enim nata est umbilicalis vena, illi tum primum hepar adhaerescit. Situm est autem in dextro abdominis latere sub mendosis costis, quo loco duobus ligamentis adnectitur, quorum alterum circa cauam est venam, alterum suspensorium dicitur, a quadā ortum diuisione, in qua vena umbilicalis inscribitur. Hac itaque septo transuerso affigunt iecur, quo quamquam in dextro sit latere (ut iam dictum est) nihilo secius magnā quoque sinistri partē occupat, ubi validi ligamenti ope diaphragmati connectitur. Si hepatis figuram queris, tantum non exacte sphaerica est, & in homine integrum existit, non in lobos diuisum, ut Galeno placuit,

Hominis iecur non diuisum in lobos.  
Gal. error.

licet

licet illius modi in quadrupedibus reperias. Causa vero quamobrem in nobis integrum in illis diuisum sit hepar, ea est, quod cum recta figura a Deo Opt. Max. donati simus, causa sui parte ventriculi immediate tegit: nam a dextra in sinistram tegens, vniuersam anteriorem regionem occupauit, effecitq. ne ventriculus algeret. Quocirca qui cartilagini mucronata calida admouet vnguenta, existimantes oris ventriculi intemperiem frigidam, hisce praesidiis sublatum iri, viderint, quam prudenter id agant, iecoris praecolidi membri xiphoidi substrati feruorē adaugentes. Sed ad rem redeamus. Sectum fuit iecur quadrupedum in lobos complures, ut illorum ventriculum instar digitorum manus amplexarentur, quod si integrum esset, illis pronis incedentibus effici nullo pacto posset. In auibus autē, quippe quae recte potius stant, quam in terram sint pronae, in duas dumtaxat partes secatur. In homine igitur nusquam diuiditur iecur, nisi anteriore in parte, atque in extremo iecore: idque necesse fuit ob venam umbilicalem tantisper diuidi, ut illi aditum praeberet: sub hac, ubi vena porta exit, bina exiguaq. adsunt eminentiae, ne vena a vertebrarum corporibus comprimeretur, pernecessariae: has autem eminentias neq. lobos, neque fibras, neque pinnas dixeris. Habet hepar partes duas, exteriorem scilicet, & interiorem: gibba exterior est, & lauis, interior caua, & as-

Quare non  
strum iecur  
nondiuidas-  
tur.

Topica re-  
media car-  
tilagini mu-  
cronatae te-  
mere adhi-  
beri.

Quare qua-  
drupedibus  
animalibus  
diuisum ie-  
cur datū sit.

Auiū iecur  
in duas tan-  
tum partes  
secari.

Vnica diui-  
sio hepatis  
humani  
quare facta  
sit.

Eminentiae  
duae sub ca-  
ua vena.

*pera instar rupis: idque quoniam ei gibbus subest  
ventriculus: tenuissima peritonai membrana, in*

*quam sexta nervorum cerebri coniugationis ramulus inseritur, circumdatur hepar. Propterea  
superfici tenus non est sensus expers. Substantia  
eius nihil aliud est, quam concretus sanguis venis  
com pluribus, quibusdamq. arteriis intertextus:  
membrum est permagnum, & veluti in abdomi-  
ne rex: in hoc concupiscibilis virtus residet. A-  
liqui credidere ibi generari spiritus naturales,  
quam tamen sententiam non approbo, membrum  
que est sanguificationi dicatum: neque enim san-  
guis alibi gignitur, quicquid de corde scripserit  
Peripateticorum princeps Aristot. Est igitur ie-  
cur omnium venarum caput, fons, origo, & ra-  
dix: huius caua parte vena oritur ~~sed exiit a~~  
Graecis, quam portam Latini dicunt, quae cum  
vena umbilicali continua est, licet Vesalio secus  
videatur esse. Porta itaque venae radices caua in  
parte iecoris per illius substantiam vario dissemi-  
nantur, quae crassae sunt satis, praesertim quo ad  
tunicam attinet, & in unam dumtaxat venam  
tandem coeunt, atque crassum truncum consti-  
tuunt: quae posteaquam inter exiguas illas emi-  
nentias integra exiit, quas magnus Hippocrates  
portas appellavit, in multos ramos sub ventricu-  
lo diuiditur, quorum primum ad superiorem mit-  
tis ventriculum: cuius rami pars eius longitudi-  
nem perreptat: alius vero orificium eius superius am-  
plexatur*

Membrana  
iecur inue-  
stiens, cuius  
merito ie-  
cur sentit.  
Qua sit ie-  
coris sub-  
stantia.  
Concupisci-  
bilis virtus  
in iecore.  
Naturales  
spiritus in  
iecore non  
gigni.  
Sanguinem  
in iecore ta-  
tum, & non  
in corde co-  
tra Arist. sen-  
tentiam gi-  
gni.  
Iecur san-  
guinis fons.  
Venae porte  
origo.  
Fallax Vesa-  
lij opinio.  
Porta venae  
ab Hipp. ap-  
pellata.  
Primus ve-  
nae porte ra-  
mus ad su-  
perio-rem  
ventriculū  
defertur.



plexatur corona in morem. Idcirco coronalis hæc Coronalis vena.  
 vena dicta est. Secundus portæ ramus inferiore Secundus venæ portæ ramus, qui ad inferiore ventriculū defertur.  
 ventriculū petit, ibique per eius longitudinem Ventriculū non nutriri chylo, sed sanguine.  
 secatur. Huc vero missi hi venarū rami, ut illo-  
 rum sanguine ventriculus nutriretur: neque e-  
 nim nutriri chylo posset umquam ventriculus,  
 quod crassus nimium existat, omneque excremē-  
 torum genus in se contineat: excrementis autem  
 ali nulla pars corporis potest, lienem tantum ex-  
 cipio, qui atrabilario humore alitur. Tertius por-  
 tæ ramus ad omentum alendum pergit, ibique  
 varie scinditur. Quartus ad lienem se confert,  
 ut sanguinem melancholicum ab hepate ad ipsum  
 deferat, estq; ramus satis insignis, & sub ventri-  
 culo fluit, quo loco natura multas illi glandulas  
 substrauit, easque vnā, ne corpora vertebrarum  
 attingeret neve hic comprimeretur, sursum at-  
 tollitur, splenisq; longitudinem secat, eamque in-  
 greditur. Ab hac autem vena alia exoritur ex-  
 igua in aliquibus, in aliis maior, atque adhuc in  
 aliis maior: hæc superius vētriculi oriscium ver-  
 sus scandit, atque hic finem habet. Illud sciēdum,  
 hanc quandoque adeo in alium nō ascendere. V-  
 sus eius est, ut humore acidū suscipiat, qui in lie-  
 ne gignitur, dum nutritur, atq; huc demādat, ut  
 in nobis famem excitet, quo cibum capiamus,  
 cuius multis sæpe, magnisque negotiis præpe-  
 diti obliuisceremur. Quocirca quibus vena hæc  
 exigua est, hi facilius in mediam ferunt, quibus

Lienem tā-  
 tum excre-  
 mentis ali,  
 aliam vero  
 partem nul-  
 lam.

Tertius ve-  
 nę portæ ra-  
 mus ad o-  
 mentum.

Quartus ve-  
 nę portæ ra-  
 mus ad lie-  
 nem.

Vena ab lie-  
 ne ad vētri-  
 culum hu-  
 morem aci-  
 dum ad fa-  
 mem exci-  
 tandam de-  
 ferens.

Quamobrā  
 aliqui faci-

tius aliqui  
difficilius  
famem fe-  
rant.

Qui pro  
diuturno  
re fame in  
syncopé in-  
cidant.

Quintus ve-  
næ porta  
ramus ad  
intestinum  
colon.

Sextus ra-  
mus omniū  
maximus  
gracilia in-  
testina.

Septimus  
ad rectum  
intestinum.

Singulas ve-  
nas cauita-  
tem intesti-

norum in-  
gredientes  
singulismē-

branis ope-  
riētibus esse  
præditas in

extremita-  
tibus.

Quod ne-  
mo adhuc  
cognouit.

Quid sit  
chylus.

vero maior, minus ferunt. Immo nonnullos in-  
uenias, qui si edendi tempus, quamuis minimo  
intervallo prætereant, in syncopem incidunt.

Quintus portæ ramus ad intestinum colon de-  
mittitur. Sextus, qui omnium est maximus, ad  
intestina gracilia. Septimus ad rectum intestinum:

atque hi præcipui sunt venæ portæ rami. Ex qui-  
bus tres illi, quos ad intestina ferri diximus, cum  
in mesenterium peruenere, in mesaraicas dictas

venas innumeras, ac pene infinitas scinduntur,  
quæ intestina non modo amplectuntur, sed etiam  
ad internam usque cavitatem perforant: quo lo-

co natura sagax extrema unicuique harum mem-  
branam apposuit, qualem in vesicæ cavitatem ex-

tremis vteris apposuit: quæ loio ad vesicam  
descendenti aditum præbent, prohibentque ne ad

superiora amplius reuertatur. Idem in extremi-  
tate harum mesaraicarum, quas innumeras di-

ximus, effecit natura. Quod a nemine, quod sci-  
am, adhuc animaduersum est: licet omnes uno

ore dicant factas fuisse mesaraicas, ut chylum  
ab intestinis exurgeret: in eo tamen parum diligētes

fuere, quod finem earum persequi neglexerint: ut  
magna naturæ industriā facile perspiceret: quātā

scilicet arte effecerit, ut hæc venæ chylum facile sus-  
cipere possent: ne autem egrediatur, membranu-

la illa prohibent. Est autem chylus conuersio cibi,  
potiusque in materiam lacti persimilem, qui post-  
eaquam ventriculum prætergressus est, per inte-

stinorum

Pinorum anfractus traditus descendit, donec ex-  
 surgant quidquid est succi plenum. Et quoniam  
 huic muneri neque quatuor, neque decem vena-  
 sat erant, eas natura innumerabiles genuit, atq;  
 hæ in superioribus intestinis multo ampliores, ac  
 frequentiores existunt. descendentes autem sen-  
 tim rariores, minoresque euadunt. neg enim tan-  
 ta erat in ultimis intestinis necessitas, quoniam  
 chylus in faces, (hoc est in durum excrementum)  
 iam redactus erat. Adhuc describendus est ra-  
 mus alius, qui tamen inter venæ portæ ramos cõ-  
 numeratur, at ab eo originem ducit, qui lienem di-  
 cutur, qui parte laua per mesenterion descendens  
 extremum rectum intestinum petit, venasque  
 gignit hemorrhoidales, quibus dumtaxat potest  
 a melancholico humore vindicari. Atque hæc de  
 venæ portæ origine, atque descriptione sat sunt.  
 Usus vero tum venæ portæ, tum ramorum eius  
 est, ut chylum ad iecoris concavum deferat, ac  
 per eius substantiam dispergat, ut ab ea coquatur,  
 & in rubrum sanguinem, qualis ipsa est, cõverta-  
 tur: qua in cõctione duo gignuntur excrementa,  
 bilis inquam tum citrina, tum atra. Ex quibus  
 flava bilis, cum sit igni similis, a vesicula, quæ in  
 iecoris concavo natura locauit, suscepta est; sed  
 melancholicus succus per quartum ramum de-  
 missus est ad lienem, ut nutriatur. Et quamuis  
 ob chylum deferendum hæ venæ genitæ sint, ta-  
 men fuit alius insuper usus non minus neces-

Quo pacto  
 chyli distri-  
 butio fiat.

Quateven-  
 in superio-  
 ribus intesti-  
 nis plures,  
 ac maiores  
 constitutæ  
 sint.

Hemor-  
 rhoidales  
 venæ.

Venæ por-  
 tæ, eiusq; ra-  
 morum usus  
 est chylum ad  
 iecoris ca-  
 uum deferre.

Bilis vtrius-  
 que genera-  
 tio, & sepa-  
 ratio.

Venarum du-  
 plex usus.



Quæ venæ sanguificandi virtute careant. Gal. error.

Omne alteras in suis colorum alterandum alterat. Omnia cibaria a ventriculo alba reddi.

Testes sanguinem cōuertūt in album semē. Mammillas commutare sanguinem in lac. Vena cōcaua chyli, & magna dicta.

sarius, ut sanguinem scilicet deferrent, qui mensenterio, ventriculo, intestinis, omentoq; alendis esset. Sed illud adnotes velim, hisce venis sanguificandi virtutem nequaquam adesse, ut Galeno placuit quarto de Usu Part. mea autem sententia is facile subscribet, qui tenuem venarum tunicā, albamque substantiam diligenter animaduertent. Quo enim pacto sua ipsarum tenuitate, atq; albedine chylum albū, crassumq; in rubrum, tenuemque sanguinem verterent, cum praesertim illud natura comparatum sit, ut vnumquodque corporis nostri membrum, quum aliquid cōuertit, in sui ipsius colorem, transmutet? Idcirco ventriculus, licet alba, rubra, flaua, viridiaq;, & aliorum colorum dapes esitemus, nihilominus in colorem vnum, eumq; cādidissimum omnia cōuertit, idque propterea quod is est substantia sua color. Ita in testibus conspicaberis, qui rubrū sanguinem, quod albi sint, in album colorem cōuertunt: ita & mammilla sanguinem rubrum in album lac transmutant. In parte vero iecoris gibba, ubi maiorem, crassioremq; substantiam eius videre est, vena enascitur, quæ concava dicitur, chyli, magnaue: est enim aliarum omnium nostri corporis venarū mater: huic varia sunt radices crassæ, & magnæ, quæ in huius substantiā a summo ad imum inferuntur, quæ amplā, quam diximus, venam tandē constituunt, supra caput versus, infra ad pedes extenditur, & ut ita dicā, ramifica-

nificatur. Huic eidem vena fluminis quoque similitudo accommodatur: quemadmodum enim flumine riuulos manantes sæpe videmus; ita cō-  
 plures riuuli ab hac vena deriuantur, seu varij ab hoc truncorami, qui quidem per vniuersum corpus panduntur, vt sanguinem iam a iecore paratū, atq; elaboratū deferant. Nam vena nihil aliud sunt, quam vasa concaua ex tenui quadam substantia, conflata, vt sanguinē ad singula membra deferant, fabrefacta. nam sanguine alitur omnis pars nostri corporis. Sed ad rem redeamus. Hæc vena concaua dum supra iecur caput versus ascendit, transuersum septum perforat, quo loco distat a corporibus vertebrarum, eoque loco duas emittit venas, quæ in ramos scissæ per ipsū diaphragma distribuuntur. quod postquam effecit, vena caua immediate fere dextræ cordis auricula occurrens panditur, cum hac connectitur dextri cordis ventriculi orificium superficietibus vndiq; cōplexa, neque in illum intro fertur. Quo loco venam parit, quæ cor circūdat, rami-  
 ficatur, atq; illud coronæ instar amplexatur, propterea vena coronalis appellatur. Caua vena ascendens versus caput supra pulmonē scilicet fertur, ibiq; a vertebris distat, & supra cor non exiguo interuallo (non prope cor, vt Galeno visum est sc̃cūdo de Ratione vict. in acutis) a cor, id est, Venæ sine pari exortus.  
 venā sine pari, ac coniuge nuncupatā parit. Quæ quanuis in dextro sit latere, tamē e media parte,

Quid sit vena.

Omnes corporis partes sanguine aluntur.

Coronalis vena cordis.

Venæ sine pari exortus.

Venæ inter-  
costales.

siue ex centro concaua vena initiū sumit, quæ re-  
flectitur iuxta corpora vertebrarum, & vsq; ad  
extremum thoracem descendit, sed per interual-  
la costarum dextra, lauaq; suos mittit ramos ea-  
rum partium nutriendarum gratia: & licet in  
dextro sit latere truncus, tamen sub pulmone, æ-

Venæ a ve-  
na sine pari  
ad sinistru  
latus alen-  
dū demissæ.

sophago, magnaque arteria ramos ab eo trun-  
co exortos ad sinistram partem alendā dimittit.  
Ab eodem dextro trunco, dum reflecti incipit,  
ramus alius exit, qui sursum ascēdēs ramos mit-  
tit superioribus interuallis supremarum costarū

alendis dicatos, neq; solum in dextris, sed in sini-  
stris quædam, aliquos tamen excipio, sed per paucos,  
quibus sinistra parte ramulus adest ab axillari  
ortum ducēs, qui nunc ad duo, nūc ad tria costa-  
rum interualla, & quādoque ad vnum dum ta-

Venæ verte-  
bras ac spi-  
nalem me-  
dullā nutri-  
entes.

xat defertur. Ex hisce venis omnibus interual-  
la nutrientibus aliæ oriuntur vena, quæ inter  
vertebram, & vertebram ingrediuntur, ubi ad-  
sunt foramina ob neruorū exortū: alunt autē hæ  
vena spinalem medullam, & vertebrae: deinde  
foramē ingrediuntur, quod post vertebrarū cor-  
pus situm est. Ab his, antequā spinalem ingrediā-  
tur medullā, ut eā nutriant, ad dorsales muscu-  
los, & ad cutim venæ mittuntur. Supra venā si-  
ne pari, ascendit caua super asperam arteriā vsq;  
ad iugulum recta: atq; ibi duas magnas emittit

Axillares ve-  
næ.

venas axillares dictas, quod sub axillā transeāt,  
quæ thoracis cavitatem inter iugulum, & pri-  
mam



nam costam pratercunt. Deinde ex se venā pro-  
nit humeralem, vel cephalicam, & capitalem  
licetam; quæ tamen summum humerum non a-  
tendit: sed potius ad internam regionem defer-  
ur, inter primumq; & secundum humeri muscu-  
um transiens ad externa tendit, ibi superficia-  
ia efficitur: nam ubi membranā carnosam præ-  
erit, inter hanc, & cutim ad cubitum vergit,  
elata extrorsum prope primum musculum, qui  
ubitum flectit: apud cuius flexuram in duos ra-  
nos secatur, quorum alter internum cubitū pe-  
it, & ubi a flexura eius discessit, cum alio id ge-  
us basilica ramo unitur: ex quibus duab; fit ve-  
a communis vena: alter veroramus humeraria  
n externo cubito superius & exterius ramulos  
uidē multos propagat: sed tandē precipuus ra-  
nus super brachiale, extremamq; manum inter  
minimū digitum, & anularem tendit, atq; hīc  
liuissus ad utrūque digitum fertur ad summum  
sq; ipsorum. Hanc venam tum Arabes, tum qui  
raxim exercent, fere omnes saluatellam nuncu-  
ant; cuius sectionem in affectibus lienis mire a-  
unt prodesse. Sed quantū missio sanguinis e sal-  
uatella in splenis morbis auxiliari possit, ego sana-  
rentis lectori iudicandum relinquo. Posteaquā  
xillaris vena e cavitāte thoracis emer sit, & quā  
lixī, venam genuit, sub iugulo apud Ancyroi-  
lē scapula processum profunde immergitur, quō  
oco ramos complures profert qui primum brā-

Venæ cepha-  
lica, hume-  
ralis dicta  
origo.

Quo loco  
cephalica  
cum basili-  
ca uniat.  
Venæ com-  
munis vera  
constitutio.

Error Ara-  
bum de ve-  
næ saluarel-  
læ sectione  
in lienis af-  
fectibus.

Venarum  
in foeminis  
mammillas  
nutrientiū  
exortus.

Vena basi-  
lica, iecora-  
ria, hepatis  
caq; dicta,  
interna ab  
Hipp. appel-  
latur.

Vena com-  
munis qua-  
re dicta.

Mediana  
vena.

Prope hu-  
merariam  
venam mi-  
nime, verū  
prope basi-  
licam esse  
nerueum.

chij musculum enutrient, neque hunc solum, sed  
scapula secundum, secundum quoque thoracis  
quartumque & septimum humeri, & scapulari  
ipsam, & usque ad abdomē. Præter hos in foemi-  
nis alij rami ad mammillam alendam se conse-  
runt. Hæc axillaris vena ad humerum delata su-  
primo musculo cubitum flectēte, tres in venas  
atque illas insignes diuiditur, quarum vnā basi-  
licā dicunt iecorariā, hepaticā ve, Hippocrates cu-  
biti internam vocat: hæc, quam altius penetra-  
diximus, sit sensim superficiaria, & extremo hu-  
mero accedit: ac ubi cubitus flectitur, humerari-  
inftar in duos diuiditur ramos, quorū vnus in-  
terno cubito cum humeraria ramo vnitur: qu-  
loco efficitur communis vena: communem aut  
dicunt, quod vtriusque vena sit particeps: qui in-  
lam cōstituunt rami, mediana appellantur, que  
semper fere vulgo secant. Sed hīc animaduerten-  
dum est, prope humerariam, atque eius media-  
nam, neruum adesse nullum, quēadmodum pro-  
pe basilicam. Alius ramus & ipse per exteriorē  
rem parem diffunditur, varieque coniungitur  
nunc enim cum humeraria ramo: nunc cum cō-  
muni anastomosim efficiens: tandem vero supr-  
brachiale, postbrachialeque ramos mittit, tum  
ad medium, tum ad indicē. Alia superficiaria v-  
na, quæ communis appellatur, medio & intern-  
cubito oblique supra radiū fertur, varie scindi-  
tur, raturumque inter indicē, & pollicē, atque in-  
te

er indicem & medium mittit, ac in ipsorum fi-  
 ribus cessat. Hunc ramum in capitis affectibus  
 ecare consueuerunt. Aliarum vero duarum ma-  
 gnarum venarum axillarium, altera profunde  
 atis, quinque nervos subit: parumq; abest, quin  
 s humeri attingat: & ramulos emittit, qui duos  
 musculos cubitum flectentes alant; deinde deor-  
 um flectitur inter primum ac secundum muscu-  
 lum: & supra flexuram cum transiit, in tres seca-  
 ur ramos: atque hinc ad internos cubiti muscu-  
 los ramulos mandat: dein altius penetrans ad bra-  
 chiale inclinatur. Hi sub ligamento, ubi ad ma-  
 nus volam peruenire, surculos promunt iis mu-  
 sculis alēdis dicatos, qui in extrema sunt manu;  
 leinde singulis digitis venulas binas distribuūt,  
 qua a lateribus ad eorum extremitatem ferun-  
 tur. Alius autem ramus apud flexuram id li-  
 amētū prateriit, quod inter cubitū, ac radiū po-  
 situm est, & ad exteriores musculos distribuitur.  
 Alia axillaris medio humero plus minus reflecti-  
 tur ad posteriorem partem, ad duos musculos cu-  
 bitum extendentes ramos relegans. Postmodum  
 deorsum magis tendit ad musculum longissimū,  
 ad bicornem, nec non ad musculos, qui ab exter-  
 no humeri tuberculo ortum ducunt, atque inter  
 hos musculos disperditur. Eadem in regione sub  
 ugulo, ubi est ortus axillarium, quatuor tenues  
 venas exoriri videbis, easque descendentes, qua-  
 rum dua descendunt sub osse pectoris, a perti-

Venarum in ca-  
 pitis affe-  
 ctibus seca-  
 ri solita.

Duarum ma-  
 gnarum ve-  
 narum du-  
 ctus.

Quatuor  
 venarum ab a-  
 xillariū ve-  
 narum ex or-  
 tu ad abdo-  
 minis mu-  
 sculos ten-  
 dunt.



bus lateralibus penes costarum cartilaginem, deorsum vergunt, thoracemq; pratercuntes per rectos abdominis musculos descendunt, quæ in nonnullis mulieribus cum alia vena coniunguntur, quæ ex inferiore loco ad dictos musculos scendit. Hæ inter quartam, ac quintam costam numquam altius, nunc declinius descendentes exteriores in partem se conferunt, in viris anteriores musculos nutrientes, in feminis autem non modo ob hoc, sed ob lactis quoque generationem cum iugularibus mammarum dispergantur. Reliquæ duæ deorsum late supra cœcavum pulmonis iuxta mediastinum supraque pericardium feruntur unâ cum nervis duobus, qui ad tendinem diaphragmatis feruntur. Alius aliquantulum emergunt quatuor iugulares venæ: ex quibus binæ internæ sunt, externæ reliquæ. Externæ supra iugulum immediate pullulant venæ ad musculum *ερωπυδα* delatæ, & post scapulâ truncus per colli latera oblique assurgens ramulos mittit ad musculos capituli inseruientes, ac post occipitium sursum ad capituli cutem apud eam partem iugularis externa, quæ reliqua erat: supra inferiorem maxillam se effert ante masseterem, & oblique per mediam faciem fertur ad maiorem oculi angulum: quosdam etenim ramulos ad faciei musculos distribuit, in angulâ vero venam supra orbitam mittit, idque per musculû palpebrâ constringentem: & quod reliquum est, inter supercilia per frontem ad cutem

Venæ quæ in viris anteriores abdominis musculos alunt, in feminis vero etiam lac generant.

Venæ capituli musculis inseruientes, ac in reliquas capituli, ac faciei partes diffeminantes.

tem capitis ascendit. Illud adnotabis dextrā venam in quibusdam inter supercilia cum sinistra iungi, deinde rursus seiungi. Alia iugularis vena est satis insignis, quæ rursus attollitur versus caluaria basim per anteriora processu trāsverso vertebrarum colli penes asperam arteriam. Hæc, quā diximus, vena sub larynge ramū profert notatu dignum, cuius ramulis glandula musculiq; laryngis aluntur. Eadem vena sub inferiore maxilla varie diuiditur, tamen minor est diuisio huius cū accedit ad glandulas, quæ sunt sub aure, ad musculos hyoidis seruientes & ad linguā ipsam: idq; inferius. Medici iubent hanc secari in angina, reliquum venæ tum ad quævis distribuitur, tum ad eam tunicā, quæ os inuestit. Maior dictæ venæ truncus caluariam ingreditur per inæquale foramen, per quod sextum par nervorū cerebri descendit. Vbi vero ingressus est, ad posteriora conuertitur atq; in duram matrem immittitur. Verum suam secum tunicam portat, & per occipitium ad summum pene lambdalis futuræ ascendit: quo loco dextra cum sinistra iungitur, & qua dura mater duplex efficitur, a posteriore parte ad frontē ducitur parte suprema cerebri, in orbiculareq; foramen inseritur inter frontē & ethmoides sitū, parte capitis posteriore, ubi in unū venæ coibant, in duræ matris quadruplicatōe admittitur. Indeque duæ venæ per uniuersam superiorem ventriculorū longitudinem pro-

Venas super  
ciliarū in a-  
liquib. dex-  
teram cum  
sinistra iūgi,  
ac inuicem  
seiuungi.

Venæ iugu-  
laris verius  
caluariæ ba-  
sim proces-  
sus.

Venæ mu-  
sculos; glā-  
dulasq; la-  
ryngis nu-  
triens.

Venæ quæ in  
angina seca-  
tur.

Venæ quæ  
ad durā ma-  
trem inferi-  
tur.

Venæ cere-  
bri substan-  
tiā alere

**Linon, seu torcular.** *grediuntur, huiusce ramuli cerebri alunt substantiam. Quadruplicatio autem durae meningis, quam supra memoravi, & linon, & torcular appellatur, iacetque inter cerebrum, ac cerebellum.*

**Vena mirabilem sinu constituens.** *Vena vero per superiorem cerebri longitudinem vergens admirabilem sinum constituit, nam supra semicirculum praese fert, infra vero tres angulos habet, qui hoc in loco nunc paulo ampliores, nunc arctiores sunt. vario se modo diffundit, e-*

**Venarum in dura, ac tenuem membranam cerebri ramificatione, ac in cerebri substantiam ingressus.** *iusque ramis postquam duram membranam perforarunt, per tenuem lati nunc sursum, nunc deorsum variis modis per illam totam ramificantur, at ubi tenuem praetergressi sunt, ipsam substantiam cerebri ingrediuntur. quod dictum non dubito quin vobis nouum esse videatur, cum nemo istuc ipsum antea obseruauerit. Ego enim primus (absit verbo inuidia) obseruavi venas atque arterias cerebri substantiam introire. Sub hac substantia cerebri iugularis interna antequam cranium ingreditur, venulas per laterales partes ad musculos mittit temporales, in cranio vero ipso ad durae matris latera iuxta iugulum. Hac vena, venam aliam paruulam parit dum ascendit per transversos processus vertebrarum cervicis, ac ramulos emittit, qui cervicis musculos alant: ea in aliquibus ab axillari exoritur. Vbi vero inter cervicis vertebrae exeunt nervi, hac vena ad spinalem medullam ac vertebrae nutriendas properat: primam vertebrae eadem superequitat occipitium versus,*



versus, ubi foramē cernere est, quod ad auditus organum penetrat, eoque ingreditur, ut hoc organum omne nutriat. Ab hac iugulari interna omnia ossa capitis, maxillæ, tum superior, tum inferior dentesq; omnes nutriuntur. Quare nihil est quod alium venæ peculiarem ramū describendum expectes, qui dentes ipsos alat. Caua venæ, postquā sub diaphragmate ab hepate tanquā a proprio exiit fonte, corpori vertebrarū dextera partis adhaeret, quæ post exitum paulo infra hepatis venulam ex sese procreat, quæ partes ibi adiacentes alit, & varie scinditur. Postmodū truncus deorsum inclinans duas venas, quas emulgentes dicunt, parit, quæ in renes terminantur. hasce solas semper esse, caue existimes. In tres enim, quatuor etiam, & quinque nonnumquam diuisas esse comperies, licet hac de re scriptorum nullus adhuc meminerit. Sunt autem emulgentes tam in dextris, quam in sinistris. Galenus lōgo verborum apparatu causas reddit, quibus natura dextram sinistra altiore voluerit esse. Sed cum sensus cōtrarium prorsus attestetur, omnes illius rationes protinus corruant, necesse est, cum ingeniose potius, quam vera existant. Equidem in brutis animantibus situm emulgentium venarum homini contrarium deprehēdi, ita ut de brutis locutum fuisse Galenum tam perspicuum sit, quam quod maxime. Nos igitur hominis emulgētes venas describētes ita dicamus. A sini-

Venæ, capi-  
tis ossa, utrā  
q; maxillā,  
dentesque  
nutrientis,  
descriptio.  
Cauæ venæ  
ductus.

Venas emul-  
gētes in plu-  
res ramos  
scindi soli-  
tas a nemi-  
ne animad-  
uersum.

Galenū fru-  
stra in ratio-  
nib. inueni-  
endis de e-  
mulgētium  
situ laboras-  
se, quātum  
ad corpus  
humanum  
spectat.

**Emulgen-  
tiū venarū  
descriptio.  
Renū situs.** *strahitur parte caua vena sub ventriculo scat-  
rit vena ampla satis, & longa, emulgens dicta,  
qua supra vertebrarū corpus, arteriamq; aortā  
fertur, per mediumq; sinistrum renem fluit (est  
autem is in homine non parum dextro superior,  
& hoc ob lienis paruitatem) qua illi non obstat,  
cum iecoris magnitudo plus loci occupans dextrū  
renem cogat esse inferiorem: postea vero quam ad  
renē peruenit, eo, quo dictum est, pacto eius cor-  
pus ingreditur: ibi amplificatur, atque in ramos  
secatur, qui per renis substantiam distribuuntur.*

**Cribrū ab a  
liis fictū in  
renibus nō  
dari.  
Galeror.** *Noli tamen existimare confici ex his cribrum il-  
lud magni nominis, de quo Galenus tam multa,  
per quod lotium percolari existimabat: hoc vero  
dilatato sanguinem mingi. Hic naturamembra-  
nas apponere poterat, quemadmodum mesarai-  
cis, atque vtererum finibus: sed, quoniam hoc illi  
commodius visum est, ex ipsamet renis substan-  
tia quasdam eminentias procreauit, quae in di-  
ctos ramos ingressae, obstant, quominus sanguis,  
qui ad nares unā cum serosa parte deducitur,  
naturaliter delaberetur. Hoc tamen obser-  
uato, quod est pulcherrimum, cum natura la-  
pillis aliquis deorsum trudendus est, id plerum-  
que tanta vi fieri, ut magnam vim sangui-  
nis cum urina demittat: vsus harum venarum  
est, ut sanguinis serum, & pro renibus nutri-  
mentum deferant. Ab huius vena concauo vas  
oritur, vreter, id est, urinarius dictus, ut pro-*

**Quilapil-  
lus e renib.  
ad vesicā de-  
rudatur.**

**Emulgen-  
tiū vena-  
rum vsus.**

prio

prio loco fufius dicetur: oritur inquam in ipſius  
 renis corpore hic urinam ſuſcipit, & ad veſicam  
 fert. In dextra parte eadem emulges ſita eſt ſini-  
 ſtra inferior, & breuior multo: nam inter cauam  
 venam, & dextrum renē parum quid intereſt:  
 inferitur autem eo pacto, quo in ſiniſtra dictum  
 eſt. Oritur a ſiniſtra emulgente vena ſeminalis  
 nuncupata, quæ oblique ſub peritonaſcendēs  
 ſupra os pubis deducta in teſticulū inditur: quē-  
 admodū apertius explicabitur, ubi de partibus  
 genitalibus agemus: ſed interim diligēter adno-  
 ta ortum ſeminaria vena ab emulgente non eſſe,  
 ut humor ſeroſus ad ſiniſtrum teſticulum defer-  
 retur, quo maiorem in coitu voluptatem pareret,  
 ſicuti plerique Anatomici in hoc parum pru-  
 dentes credidere: ſed vera cauſa eſt ipſa vena ex-  
 iguitas, quæ ſi ex vena cauā corpore emerſiſſet,  
 ut dextra, quoniam illi ſupra arteriam trāſeun-  
 dum erat, periclitabatur, ne in magnis dilatatio-  
 nibus, ita ut ſit, diſrumperetur: quocirca pru-  
 dens natura non a corpore vena cauā, ſed a ſini-  
 ſtra emulgente ſiniſtra ſeminalis originem trahi  
 voluit: at ſub dextra emulgente apicis duorum  
 digitorum intervallo ab ipſo vena cauā fonte ef-  
 fluit vena ſeminalis dextera, quæ primo oblique  
 deſcendit: deinde ſub peritonaſcitur, deinde  
 ſuper os pubis: poſtremo in teſticulū deſinit: quod  
 in viris intelligas oportet: ſecus enim contingit  
 in mulieribus: licet enim origo ſit eadem, & ſiniſ-

Urinarium  
 vas vrecte  
 appellatur.

Vene ſemi-  
 nalis ortus

Falſa opi-  
 nio aliquo-  
 rum de ra-  
 tione ortus  
 ſeminariae  
 venae.

Quamobrē  
 non a cauā  
 vena, ſed a  
 ſiniſtra e-  
 mulgente  
 ſeminalis ſi-  
 niſtra oria-  
 tur. Dextrā ſe-  
 minalem a  
 cauā naſci.  
 Differentia  
 venarum ſe-  
 minaliū ia-  
 tervirum &  
 mulierum.



tamen longitudo non est tanta, neque summum ossis sacri praterfluit: & in abdomine cessat. Illud vero magis miraberis, sub seminali dextera ad quartam usque lumborum vertebrā nullam venam mitti ad superiora, sed ad inferiora dumtaxat. Aiecore namque ad hunc usque locum, inter vertebrae, ubi exeunt nerui, vena caua venas profert, quae tum spinalem medullam, tum vertebrarum corpus nutriant. Quum primum autē ad quartam vertebram lumborum caua pervenit, in duos insignes ramos diuiditur, qui oblique super os ilij, pubisq; delati ad dextrū, ac sinistrum crus iter habent. Aqua diuisione primo

Vena caua  
in quarta  
lumborum  
vertebra in  
duas scinditur  
partes.  
Distributio  
utriusque  
rami cauae  
venae ad inferiores  
partes.

vena satis magnae oriuntur, quae deorsum latae, primo versus anum se conferunt: ubi namque illa adhaesit ossi sacro, ramos per ipsius foramen transmittit ad spinalem medullam, ad ipsum os sacrum & ad musculos in lumbis sitos, qui ab hoc sacro originem ducunt, mittit in super ramos ad natium musculos qui femori deseruiunt. Ab iisdem ramis vena illa proficiuntur, quae in extremum rectum intestinum implantantur. Ab hac eadem vena prodeunt illae vena, quae ad vesicae latera proficiuntur, ut ipsam, musculosq; re-

Ex quo loco  
mēstrua  
egrediatur.

cto intestino deseruientes enutrient idque in viris nam in feminis petunt cervicis uteri principium, ex quo loco menstrua illis effluunt purgationes, ut latius capite de utero explicabim. Idē ramus, qui vesicam, uteri cervicem alit, & ipsa non-

nonnumquam principalis diuisio venam gignit, quæ descendit, deorsumque lata eo foramine excipitur, quod in osse pubis, coxendicisque collocatum est, & ad nonum decimumque muscolum femur circumagentes se recipit: ut eos nutriat: deinde ad septimum, deorsumque per internum femur spargitur, & terminum habet. Animaduertendum tamen est vasa seminaria in mulieribus non finiri in testium capite, sed deorsum effundi, ut matricis substantiam alant. Ab his venis ortum ducit umbilicalis vena, cui nostræ generationis exordia accepta ferenda sunt. Eadem vena caue diuisio duas parturit venas, dextram inquam, & sinistram, quæ sursum caput versus reflectuntur. Progressus earum est inter peritonæi diuisionem suprag, id sub rectis musculis ad secundam vsque ipsorum intersectionem in ramos, ac ramulos degenerantes distribuuntur, dictis musculis peritoneoque alimentum ferentes. Hæ sunt illæ venæ, quarum ope (ut magnus Hippocrates, & post eum Gal. scriptum reliquere) statutus est uteri cum mammis consensus in mulieribus, quas quandoque inuenies cum illis duabus venis vniri, quæ deorsum descendentes sub sternum collocantur in rectorum musculorum sine: in quibusdam parte vna dumtaxat, aut duabus ramulo per exiguo coniungitur. Illud vero reticere nullo pacto possum, me in nonnullis mulierum cadaueribus quacumque diligentia ad-

Vasa seminaria in mulieribus quomodo constituta sint.

Venæ umbilicalis ortus.

Venæ duæ peritonæi alentes.

Venæ per quas comparatur uterus cum mammillis.

Per quas ve-  
nas mēstrua  
purgantur.

hibita, nunquam tamen harum venarum unio-  
nem inuenire potuisse. Hos insuper assero, has nō  
proficisci ab utero, sed ab ea diuisione, ubi eius  
vena oriuntur, quæ non uteri substantiæ alenda  
dicata sunt, sed ceruicem illius nutriunt. Per eas  
mēstrua expurgantur: quemadmodum sæpenu-  
mero vidi hisce oculis in aliquibus mulieribus,  
quæ violenta mortē periere, dum adhuc illis mē-  
ses fluere: neque in his modo, sed etiam in aliis  
quibusdam quibus instabant, & mox fluxuri e-  
rant, idā, præsertim Pisis accidit, dum mulierem  
eiusmodi in publico theatro secarē: aderat disci-  
pulorum ac doctorum magnus numerus: mulie-  
ri, cuius anatomen profitebar, Sanctæ nomen e-  
rat: quæ cum ante mensem geminos peperisset, e-  
osque miseros vix in lucem proditos luce priua-  
set, ac suffocasset, eam iusti iudices suffocandam  
iusserunt: nam ut inquit poeta ille,

Non est lex iustior vlla,

Quam necis artifices arte perire sua.

In hac igitur muliere Sancta nomine, reuera  
autem demoniaca potius, & venefica, huiusmodi  
venæ, quæ in aliis non admodum magna esse  
solent, insignes erant, & nigerrima, & propter  
ea satis perspicua. Quamobrem licuit spectato-  
ribus per Sanctæ cadauer in animum inducere,  
per quas venas fluunt mēstrua, eas non transi-  
re per uterum. Sed si quis ita obstinate opposi-  
tum sentit, ut neque si oculis cernat, quod dixi,

illi



illi suaderi veritas possit, ego nihil moror, ipse viderit. Ramus hic crassus diuisionis arboris vena caua cum supra os pubis peruenit extra abdomē, fertur in inguina: & hic ramulos complures gignit, qui glandulas ibi positas nutriant, in quib. glandulis fiunt bubones. Ab eodem loco venae emergunt quae per penem ambulant inter pellem, & carneam membranam usque ad extremum praeputij: eius rami etiam nescio qui per scrotum disseminantur. Ex eodem loco, unde venas haec omnes exoriri dicebamus, vena exit satis apparens, quae oblique ascendit ad iliū os, & sub pelle graditur versus extremas costas. supraq; abdomē diuersos in ramos scinditur, quas venas bonus Vesalius praterit. Ramus hic insignis, quem paulo ante memorauī, postquam inguen superauit, trimembris euadit: quorum unus intra pellem & membranam carneā oblique introrsum, versus genu descendit. supraq; ipsum interne per crus descendens, supra internum malleolum progreditur, ac supra pedem digitos versus, pollicem praesertim, ibique varie finditur. Hae vena illa est peruulgata satis, quam saphenam dicunt, e qua in vteri affectibus sanguis mitti consuevit: in cuius descensu ramuli complures hinc inde mittuntur, cum ut cutem alant, tum ut pinguedo gignatur. Reliqui duo crassissimi a musculis recti feruntur, oblique tamen per femoris interna descendunt, transeunt quae inter duo inferiora

Glandulae in quibus bubones fiunt.

Vesalii negligentia.

Vena saphena.

femoris capita: sub genu deferuntur, prius tamē ramulos multos promittunt pro eorum musculorum nutritione, qui femur ambiunt, qua femur flectitur. A maiori autē, quem diximus, ramo vena assurgit, quæ sub cute primum, deinde per posteriora tibiæ ad pedem usque excurrit: sub eadem genu flexura alia vena pullulat, quæ anteriores musculos tibiæ, aliumque etiam profundiores nutrit, deorsum fertur, ligamentoque adheret, quod est inter tibiæ, fibulamque: ubi ligamētum perforat, & ad anteriora tibiæ serpit, ac descendens supra pedem cum pedis ligamento adheret. Ramus maior adeo ima petit, ut sub planta pedis excurrat per internum malleolum, & in tibiæ regione, nec nō sub planta variis modis ramos edit. Alius ramus notatu dignus dicitur & ipse per musculos, & venam mittit sub duobus primis musculis post tibiæ sitis, ubi tendo eius initium sumit. Hæc assurgit, & anteriora versus sub cutem fluit, & ad externum pedis malleolum transmittitur: hæc illa est vena il-

**Vena sciæ,** lustris, quam sciæ siue ischi & coxendicis vocāt, ischii & coxendicis vocata.  
**Vena poplitis,** & in eius affectibus secant. Ramus ille, qui sub genu fertur, poplitis vena nuncupatur: cuius apud antiquos frequens sit mētio. A quibus venis, quemadmodum ab aliis superius descriptis, plures alij ramuli exoriūtur, qui a nobis de industria præteriti sunt: quæ venæ & quod exiles admodum sunt, neque eundem in omnibus cursum tenent

DE IEC. ET VENIS LIB. VI. 321

ment, describi nullo prorsus pacto a nobis debe-  
bant. Igitur quæ de venarum historia breuiter a  
nobis hætenus exarata sunt, satis esse poterunt  
candido benignoq; lectori: si tamen illud addide-  
rimus, hanc esse venarum utilitatem, ut ad o-  
mnes corporis partes sanguinem pro nutrimen-  
to deferat. Etenim membra omnia solo sanguine  
aluntur: propterea causas natura procreauit ve-  
nas dedita opera, ut instar riuulorum per corpus  
excurrerent. Substantia venarum tenuis admo-  
dum est, nervosaq; constat membrana: idque  
non temere. Nihil enim Deus Opt.

Max. temere agit, sed ne ita  
facile disrumpatur.

Venarū v-  
tilitas.  
Cūcta mē-  
bra solo fan-  
guine nutri-  
ri.  
Quare cauē  
factæ sint  
venæ.  
Venarū sub-  
stantia te-  
nuis & ner-  
uosa mem-  
brana præ-  
dicta.

X





322 REALD. COLVMBI CREM.  
 REALDI COLVMBI  
 CREMONENSIS  
 DE RE ANATOMICA,  
 Liber VII.

DE CORDE ET ARTERIIS.

Cor est inter principes corporis partes, non tamen princeps pars. Cor spiritus vitales in pulmonibus elaboratos perficit. Cor arteriarum omnium radix.



**C**OR licet inter principes partes non numerari non possit, princeps tamen non est, ut Aristoteles censuit, qui actiones omnes in corde collocavit: quod profecto vitalis caloris fons existit, vitalesque spiritus perfectiores reddit, posteaquam in pulmonibus elaborati sunt: quemadmodum planius audies, quando de pulmonibus, eiusque actionibus mentio fiet: estque arteriarum omnium radix, fons, & origo. Et quamvis in thorace a sagacissima natura cor situm fuerit, dimidium tamen thoracem neutiquam occupavit: neque in medio corporis situm fuit, ut Aristoteli placuit: nam centrum corporis occupavit umbilicus, quemadmodum tunc dicemus, cum de fetu agemus. Illud vero nullo tibi pacto in mentem veniat cor nervorum, aut venarum principium esse: situs cordis in homine est in thoracis cavitate.

Cordis situs contra Arist. sententiam. Corporis centrum umbilicus occupavit.

cavitate: isq; obliquus, & si in brutis rectus existat, in homine supra septum transversum iacet, & illud tangit: sed in brutis non parum distat: basis eius est tantum non in dextro latere, at cus-  
 pis sinistrorsum: mēbrana inuoluitur satis crassa, nerueaque, quam cordis inuolucrum appellāt, cuius usus est, ut cor contineat, colligetq; ne decidat, neve os pectoris, costasq; dū mouetur attingat. Appellant autem cordis motus, tum diastolen, tum systolen, quod scilicet & dilatetur, & contringatur. Pericardium igitur hoc, quod diximus, a corde aliquantulum distat: quo loco aquam quendam humorem natura collocauit, ut eocor humectaretur: periculum etenim imminabat, ne absque hoc praesidio ob frequentes, ne perpetuos dicam, ipsius motus, qui etiam nobis fiunt inuitis, cor exsiccaretur. Quem humorem non modo in uiuentibus, sed in mortuis quoque deprehendes: licet de hoc Curtius Papiensis dubitauerit: at ego hoc ita esse, non semel, sed saepius in publicis, priuatisque vini canis sectionibus aperte ostēdi ita, ut nullus amplius dubitationi locus relinqueretur. Hoc inuolucrum, indumentumue in homine septi transversi tendini valide cohaeret. Scito praterea cor praeter inuolucrū, quod dixi, propria tunica pradiitū esse, quā ipsius substantiam immediate contingit: sed inter cor, & pericardium non parua oritur pinguedo, quā manifeste conspicitur, & cordi adheret: quam-

Membrana  
cordis inuolucrum appellatur.

Diastoles & systoles cordis motus Pericardiū. Humor aqueus in pericardio.

Curtij Papiensis haesitatio.

Cordis alia a pericardio propria tunica. Cordis pinguedo.

Gal. & Arist.  
falsa opinio

Portius  
Neapolita-  
nus Aristot-  
elē defen-  
dens expe-  
rientia vi-  
ctus.

Pinguedi-  
nis vltus.

Cordis hu-  
mani figu-  
ra.

Cordis sub-  
stantia.

Cordis fi-  
bræ.

Cor non est  
musculus vt

Hippocrati  
placuit.

Cor corona-  
lis venæ fan-

guine nutri-  
tur.

Coronalis  
arteria.

uis Aristoteles, & Galenus asserant, neque circa  
cor, neque circa aliam quamuis calidam particu-  
lam pinguedinem vllam nasci. Dicebat autem  
Portius Neapolitanus Physicus, qui in Aristot-  
elē verba nimis iurauerat, hanc, quā diximus,  
pinguedinem circa cor pinguedinem nullo pacto  
esse: huius rei testimonium locupletissimum esse,  
quod ipsa non eliquatur. Ego vero in theatro, dū  
Pis publicè profiterer, nihil respondens pingue-  
dinem eandem candela, quæ præstabat, eliquaui:  
quo viso cum mutire amplius non auderet, taci-  
tus abiit, ac pene explosus. Erat autem ob conti-  
nentem motum pinguedo ibi valde necessaria:  
itaque pinguedinem in compluribus corporis no-  
stri partibus cernimus, præsertim circa oculos,  
temporalesque musculos, ne partes exsiccantur.  
Humani cordis figura pyramidem prorsus non  
præfert, quemadmodum in brutis: sed depres-  
sum est potius cor in homine: eius substantia du-  
ra admodum, densaque est, eiusmodig, facta est,  
vt ne in validis motibus disrumperetur. Tribus  
generibus fibrarū cor præditum est, hoc est, rectis,  
obliquis, & transuersis, vt & traheret, & conti-  
neret, & expelleret. Nullo autem pacto potest cor  
inter musculos connumerari: quamuis diuinus  
Hipp. in libro de corde ipsum musculum esse dice-  
re non erubuerit. Vndig, vena coronali circum-  
datur, vt eius sanguine alatur: cui arteria coro-  
nalis quoq, dicta a se sociā præbet, & nonnunquam  
bina:



vine: idq; ut eius ope substantia vitalis caloris vi-  
 ficetur: quare dubitare aliquis posset, atque ex  
 dictis argumētum elicere satis validum, non in  
 corde, sed in pulmonibus vitales spiritus gigni.  
 Ego vero magnis philosophis huiusmodi difficul-  
 tates discutiendas relinquo: mihi etenim satis  
 fore puto, si partes corporis quomodo se habent,  
 earumque usum, quātum in me erit, vere descri-  
 sero, sed, ut ad cordis historiam redeamus. Duæ  
 sunt cordi cavitates, hoc est, ventriculi duo, nō  
 tres, ut Aristoteli visum est: ex his alter a dex-  
 teris est, a sinistris alter: dexter sinistro multo est  
 maior: in dextero sanguis adest naturalis, at vi-  
 talis in sinistro. Illud autē observatu perpulchrū  
 est, substantiam cordis, dextrum ventriculum  
 ambiētem, tenuem satis esse, sinistram vero cras-  
 sam: & hoc tum equilibri causa factum est, tum  
 ne sanguis vitalis qui tenuissimus est, extra resu-  
 laret. Inter hos ventriculos septum adest, per  
 quod fere omnes existimant sanguini a dextro  
 ventriculo ad sinistrum aditum pateferi: id ut  
 fiat facilius, in trāsitu ob vit alium spirituum ge-  
 nerationem tenuē reddi, sed longa errant via: nā  
 sanguis per arteriosam venam ad pulmonē fer-  
 tur, ibique attenuatur: deinde cum aere una per  
 arteriam venalem ad sinistrum cordis vētricu-  
 lum defertur: quod nemo hactenus aut animad-  
 uertit, aut scriptum reliquit: licet maxime sit ab  
 omnibus animaduertendum. Præter hæc omnia,

Cordis ven-  
 triculi duo,  
 non tres  
 sunt.

In dextro  
 cordis ven-  
 triculo san-  
 guis natura-  
 lis, in sini-  
 stro vitalis  
 cōtinetur.

Substantia  
 vtriusque  
 cordis ven-  
 triculi.  
 Cordis se-  
 ptum.

Vitalis spiri-  
 tus genera-  
 tio nemini  
 adhuc ani-  
 maduersa.

Cordis particula.

que hactenus dicta sunt, ad sunt quoque circa corda alia particula, quas auriculas vocant, quae tamen auditus sensui nullo pacto sunt dicatae. Sunt igitur eminentia bina, membranosa, anfractuosaque, ex quibus altera dextra est, sinistra altera: & rursus altera maior est, altera minor, rursusque harum altera ad cauam venam, altera ad arteriam venalem apposita est. Harum igitur auricularum in cordis motibus non paruus est usus, ne scilicet dum cor mouetur, vena caua,

Auricularum cordis usus.

Vena caua. venalisque arteria, quae ipsa quoque venarum instar, constructa est, disrumpere non possent: nimis enim

Quatuor in cordis basi vasa.

quandoque sanguine opplentur. Circa cordis basim, quae lata admodum est, quatuor vasa conspiciuntur: duo ad ventriculorum dextrum, duo item ad sinistrum: in dextro est vena caua, venaque

arteria arteriosa: at in sinistro adest arteria arteriosa, & arteria venalis.

Vena caua cor non ingreditur.

Neque tamen existimes id, quod multi sunt opinati, venam cauam hinc exoriri, ut iam dictum est in tractatu de venis: illa enim cor non ingreditur, ut falso arbitrantur, sed cum scissa sit eo loco, lataque, dextri ventriculi orificio dumtaxat adhærescit. Vena item arteriosa non a

Vena arteriosa a iecore non a corde ortus.

corde oritur, sed a iecore, quod verum esse facile perspicies, si animaduverteris: nam, dum in utero matris fœtus latitat, si eius introspeciamus, cõperiemus cauam venam cum vena arteriosa continuam esse. Igitur quatenus vena, ab hepate ortum ducit, at quatenus arteriosa, ex corde: est. n. cor arteriarum

Quare vena arteriosa dicatur.

rū omniū principium. Hæc ad pulmonem in-  
 dit ut ad illum sanguinem ferat, quo nutriatur,  
 quæque pro corde alteret. Vena arteriosa hæc quā  
 diximus, magna est satis: immo vero multo ma-  
 ior quam necesse fuerit: si sanguis ad pulmones su-  
 pra cor exiguo intervallo deferendus dumtaxat  
 erat. Diuiditur duos in trācos tum ad dextrum,  
 tum ad sinistrum pulmonem: deinde varios in-  
 ramos, quemadmodum tunc dicemus, cum de  
 pulmone agemus. Verum enimvero vena illa,  
 quam diximus, seu membrana euanescit post in-  
 fantis egressum ab utero: idque propterea quod  
 incipit cor suum officiū præstare. Arteria αὐτὴν, Arteria αὐτὴν.  
 quæ est aliarum omnium arteriarum mater a si-  
 nistro oritur cordis ventriculo sursumque assur-  
 git. Sed antea quam huius arteria iter persequa-  
 mur, de arteria venosa dicendum videtur, quæ  
 sinistro ventriculo apposita est. Dicitur autem  
 arteria, quoniam spiritibus, arteriosisq. sanguini  
 deseruit: at vena etiam appellatur eo, quod vena  
 corpus, hoc est, substantiam habet: vas est satis  
 insigne, quod per pulmones instar vene arterio-  
 sæ dissecatur. Scribunt Anatomici in hoc (pace  
 eorum dixerim) parum prudentes harum usum  
 esse, ut aerem alteratum ad pulmones ferant, qui  
 flabelli instar ventulum cordi faciunt, idq. refri-  
 gerant non cerebrū, ut Aristoteli visum est: exi-  
 stimantes iidem eas tunc fumos nescio quos capi-  
 nosos (ita enim ipsi vocāt linguarū ignoratione)

Arteria αὐτὴν.  
 Arteriā  
 omniū ma-  
 ter,

Arteria vē-  
 nosa quare  
 dicatur.

Anatomici  
 eorum opi-  
 nio erro-  
 nea.



excipere a sinistro ventriculo profectos: quod commentum non dici posset, quam ipsis placeat: quippe qui certo existimant in corde ea fieri, qua in caminis assolent: quasi in corde viridia ligna existant, quæ dum cremantur, fumum edant, atque hætenus de harum usu iuxta aliorum Anatomicorum sententiam. Ego vero oppositum prorsus sentio: hanc scilicet arteriam venalem factam esse, ut sanguinem cum aere a pulmonibus mixtum afferant ad sinistrum cordis ventriculum.

Diuerſa a  
ceteris ana-  
tomicis de  
arteria ven-  
alis sententia.

Quod tam verum est, quam quod verissimum: nam non modo si cadauera inspicias, sed si viua etiam animalia, hanc arteriam in omnibus sanguine refertam inuenies: quod nullo pacto eueniret, si ob aerem dumtaxat, & vapores constructa foret. Quocirca ego illas Anatomicos non possum satis mirari, qui rem tam præclaram, tantique momenti non animaduertierint: quamuis præcelentes haberi velint: immo vero a compluribus suis similibus habeantur. Sed illis hoc satis est, Galenum dixisse, quasi Pythagoræ discipulis. Quid quod aliqui nostro tempore in Galeni placita de Anatome iurarunt: ut hoc audeant affirmare, Galenum Euangelistæ more suscipiendum esse, nihilque in eius scriptis esse non verum: mirum-

Fieri potuif  
ſe vt etiã Ga  
lenus fallus  
ſit nec om-  
nia nouerit.

que dictu est hoc dicto quantopere se efferant, ac Anatomistarum principes popello iactent. quod quã sit reprehendendum nemo non videt. etenim quis est qui numquã offendat? sed de his satis superque. Obser-

Obseruandum est itaque orificio quatuor vaso-  
 rum, quæ sunt ad cordis basim, vndecim mem-  
 branas astare, quæ trifulcæ, vel tricuspides appel-  
 lantur: tres inquam ad cauam venam, tres item  
 ad venam arteriosam, tres ad arteriam <sup>ad gñv</sup>  
 dictam, duasq; ad arteriam venalem: quarum fi-  
 gura non est eadem: nam quæ ad venam cauam,  
 & arteriam venalem posite sunt, diuersa sunt  
 forma a membranis magna arteria, & vena ar-  
 terialis: hæ namque instar trium literarum, quæ  
 a Latinis dicuntur: aliæ vero sunt instar sa-  
 pittarum: admirabilis autem harum usus est, &  
 ipse sunt quarum ope multa discimus ex his, quæ  
 ad cordis, & pulmonum usus cognitionem spe-  
 ctant. Scito etiam quemadmodum harum figu-  
 ra varia est, ita utilitatem diuersam esse. Ostiola  
 itaq; cauæ venæ, necnon arteriæ venosæ ab inte-  
 riore situ foras feruntur, ut sanguinis emissioni  
 seruiant: aliorum vero duorum vasorum ostiola contra  
 ab exteriori intro, ut ad inclusum sanguinem cōti-  
 nendū facta esse videantur. Illud insuper adno-  
 tato ea ostiola, quæ intus foras panduntur, quibus-  
 dam filamentis referta esse hæc, illacque per ven-  
 triculos dispersis, quæ propterea facta sunt, ut i-  
 osas contineant firmentq;: quibus forte deceptus  
 est magnus Aristoteles, qui filamenta hæc, quæ di-  
 xi, nervos esse opinatus est. hincq; factū est, ut A-  
 ristoteles cor nervorum principium esse scriptum re-  
 liquerit, & per consequens sensus, motusque. sed,

Membranæ  
 trifulcæ, &  
 tricuspides  
 appellatæ in  
 orificio qua-  
 tuor cordis  
 vasorum v-  
 decim.

Vndecim  
 membrana-  
 rum usus.

Cordis fila-  
 menta, pro  
 nervis ab A-  
 rist. habita.  
 Quamobrè  
 Aristot. cor  
 principium

neruorum  
statuerit.

Quatuor  
vasorum v-  
sus.

Sanguinē in  
dextrū cor-  
dis vētricu-  
lum ingres-  
sum non re-  
trocedere in  
cauā venā.  
Nervus mē-  
branā cor-  
di inuoluentē  
ingrediens.  
in hominis  
corde os nō  
reperitur,  
cū tamē in  
brutorum  
inueniatur.

ut ad supradicta quatuor vasa redeamus: duo ex  
his constructa sunt, ut intro ad cor deferant, hoc  
autem euenit dum cor dilatatur: duo vero alia,  
ut, dum cor constringitur, foras deferant. Idcirco  
quando dilatatur, sanguinem a caua vena in  
dextrum ventriculum suscipit, necnon ab arteria  
venosa sanguinem paratum, ut diximus, vna  
cum aere in sinistrum: propterea membranae  
illae demittuntur, ingressuique cedunt: nam dum  
cor coarctatur, haec clauduntur: ne quod susceperit,  
per easdem vias retrocedat, eodemque tempore  
membranae tum magna arteria, tum vena arte-  
riosa recluduntur, aditumque praebent spiritui  
sanguini exeunti, qui per vniuersum corpus fun-  
ditur, sanguinique naturali ad pulmones delator:  
tres itaque semper habet, cū dilatatur, quas prius  
memorauimus, recluduntur; clauduntur reliquae:  
itaque comperies sanguinē, qui in dextrū ventri-  
culū ingressus est, non posse in cauam venā retro-  
cedere. Ex hac doctrina collige, cor nullo pacto id  
membrum esse, in quo sanguis gignatur, quem-  
admodū sensit Aristoteles cum a vena caua san-  
guis distribuatur: estque hoc admirabile, maxima-  
que arte fabricatū: ad membranam autem cor-  
dis substantiam inuoluentem peruenit nervulus  
a sinistro recurrente nervo profectus. Hoc insu-  
per velim certo scias, nullum os in hominis corde  
inueniri: quamuis in bobus, bubalis, equis, atque  
id genus magnis animantibus osseum nescio quid  
osten-



ostendatur: quod in nobis neutiquam est: sed substantia dumtaxat radice magnæ arteriæ venâ arteriosam versus, quæ cartilaginea videtur: licet os nullo pacto appellari queat, quidquid Galenus dicat, qui ridendus in hoc est, dum veteres ridet, qui os cordis nō describere: quod iudicium ipsi maxime facien dum erat. Hoc vero axioma in Anatome existimato arterias omnes a corde proficisci, quemadmodum ab hepate venas, necnon a cerebro nervos. A sinistro itaq; cordis ventriculo exoritur arteria illa, quam aorten vocāt, aliarum omniū arteriarum mater, quæ satis magna est: substantia vero tum crassa, tum alba: crassa quidem primo ne sanguis spiritu refertus facile euanesceret, deinde ne suis in motibus disrumperetur: mouetur enim arteria continuo non per se, sed propter spiritus, posteaquam aōgrn cor ipsum prætergressa est, paruum arteriā coronalē dictam, eo quod cor ipsum circumdet, immediate parit, quæ eius substantiam viuidam reddit, in qua varie diffeminatur. Illud insuper scito coronalem hanc arteriam in nonnullis non esse unicam, sed duas. deinde ascendens altius duos in truncos scinditur, quorum alter maior, minor alter existit: maior descendit, ascendit minor; maior autem factus est ille truncus quem descendere aiebam: quoniam maior corporis pars illi viuificanda erat, truncus ascendens a sinistris arteriā emittit, quā axillare sinistrā vocant, quæ oblique

Galenī error.

Quod in hominis corde reperitur nō os, sed portio quadā cartilaginis. A corde arteriæ, iccore venæ, cerebro nervi nascuntur. aōgrn arteriæ exortus.

Arteria non per se, sed a spiritu mouetur.

Coronalis cordis arteriæ origo. Coronalis cordis arteriæ aliquādo gemina.

Diuiditur arteria aorte in duos truncos. Ascendētis trunci distinctio.

Axillaris si-  
nistra arte-  
ria.

Trunci axil-  
laris arterie  
distributio.

Arteria tā-  
gētibus me-  
dicis bra-  
chium se of-  
ferens.

versus axillam tendit, & ad superiores costas ar-  
teriolas mittit, & egrediens ad brachium iter te-  
net per internam partem, & cum basilica inter-  
na iungit se sociam, ramumque sursum mittit,  
ramulos autem alios ad omnes eos musculos, qui  
sunt circa humerum, scapulam, eius cavitatem,  
necnon ad anteriora thoracis, & ad eas glandu-  
las, quæ sunt sub ala. Truncus vero axillaris recte  
per internam regionem humeri descendit usque  
ad cubiti flexuram. & antea quam regionem hæc  
pertranseat, arteriolam mittit sociā quarto ner-  
uo brachij ad musculos cubitum extendentes dis-  
tributam: cum autem flexuram cubiti præterit,  
in duas, sæpe in tres arterias secatur: sed prius ar-  
teriolas ad eos musculos relegat, qui sunt in hu-  
mero, & cubito, & ramus unus penes id ligamē-  
tum incedit, quod inter cubitum, & radium po-  
situm est: & egressus foras ad externos musculos  
graditur: quod reliquum est, cubiti longitudinē  
sequitur: postea vero quam sub interno transuer-  
so brachialis ligamento præterfluxit, in palma  
ipsa variis secatur modis, & ad extremos usque  
digitos extēditur: at alter ramus tendit radium  
versus iuxta eius deductum: & ubi medium cu-  
bitum præterit, assurgit inter musculos: & ad  
cutim subit per internam partem radij: atque hic  
ille est ramus, cuius motum digitis per se sentire  
medici solēt, cum manum in carpo apprehēdunt,  
ut pulsū consulant. Illud præterea scias velim,  
ramum,

ramum, quem dixi, in aliquibus vario situ locatum esse, ut dubites an is sit, quem hactenus memoravi, eo quod foras versus feratur. Quod si quis medicus rei Anatomica ignarus, huius pulsum, dum agrotat praesertim, loco consueto dumtaxat querat, neque inueniat, na is hunc morti proximum esse falso iudicabit, & praedicet falso. Non equidem negauerim perraro arteriam huiusmodi situm obtinere: nam partem internam plurimum occupat: hac ubi a brachiali discessit per partem externam, usque ad digitorum extremitatem procedit: alter ramus iuxta ligamentum fertur. Truncus iste ascendens postquam arteriam axillarem peperit, in arterias binas diffecatur <sup>reperiuntur</sup> duas, hoc est, soporarias appellatas, quae per arteriam scilicet soporariae dictae earumque distributio. partes colli laterales rectae feruntur usque ad caluariam basim, asperae adhaerentes arteriae, venisque iugularibus internis affixae: quam caluariam priusquam ingrediuntur, duas arterias ad faciem mittunt, & sub maxilla inferiori subdivisae ramulos mittunt ad musculos tum colli, tum capitis, tum laryngis, tum hyoidis, tum linguae: sed duo ramuli, iug. maiores ad linguam ducti per eius longitudinem ad extremum usque feruntur: quo peracto itinere ascendunt sub aurem, & tum ante, tum post ipsam sursum attolluntur ad temporales musculos, ad frontemque nec non ad capitis cutem: & ad faciem, hoc est, ad eius musculos distribuuntur: alter eius ramus, quem retro ferri diximus, disse-



Duo muscu-  
li posterio-  
res capitis  
nunc primū  
cogniti.

*minatur ad duos illos musculos, quos nos primū  
pace aliorum dixerim, inuenimus: qui positi sunt  
in parte capitis posteriore: fertur etiam ad cutē.  
& ad musculos capitis. Ab eodem loco, & ali-  
quantulum altius etiam arteria duæ ortum du-  
cunt maxillam inferiorem ingredientēs sub aure  
in foramen ibi dedita opera situm, iuxta maxilla  
longitudinem, quibus cum arteriis & vena, &  
neruus quoq; adiunguntur: disperguntur autem  
ad omnes radices dentium inferiorum: pars vero*

Arteriæ dē-  
tium radi-  
ces ingredi-  
entes.

*egreditur per foramen ad mentum positū, & per  
labrum incedit. Huius arteria Vesalius oblitus  
est prorsus, ita ut illius ne meminerit quidē. Sed  
antequam illis arterias describo, quæ in calua-  
ria continentur, aliquæ aliæ prius describendæ  
sunt, quarū pars a caluaria quoq; suscipitur. Ani-  
maduertēdum igitur est, dexterā arteriam axil-  
larē loco minus humili exoriri quā sinistra: præ-  
terea oblique non incedit, ut illa: est autem origo  
eius a carotide dextra in iuguli regione: & rectā  
incedit per axillam sub iugulo ad brachiū dexte-  
rū, ubi diuiditur, & progreditur instar sinistra:*

Dexterarū  
axillarium  
arteriarum  
inter se di-  
uersitas.

*at unde hæ carotides arteria, & axillaris arteria  
ortum ducūt, ab anteriore parte duæ arteria na-  
scuntur deorsum tendentes, ramos ad superiora  
interualla costarum & ad vertebrae mittunt,  
quas Vesalius ignorauit: aliæ item exoriuntur  
arteria parua, quæ sub sterno conuertuntur, de-  
scenduntq; duabus illis venis comitantibus, quæ  
ad*

Vesalii la-  
pus.  
Arteriæ ad  
superiora  
thoracis co-  
starum in-  
terualla.  
Duæ arte-  
riæ sub ster-  
non.

*at unde hæ carotides arteria, & axillaris arteria  
ortum ducūt, ab anteriore parte duæ arteria na-  
scuntur deorsum tendentes, ramos ad superiora  
interualla costarum & ad vertebrae mittunt,  
quas Vesalius ignorauit: aliæ item exoriuntur  
arteria parua, quæ sub sterno conuertuntur, de-  
scenduntq; duabus illis venis comitantibus, quæ  
ad*

ad mammillas tendebant, & ad fines rectorum  
 musculorum: itaque diuiduntur in illorum mo-  
 rem. In eadem pene regione retro tamen versus  
 corpora vertebrarum duas alias adnotabis, quæ  
 per transversos processus vertebrarum colli dela-  
 tæ (ob hoc enim illos natura perforauit) necnon  
 per ea foramina, e quibus nerui egrediuntur, ra-  
 mulos mittunt ad spinalem medullam, verte-  
 brasq., & ad musculos ceruicem in latus flecten-  
 tes: sed in quibusdam hæ duæ arteriæ non a sop-  
 rariis, ut in plerisque, sed frequenter ab axillarib.  
 originem ducunt: hæ quas nunc ob oculos poni-  
 mus arterias, inter primam vertebram & ca-  
 put, partem caluariæ posteriorem ingrediuntur:  
 inter ipsam nimirum, & spinalem medullā: pri-  
 us tamen duas arteriolas auris antro submini-  
 strant, quæ in ingressu miscentur: dextra namq.,  
 sinistra vnitur adeo, ut longitudine semidigiti  
 una fiat: in duas postea diuiditur: deinde in alias  
 complures, tenduntq., primū ad durā, tenuemq.,  
 meningem, deinde ad cerebellum: & profecto si  
 hæ duæ arteriæ non fuissent a natura genitæ, po-  
 steriora caluariæ arteriis caruissent: ab hisce ce-  
 rebellum viuificatur, & cerebri quoque pars, &  
 medulla spinalis origo. Hæ duæ arteriæ, quæ per  
 transversos processus vertebrarū inter primam  
 vertebram, atque os occipitiū sursum assurgunt,  
 internam caluariæ regionem ingrediuntur inter  
 ipsam, inque spinalem medullam: postea vero

Arteriæ per  
 transversos  
 colli proces-  
 sus.

Membrang.  
 vtriusq; ce-  
 rebellique  
 arteriæ.

Posterior  
 capitis pars  
 nō vacat ar-  
 teriis.

quam caluaria cavitatem ad dimidiū digiti longitudinem sunt ingressa, uniuntur, atque ex binis vnica fit arteria: tamen diuidūtur denuo in geminas, dexteram scilicet & sinistram, a quibus arteria ad duas cerebri membranas mittuntur atque ad cerebellum: deinde per horum substantiam parte superiore ad dimidiam vsq; caluariam maxima fit harum arteriarū distributio. Quocirca reliquum est cranij, a duarum carotidum ramificatione vniificatur: vt paulo post dicā: quae priusquam cranium penetrent, arteriolas auris labyrintho mutuo dant: vbi vero hic arteria truncus caluariam ingressus est, vt supra dicebā, ad spinalem medullam, ad duram, tenuemq; membranam, ad cerebellum cerebrumq; arterias mittit suas. Neq; quemquā inuenies, cui vera harum

Auris arteria.

Distributio arteriarum Vesalio incognita.

Rete mirabile dari contra Vesaliū.

duarū arteriarū distributio cognita fuerit: neq; Vesalius ipse illā olfecit: qui dum in arteriarum per transversos vertebrarum processus ascendentium descriptione versatur, inquit ingrediente caluariam per sinum illum dura matris tēdere, quem iugulares ingrediuntur vena: sed hoc potius ita esse animo concepit Vesalius, quam oculi viderit. Quocirca nihil mirum est, si is rete mirabile a priscis Anatomicis tantopere decantatum, nescio quo pacto irrideat: nā ab hisce, qui ignorauit, arteriis potius quam a carotidibus rete mirabile efformatur: quauis neque Galenū haec duae arteriae cognita fuerint: nā venas, inquit

per



per posteriora capitis ferri, per anteriora vero arterias. Tu vero hoc loco admirabile & arte inenarrabile constructum opus ab opifice summo diligenter adnotabis, cuius de sapientia, providentiaque silere satius duco, quam pauca dicere. Etenim duæ, quas descripsimus, arteriæ sub spinali medulla sursum attolluntur, & præter multifidos illos ramos, quos per tenuem membranā spargit, eo loco, quem conarium vel pinealem glandulam appellamus, ingrediuntur substantiam cerebri in extremitate superiorum ventriculorum, atque ibi grandem, atque insignem plexum perficiunt: qui plexus mea quidem sententia plexus mirabilis ob admirabile artificium appellari merito potest: qui posteriore parte ad torcular affigitur. In hunc eundem admiratione dignum plexum duæ quoque arteriæ carotides immittuntur, ut suo loco audies: itaque ex quatuor arteriis constructum esse rete mirabile observare poteris: quod ante me a nemine hætenus observatum fuisse comperi: ita ut & rei novitate, & dignitate delectari, & doceri possit rei anatomica studiosus. Arteriæ carotides ubi ad calvaria basim pervenere, id foramen ingredi videntur, e quo sextum nervorum par egressum creditur: & quod venas iugulares internas suscipit: non assurgunt tamen, neque hic duas arterias pariunt ut Vesalius cogitatione potius, quam visuprehendit: quas unā cum iugularibus in duræ membrana sinus ingredi voluit. Sed quid, inquires,

Conarium  
locus.

Torcular:

Rete mirabile ex quatuor constructum arteriis a nullo adhuc observatum.

hæ agunt arteriæ sub caluaria basi. Ad anteriorem partem cōuertuntur, perque id foramē transeunt quod in osse temporali latitat prope illud, in quod sexta descendit neruorum cōiugatio, & iugulares inter nos ingrediuntur, quæ prius quam a caluaria parte interna suscipiantur, duas promunt arterias, quarum varij sunt rami, ad palatum nimirum, ad internum nasum, ad superiores dētes: alij caluariam subintran per ea foraminula, quæ ibi sunt sita: & arboris instar per dura membrana latera explicantur unā cum iis venis, quæ in membrana conspiciæ sunt, propterea quod sinciput ibi excauatum videbis. Postquam autem hæ arteriæ ad palatum, dentesque eos ramos diffuderunt, vt supra diximus, assurgunt in cranium ipsum per id foramen, quod inter sphenoidem, & os temporis situm est: quo loco pars tertij neruorum paris descendit: quamuis Vesalius hic Galenum acriter mordeat: idque mehercle iniuria: vbi vero sellam, quam dicunt sphenoidis supergressæ sunt, binas arterias ad oculos mittunt post neruos opticos appellatos vt vitam oculis prabeant: neq; oculis solum vitam subministrant, sed etiam oculorum musculis, iisq;, a quibus maxilla reseratur. maxilla inquā superior: propterea magnas multasq; harū sectiones obseruare poteris. Quod reliquū est harū arteriarū carotidum, supra dictam sellā ascendit tenui membrana coarctans, & post callosum corpus posteriora versus, variisque modis

Gal. iniuria  
a Vesalio re-  
prehēditur.  
Sphenois  
sellæ.  
Arteriæ ad  
oculos.

dis per tenuem meningem dispergitur supra, intraque, necnon ad latera: nonnulli etiam sunt earum rami a tenui ad duram meningem deducti, alij a tenui ad cerebri substantiam. Post tot distributiones soporiferarum arteriarum supra sellam cunealis, illa ventriculos cerebri superiores subeunt, cum primum tenuē mēbranam perforarunt, qui ventriculi anfractuosi sunt: & cū primo due esse viderētur, in exiguas, easq; innumeras scinduntur: itaq; per pulchrum rete ex arteriis contextum conspicaberis: quæ omnes iuxta deductum eorum vetriculorum, quos supra memoravi, eo usq; progrediuntur, donec veniant cū postremis, uti diximus. Hæ arteriæ socias habent venas: & in earum finibus adest glandula pinealis: has Galenus descripsit pro retiformi plexu, quasi secundinam præseferat. Ego vero, si rete mirabile usquam est, hoc esse affirmare audeo: nusquam enim tā admirandum arteriarum minimarū, innumerabiliumq; plexū, perplexumq; & intertextū videre poteris. Sed Galenus suum rete mirabile supra sphenoidem describebat: ubi glandula illa adest omne id excrementum suscipiens, quod in cerebro gignitur: huic enim muneri fuit a natura dicata. Sed nonne impium quid piis hominibus videri potuisset, graviterque accusanda fuisset natura: si natura, quæ prudens, & oculatissima in hominis fabrica esse solet, ac debet, tam nobilem plexum, tam insignemq;

Pinealis glandula.  
Diversa opinio de retis mirabilis situ:

Glandula excrementa a cerebro suscipiens:



*tamque admirabilem in loco non modo humili, sed tot excrementorum sentina, ne cloacam dicā, collocauisset? Quamobrem nequeo satis mirari, qui fieri potuerit, ut Galenus vir diligens supra quam dici possit, rerumq. naturalium acerrimus speculator, in tam graues errores inciderit, verique retiformis plexi situm ignorauerit, perperāq. descripserit: quod si cupiam diligenter inuestigare libeat reticularem plexum, ubi illum Galenus*

Galenus ex-  
torde mira-  
bilis retis se-  
de.

Cerebri ar-  
terioli aliis  
adhucigno-  
ta.

Nulla arte-  
ria ad pul-  
monem te-  
dit.

Maior arte-  
ria aortes  
truncus.

*describit: ne is sine suo frustrabitur. Nihil enim ibi cōpēries, nisi quasdam arteriolas illis partib. sphenoidiq. ossi vitam ministrantes. Eadem arteria, ex quibus rete conficitur, quod mirabile appellatur, per cerebri substantiā arteriolas mittunt: quod nemo ex Anatomicis ante me, quod sciam, haecenus scriptum reliquit. Atque hic finis est descriptionis trunci superioris: nisi illas arteriolas describendas duceres, quæ ad dexteras costas superiores demandant. Hic pulchrum est adnotatu, nullam arteriam ad pulmonem tendere, quæ vitales spiritus a corde suscipiat, quo ad pulmonem deferat: propterea verum hoc est axioma in re Anatomica, cum a pulmone, discesseris, reliquas humani corporis partes pulsatilib. arteriis präditas esse. Qua ratione probare acutus aliquis, atque acer in disputando posset, ne in corde quidē ipso vitales spiritus gigni. Sed de hoc alias. Arteria magna, quam docti sæpe nominauimus, truncus maior, qui deorsum tendit, sinisterorsum flectitur,*

flectitur, vertebrarumque corpori adhærescit, quod in superiori trunco non contingit: nam ille non secus atque vena caua, a vertebris distat. Truncus igitur hic inferior dum descendit e parte sui posteriore arterias profert costarum intervallis dicatas: atq; hæc rursus alias mittunt tum ad spinalem medullam, tum ad vertebrae, tum ad musculos, qui in posteriore thoracis parte sunt siti. At ubi ad septum transversum descendit duas partes arterias, dexteram, inquam, & sinistram, proferens, quæ ad septum ipsum distribuuntur. sub ipso transit quidem, sed nullo pacto perforat, penetratque: sed vertebrarum corpori adhærens progreditur ad penultimam usque lumborum vertebrae. Sed quum primum septum, ut dixi, præterit, arteriam profert, quæ ad hoc par secatur, ingrediturque, unde venam portam exire suo loco diximus, ibique distribuitur: alia properat ad bilis vesiculam, alia ad lienem, alia ad ventriculum, omentumque: ramuli alij ad pancreas, alij vero ad colon intestinum: sub hac alia emergit, cui plurimæ maximæq; divisiones sunt, tum per mesenterium, tum ad intestina tenuia: multisq; mesaraicis venis se socias præbent; deinde paulo inferius duas gignit arterias, easque adnotatu dignas, quas emulgentes appellant, quæ renes ingrediuntur. Sub emulgentib. venis paulo etiã declinius geminas producit arterias seminales, quæ a corpore magna arteria ortum habent,

Maiores  
trunci aor-  
tes arteriæ  
distributio.

Arteriæ e-  
mulgentes.

Seminales  
arteriæ.

non autem a sinistra emulgēte, ut Galeno visum est, per paucos tamen excipio: hæc descendentes implicantur cum venis seminariis tum in mare, tum in fœmella ad testes usque, & in fœminis usque ad uteri corpus, & ad internam partem matricis:

Vmbilicales  
arteriæ.

& ab his arteriæ vmbilicales fœtus originem trahunt. sub hisce seminariis arteriis medio trunco alia emergit arteria, quæ ad recti intestini, mesenterii defertur, & ad partem eius intestini, quod

Recti inte-  
stini arteriæ.  
Hæmorrhoidales  
arteriæ.

colon appellamus: quæ per sinistrum ileon deorsum fertur; at recti intestini arteriæ unâ cum mesaraicis venæ portæ venis ad extremum podicæ usque descendunt, quare fiunt tum venæ, tum arteriæ hæmorrhoidales: posteriore in parte ab hac eadem arteria sub transverso septo arteriæ egrediuntur ad vertebrae, ad spinalē medullam, necnon ad dorsales musculos, atque ad abdominis musculos delatæ. Cum vero ad penultimam vertebrae lumborum peruentum est, & in nonnullis ad ultimam usque, primum in duos ramos, eosque insignes diuiditur, qui dextrum, sinistrumque eius adeant. superant autē cauam venam in ossis sacri regione. Hi duorami subdividuntur, descendentesque amplius ramificantur, & ad vesicæ latera, & ad uteri cervicem, & ad musculos in concavitate abdominis residentes: duæ vero alie transcunt per foramina sita in ossē pubis, coxendicisque, e quibus quum primum abdomen ipsum egressæ sunt arteriæ, mittuntur

ad



ad duo corpora penis, quæ a summo ad imū feruntur, in ijsq; in ramos abeunt: atq; hæc illæ; illæ in quibus sunt arteria, quibus erectio mentule accepta ferenda est: quæ rem nemo, quod sciā, nostris tēporibus, neque ex antiquis cognouit, aut scripsit. Quod reliquū erat harū arteriarū, per eos musculos dispergitur, qui in interiore femore positi sūt: neq; tamē genu prætereūt. Ab illis arteriis quas vesica excipit, alia quoq; proficiſcūtur arteria, quæ ad internam ossis sacri partē delata, per quæ eius foramina tum ad ipsum tēdunt, tum ad spinalē medullam, extra vero ad musculos femori deferuientes: quæ admodum a magna quoq; arteria diuisione arteriæ exeūt, quæ musculos femoris, qui sunt in abdomine, vitali sanguine nutriūt: ex illis autem arteriis, quæ iuxta sacrum os coccygēq; descendunt, nonnullæ ad os intineæ musculū perueniunt unā cum quibusdā caua venæ venis, quæ & ipsæ hæmorrhoides dici possunt. Ex magna magnæ arteriæ diuisione duæ insuper oriūtur arteria, quæ sursum reflectūtur, & peritonæū prætereunt, sub rectosq; musculos ascendunt supra umbilicū vsque: & in ramos plures finiuntur per abdominis musculos. In hac diuisione duæ arteriæ implantātur, quas umbilicales appellamus, quæ primæ sunt, quæ in fœtu ipso gignantur. Etenim hæc ab umbilico postquam emerſerint: progrediuntur per peritonæum quæ duplex est ad vesicæ latera, hæcque arterias gignunt, de quibus paulo antea dicebamus: post

Arteria penis, penem ipsum erigētes, qui vix hucusq; fuit ignotus.

Vesicæ arteriæ.

Post umbili-  
calem arte-  
riam gene-  
ratur cor i-  
psum.

Diuisioma-  
gnæ arteriæ  
ad crura.

Ossa arte-  
riis non ca-  
tere.

umbilicalium autem arteriarum ortū cor ipsum  
gignitur quemadmodum tunc latius, & apertius  
explicabimus, cum de fœtu dedita opera agemus  
sed ad umbilicales arterias redeamus: hæ, post-  
quam in lucem proditi sumus, exsiccantur, duo-  
rumque ligamentorum munere funguntur. Duo  
autem magni trunci rami, qui ad crura defe-  
runtur, transeunt supra quintum muscolum  
lumbalem femur flectentem, & supra os publi-  
iliumque versus abdomen exeunt, & hoc loci cum  
venis internis socias iunguntur, quæ inter mu-  
sculos incedunt: & quemadmodū venæ illæ diui-  
duntur: ita has arterias diuidi conspicias ad om-  
nes scilicet musculos tibiæ, pedis, digitorumque:  
ad eorum enim extremitatem perueniunt. Mit-  
tunt in super arteriolas tum ad inguinis glandu-  
las, tum ad scrotum, tum ad penem sub cute. Il-  
lud in super adnotabis ossa suis non carere arte-  
riis, ut & ipsa calore vitali non deficerent. Atq;  
hæc de arteriis dicta sint satis: nolo enim inuti-  
libus verborum phaleris, & circuitione  
lectorem fallere, & diutius sine fru-  
ctu detinere.

DE CER. ET NER. LIB. VIII. 345  
REALDI COLUMBI

CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA,

Liber VIII.

De Cerebro, eiusq; membranis: de Spinali Medulla, item de Neruis,

CAPVT. I.



EREBRVM inter humani corporis partes principem locum obtinere, nemini dubium esse debet, quicquid cum Aristotele philosophi sentiant: quod ita esse

Cerebrum primas tenet contra Arist.

quinque rationibus probare facile possum. Primo mihi situs cerebri nobilitatem, atque illius in cetera membra principatū aperte ostendit: quod illud in altissima corporis parte Deus opifex collocauit, quasi in munitissima arce, ut minus esset iniuriis obnoxium. Secundū inducor a figura ipsius, quæ rotunda, oblonga q; est: rotunda magis, oblonga minus: quam figuram nunquam temere effingit natura prudens rerum omnium architectonica. Tertio memouet ratio munimentorū, & ingens apparatus, quibus cerebrum undique stipatum est: nam priusquam ad cerebrum ipsum pertin-

Prima ratio principatus cerebri.

Secundaria ratio.

Tertia ratio.



Cerebri  
quæ sint  
propugna-  
cula.

Aristotelis  
error de cu-  
se capitis.

Facilius læ-  
ditur cor  
quam cere-  
brum.

Quarta ra-  
tio.

Quinta ra-  
tio.

gas, quasi ad principis alicuius maximi penetra-  
lia, bone Deus, quot atria, porticus, thalamique  
pertranscendi sunt. Iam primum adsunt cavilli.  
deinde cutis crassissima ( licet hanc Aristoteles  
falso tenuissimam esse scribere non vereatur ) de-  
inde pinguedo, deinde carnea membrana, peri-  
cranionq; & periostrion, & calvaria duplex, sub  
quâ adhuc binæ meninges à seipsis distantes pro  
cerebri tutamento constructæ sunt. Ossa vero ca-  
pitis, ut proprio capite dictum est, ita ante com-  
posita sunt, ut diuelli, atq; abstrahi nisi magna vi  
possint, neque cerebrum nisi ab ingenti violentia  
ledatur. De corde autem quid attinet dicere, quam  
facile per intervalla costarum ad ipsum ledendum  
vel minimo quouis instrumento perueniatur? ut  
videas naturam adeo accurate cor ipsum non val-  
lasse ut cerebrum. Quarta ratio qua adducor, ut  
credam membrorum principatum cerebro debe-  
ri, est cerebri usus mirificus, quod scilicet et sensus  
tum motus principium existit: absque usu e-  
nim cerebri homo esset instar statuae cuiusdam, mo-  
tus sensusq; expers. Præterea sedes est anima ra-  
tione prædita. A cerebro visus, auditus, gustus,  
odoratusq; & locutio proficiscuntur. Vis enim a-  
ctionibus quantum cerebrum utilitatem afferat  
vel idiota ipsi norunt. Quintam demum ratio-  
nem ex huius ipsius artis quam tractemus parti-  
bus & considerationibus sumo: quibus Anato-  
micarum rerum instructissimus minime refragar  
possit.

posse confido; ea vero talis est. In hominis generatione iecur gignitur medio, & ope venæ umbilicalis (ut in tractatu De fœtu latius explicabimus) cor vero medio umbilicalis arterie; atque hæc tum vena, tum arteria umbilicales a vasis pæriperi oriuntur: at nervi, quos sensus, motusque instrumenta esse nemo dubitat, a fœtus cerebro oriuntur. Iure igitur cerebrum nobilius est membris omnibus, & ut dicam, principum Rex. Quamobrem magna illud arte natura condidit: quam Aristoteles nouisset, numquam cordi hanc nobilitatem ascripsisset: quæ cerebro propria est, neque a corde tot actiones prodire existimasset: neque cerebrum ob cordis refrigerationem factum esse, ut scilicet cordis calorem ingentem attemperaret. Sed dimisso Aristotele, cuius in hoc explosa sententia est, ad institutum redeamus. Natura circa cerebri substantiam duas apposuit membranas, crassam inquam, & tenuem, quæ vniuersam illius substantiam circumdant. Ex quibus crassa meninx, quam & duram matrem vocant, a cerebro ipso distat, quemadmodum a pæriperio cor: huius autem distantie causa est, ut cerebri diastole systoleque locum habeat. Ut enim vivimus, non modo cordi perpetua adest diastole, ac diastole, sed cerebro quoque: quod licet paradoxum videatur, tamen si diligens eris anatomicus, & incientia capitis vulnera cõplura observabis, tamen erum esse deprehendes, quæ quod verissimum,

Aristorelis

error.

Cerebrivus

nō est calo-

riscordis at-

temperatio.

Crassa &amp; te-

nuis me-

ninx circa

cerebrum.

Dura me-

ninx distat a

cerebro ve

pericardiū a

corde.

Dura mater  
futuris ad-  
hæret.  
Pericraniū  
vnde oria-  
tur.  
Dura mater  
duplex est.

Cur exte-  
rior tunica  
duræ matris  
interiore  
minus fen-  
tiat.  
Vbi redu-  
plicetur.  
Figura fal-  
cis vbi.  
Vbi dura  
membrana  
fit quadru-  
plex & cur.  
Quatuor  
cavitates  
sanguine  
plenæ, inter  
quadrupli-  
citatem du-  
ræ matris.  
Iugularū ve-  
narum in-  
gressus.  
Vesalij ex-  
ior.

idcirco dura hæc membrana caluariae connectitur suturarum ope, caluariamque egressa per cranion creat: ita dictum quod exteriorem cranii partem circumdet: cuius interiori parti dura quā diximus, membrana validissimo nexu colligatur. Neg, unica est membrana, veluti qui ante me de Anatomicis rebus scripsere, omnes vno ore predicāt: sed duplex, vel, ut apertius dicam, duæ sunt membranae dura meninx: quarum vnam internam voco, quæ cerebrum spectat, alteram externā caluariā versus, quæ minori sensu merito prædita fuit: quippe cui ossis durities attingenda erat. Altera vero, quam internam dixi, magno sensu pollet. Hæc itaque membrana in capitis vertice sub recta sutura reduplicata descendunt, cerebri dexterā partē a sinistra sciungentes: non tamen ad imum vsq, sed ad dimidium cerebri quasi ad spæra centrum dixeris: Vbi corpus adest callosum dictum. Hæc membrana rum duplicatio, quā supra memorauī, posterior sui parte versus cerebrū latior est, quā in anteriore fronte versus. Figura eius est falcis in modum, at posteriore capitis parte hæc membrana quadruplicatur: hoc est, quadruplex hoc loco dura membrana cernitur, neque iniuria: nam cerebrum, cerebello sciungit. Inter has, quatuor sinus, seu cavitates potius adsunt sanguine referta, in quā tamē venæ iugulares interna ingrediuntur (quod ingressum Vesalio in hoc parū accurato ignotum fuisse



uisse eius scripta legens facile perspicies (& ad extremum usque progrediuntur: propterea non adest oc loco sanguis extra propria vasa. Quod si esset, uemadmodum Vesalius sensit, dura mater venarum principium esse diceretur: quo quid absurdius dici, aut cogitari possit, non equidem video. Sed ad predictos sinus reuertamur. Ex his duobus primi ad basim siti sunt, ubi aditus patet venis inularibus internis, quarum incessus est iuxta occipitium, sursumque ad apicem sutura lambdoideis assurgunt, atque hic dextra cum sinistra coniungitur, tertiumque sinum efficiunt, qui iuxta vniuersam capitis longitudinem progreditur, & in foramen desinit, quod in nasi summitate interfontem, atque os eihmoides positum est. Non est hic tertius sinus orbicularis infra: nam latera illius trianguli specie sunt: pars superior semicircularem imitatur, cui rotunditati atque eminentie incipit cedit: illa etenim cavitates sub recta iacetutura. Ab hoc sinu, vel potius a vena, quam in sinu positam esse dicebamus, venae aliae complures tum a lateribus, tum infra exoriuntur, quae perueniunt membranam dispersae vagantur: cuius membranae tenuis descriptionem mox habebis: haec uas diximus, venae innumerae efficiuntur, aquibus cerebrum alitur vniuersum: supra hunc sinum venulae quoque exoriuntur, quae, ut ossa nutriant, per suturas transseunt. Quartus sinus, quadrupliciter a dura matris inter cerebrum, cerebellumque

Deducit Venas salium ad incoueniens.

Duo primi sinus inter meningem duram quadruplicem ubi.

Tertius sinus ubi.

Tertij sinus figura qualis.

Ortus venarum quae per tenuem membranam dispersae vagantur. Cerebrum a quibus alatur venis. Ossa capitis quibus venis nutriantur.

Quartus sinus durae matris

tris dupli-  
cata.

Linon seu  
torcular  
quid Vena-  
rum a tor-  
culari dedu-  
ctus.

Descriptio  
pia matris.

Pia mater  
cerebrū im-  
mediate tan-  
git.

Chorion.  
Cerebri sub-  
stantia qua-  
lis.

Figura cere-  
bri dempta  
pia matre.

Cur citi-  
us in ce-  
rebro cause  
duæ.

Tertia cau-  
sa.

Reprobatur  
tertia causa.

positus est: quem locum linon, torcularve appel-  
lant *Anatomici*: a quo vena ortum ducunt pe-  
substantiā cerebri delata, perque tenuem mem-  
branam, a qua cerebellum innoluitur; reticular  
plexui se socias prebent. Sub dura matre, quam  
accurate, quantum in nobis fuit, descripsimus.  
adeest pia mater tenuis meninx dicta, a qua cere-  
brum, & cerebellum induitur: horum enim sub-  
stantiam immediate tangit: dicitur etiam cho-  
rio, id est, secundina, tenuis, plena venarum, atq;  
arteriarū. Sub tenui dicta meninge cerebri sub-  
stantia latitat alba, mollisque & medullaris quo-  
que nuncupata, licet a substantia medulle, quæ in  
eiusdem cavitatibus reperitur, non parum discre-  
pet. Figura totius cerebri substantia, dempta pia  
matre, tenuium intestinorum spiris, dempto o-  
mento, non absimilis est. harum circumuolutio-  
num causa querenda est. Ego tum ob leuitatem  
tum ut cerebrū in diastole, systoleq; facilius mo-  
ueretur, hos gyros factos fuisse opinor. Non de-  
sunt scriptores, qui aliam causam tot cerebri cir-  
cumuolutionum se inuenisse putent, ut scilicet ce-  
rebrum intelligeret. At si ha circumuolutione:  
in cerebro intellectiois causa existunt, asini quo-  
que, ceteraq; bruta animantia, quorum cerebrū  
hisce gyris praditum est, non intelligere non pos-  
sent. Quod quam ridiculum sit, nemo non vi-  
det. Igitur causam, quam ego attuli, leuitatis ce-  
rebri, & motus promptioris, verioremi puto. Ani-  
maduer.

maduertendum interim est quemadmodum ha  
 profundiores sunt magis, minusve ita piam ma- Situs sub-  
 rem illas inuestire: substantia cerebri totam cal- stantia ce-  
 varia internam cavitatem occupat ante, retro, at- rebri.  
 que a lateribus: licet Aristoteles, qui in rebus Aristotelis  
 Anatomicis plerumque labitur, partem capit is error.  
 posteriorem cerebro carere falso affirmauerit. Sed Cerebri  
 posterior capitis pars, ut unicuique patet, non est pars poste-  
 rior: nam non modo cerebrum adest, sed cere- rior non est  
 ellum quoque. Ad huius substantiae medietatem inanis.  
 lus minus, duae occurrunt cavitates, hoc est, ven- Duoventri-  
 riculi duo, dexter inquam, & sinister, oblongi, culi cerebri.  
 n fractuosiq, ab anteriori parte ad posteriora te- Qui ante-  
 ntes. Hos ventriculos sunt qui anteriores vo- riores ven-  
 int: ego vero superiores potius appellarem, nam triculi vo-  
 hos omnes supereminent. Hi ergo satis ampli cantur supe-  
 nt, tenuique membrana induuntur: quamuis riores re-  
 Vesalius perneget, qui si sensui in hoc aduersa- ctius dice-  
 profitetur: ego nihil moror, ipse viderit. Per rentur.  
 os superiores cerebri ventriculos feruntur ple- Vesalij er-  
 us coriformes, quos reticulares appellauimus. ror.  
 us autem horum est animalium spirituum ge- Plexus cori  
 ratio. Atque hoc quod nunc dicam, quoniam formes.  
 eum inuentum est: obsecro diligenter attende. Vfus,  
 orum ventriculorum origo est supra os sphae- Inuentura  
 rides ethmoides versus: aer autem per nares at- Realdi ubi  
 ctus in frontis, cunealisque cavitatem aliquam- & quomo-  
 u conseruatur: alteratos deinde ad hos binos do genera-  
 ntriculos, quos ego superiores appellam per tur spiritus  
animales.



foramina ethmoidis ascendit: at in his ventriculis ob assiduam tum cerebri, tum huius reticularis plexus motum, miscetur cum vitalibus spiritibus aer: itaque spiritus animales euadunt ex aere eo, quo diximus modo preparato, & ex vitalibus dictis spiritibus: quæ res a nemine antea observata fuit: de his loquor qui suos de Anatomicis rebus conceptus in vulgus edidere. Ani-

**Vfus animalium spirituum.** malium vero spirituum utilitas, non vnica est: sed ad omnes sensus extenditur: in dictis namque ventribus, & cavitatibus geniti ad basim cere-

**Tertius ventriculus cerebri.** bri descendunt: vbi tertius adest ventriculus, cavitates scilicet longiuscula, rectaque ab anteriori ad posteriorem tendens cerebri partem. Non procul

**Neruorum spinalis medullæ ortus.** autem ab hoc ventriculo nerui spinalis medullæ oriuntur: propterea facile est hisce animalibus spiritibus nervos adire & penetrare, aut certe per

eos ad organa sensuum deferri atque illis opem ferre iuxta vniuscuiusq; actiones, quemadmodum per nervos opticos in oculos delati his actiones videntur subministrant: idem de auditu, de gustu, dictum puta, & de quavis actione, quæ a cerebro profisciscatur. Præter hanc tertiam nuper descriptam in cerebro cavitatem, quartam quoque obser-

**Quartus ventriculus cerebri vbi.** uare licet inter cerebellum, spinalemque medullam: quo loco exiguum adest foramen, a tertia ac quartam, quam dixi, cavitatem permeans: ne existimes tamen adeo exiguum esse hoc foramen, quin peruium non sit animalibus spiritibus, quæ

per id a tertio ad quartum ventriculum facile ad-  
 nodum transeunt. Atque hic est locus, in quo me-  
 noriam contineri aiunt: quartus ventriculus non  
 est admodum capax: atque a tenui membrana cō-  
 inetur: ibi spinalis medulla, ut suo loco dicam, ca-  
 vitate prædita est instar calami scriptorij, quasi  
 foramen esset, per quod contentos spiritus ad spi-  
 nalem medullam facile pervenire posse non dubi-  
 o: supra tertium ventriculum cerebri portionem  
 illi supereminentem videbis satis candidam, que  
 callosum corpus appellatur: huic subest alia cere-  
 bri portio fornix, & psalloides dicta semicirculi  
 figura, vel pontis potius, qui posteriore parte duo-  
 bus cruribus, anteriore vero unico dumtaxat  
 innitatur. Neque inutiliter callosum corpus,  
 fornicemque natura efformavit: sed ne tertiam  
 hanc cavitationem cerebri moles obrueret, atque  
 repleret. inter has autem particulas cerebri,  
 callosum inquam corpus, & cameratum contine-  
 tur speculum: ita vero dicitur, quod diaphanum  
 sit: est autem diaphanum, quoniam nihil aliud  
 est, quam tenuis cerebri membrana hoc loco du-  
 plex: hac duplicatione, ut ita dicamus, tenuis me-  
 brana ventriculi superiores circumdantur, qui  
 hinc deorsum redeunt: quod nisi hoc speculum præ-  
 sto esset, quo pacto dextrum, & sinistrum ventri-  
 culum diceres: non equidem video: nam huius ve-  
 nius membranæ ope diuiduntur. Post fornicem  
 in extremo cerebro cerebellum versus, atque in

Iter spiritus  
 animalium a  
 tertio ad  
 quartum ven-  
 triculum.  
 Locus me-  
 moriæ.  
 Cavitas in  
 spinali me-  
 dulla instar  
 calami scri-  
 ptorij.

Callosum  
 corpus.  
 Fornix, &  
 psalloides.

Vfus corpo-  
 ris callosi, &  
 fornicis.

Speculum v-  
 bi sit in cere-  
 bro cut. ita  
 dictum.

Speculum  
 quid sit in  
 cerebro.  
 Piæ matris  
 duplicata v-  
 sus.

Testes in cerebro.

Clunes.

Foramē analogum simile.

Vulvæ muliebri imagine in cerebro.

Glandula pinealis.

Glandulæ pinealis usus.

Error Anatomicorum in usu conarij.

Pelvis & in fundibulū ubi sit, & usus eius.

finibus superiores partis tertij vetriculi quadam partes eminentes natura finxit, qua superiore sui parte testium imaginem referunt, & testes ab Anatomicis Vocati sunt: prope quos duæ alie particule paulo maiores cernuntur, ob earū figuram clunes appellata: inter quas foramen illud iacet, quod a tertio ventriculo ad quartum progredi diximus, & ano simile videri potest. In anteriore præterea testium parte ad tertium vetriculum tendenti pars alia cerebri tibi occurret, qua muliebri pubis, vulvæq; speciem non incōcinne, immo vero pereleganter exprimit. Apud hoc corpus glandula visitur duriuscula, colore à cerebri substantia diverso, hoc est, aliquantulum luteo, tenuis quadam membrana obducta: hæc glandula conarium, pinealisq; dicitur: torculari affigitur, & penis figuram perbelle reddit: ita ut in cerebro testium, clunium, ani, vulvæ, penis figura nō desit. Usus huiusce glandulæ mea quidem sententia fuit ob vasorum divisionem, quamvis quibusdam Anatomicis secus videatur: quod scilicet factum fuerit conarion, ut spiritus quarti ventriculi clauderet: quod mihi nullo pacto verisimile videtur. In anteriore parte tertij ventriculi cavitatem profundiorē cernes, qua supra sphenoidis sellā tandē enadit: hæc cavitas pelvis, & in fundibulum appellatur: facta ut excrementa in hisce ventriculis genita excipiat, & ad glandulā in sphenoidis sella positam transmittat quæ glandulā crassa est.



est satis extra duras membranas posita, ad cerebri excrementa suscipienda a Divino opifice fabricata: atq; hic est locus ille, ubi tenuis assurgit membrana, ut hos ventriculos induat. Quamobrem valde miror admirabilem Vesalium, qui quamvis optime nōuerit peluim, quam dixi, nihil aliud esse quam tenuem membranam: ignorauerit tamen hanc ascendente ventriculos cerebri inuadere. Sed ille tantopere exoptabat Gal. contradicere, ut nil mirum sit, si is ab illa incredibili rerum nouarum, & populi gloriola taptanda captus nōnumquam longa errat via. Sed antequam ab humano cerebro describēdo discedo, hoc adnotes velim, in vniuerso cerebro quatuor duntaxat enumeratas cavitates reperiri, prater ea nullas, licet aliqui sex esse assenerent, qui faciunt ne intelligendo, ut nihil intelligant. Causa erroris horum est, quod anfractuosum deductum duorum primorum ventriculorum nō sunt a d finē usque persequuti, atque ita eo deductu imprudenter praterito existimarunt binos alios ventriculos anteriore in parte reliquos esse: qui pro-  
fecto nihil aliud sunt, quam portio primorū. Sed posteaquam cerebri historiam absoluius, consequens videtur, ut de cerebello loquamur. Hoc in posteriore caluaria sub duris membranis collocatur, a quib. & a tenui quoq; vndiq; circumdatur: eius tamen circumuolutiones dissimiles admodū apparēt his, quas in cerebro supra adnotauimus:

Vesalii error.

Quatuor duntaxat sunt ventriculi cerebri.  
Cur quidā Anatomi sex putarint esse ventriculos cerebri.

De cerebello.  
Situs.  
Induimentū.

Circumdu-  
lutiones.

Substantia. *Substantia cerebelli (quidquid Galenus dicat) minime dura existit, suisque gyris tandem deorsum desinit in processus binos, quorum figura similis est albis, breuibusque, vermibus iis, qui in lignis cariosis saepe cernuntur, quorum usus fuit ut prohiberent, ne quartus ventriculus a cerebelli pondere pressus illius substantia obstrueretur. Sed hoc quod dicam de cerebello admirabilius videbitur cum tamen verissimum esse non semel, sed sapienter magna cum voluptate in frequenti doctorum conuersione publice obseruauerim. Nullum neruorum oritur ab cerebello exoritur, sed a cerebro solū, quidquid Galenus opinetur, a quo non sunt omnia accipienda, tamquam ab oraculo. Ipse rationē reddit cur cerebellum durius, quam cerebrum natura efformauerit, ut scilicet nerui duri, spinalisque medulla inde exorirentur. Sed cerebelli substantia durior nullo pacto est, neque neruus ullus a cerebello originem ducit. Itaque ratio Galeni sensus aduersatur, qui in rebus Anatomicis rationibus verisimilibus est preferendus.*

Vermes in cerebello. *riosis saepe cernuntur, quorum usus fuit ut prohiberent, ne quartus ventriculus a cerebelli pondere pressus illius substantia obstrueretur. Sed hoc quod dicam de cerebello admirabilius videbitur cum tamen verissimum esse non semel, sed sapienter magna cum voluptate in frequenti doctorum conuersione publice obseruauerim. Nullum neruorum oritur ab cerebello exoritur, sed a cerebro solū, quidquid Galenus opinetur, a quo non sunt omnia accipienda, tamquam ab oraculo. Ipse rationē reddit cur cerebellum durius, quam cerebrum natura efformauerit, ut scilicet nerui duri, spinalisque medulla inde exorirentur. Sed cerebelli substantia durior nullo pacto est, neque neruus ullus a cerebello originem ducit. Itaque ratio Galeni sensus aduersatur, qui in rebus Anatomicis rationibus verisimilibus est preferendus.*

Nullum par neruorum oritur ab cerebello contra Galenū. *riosis saepe cernuntur, quorum usus fuit ut prohiberent, ne quartus ventriculus a cerebelli pondere pressus illius substantia obstrueretur. Sed hoc quod dicam de cerebello admirabilius videbitur cum tamen verissimum esse non semel, sed sapienter magna cum voluptate in frequenti doctorum conuersione publice obseruauerim. Nullum neruorum oritur ab cerebello exoritur, sed a cerebro solū, quidquid Galenus opinetur, a quo non sunt omnia accipienda, tamquam ab oraculo. Ipse rationē reddit cur cerebellum durius, quam cerebrum natura efformauerit, ut scilicet nerui duri, spinalisque medulla inde exorirentur. Sed cerebelli substantia durior nullo pacto est, neque neruus ullus a cerebello originem ducit. Itaque ratio Galeni sensus aduersatur, qui in rebus Anatomicis rationibus verisimilibus est preferendus.*

Substantia cerebelli non est durior substantia cerebri. *riosis saepe cernuntur, quorum usus fuit ut prohiberent, ne quartus ventriculus a cerebelli pondere pressus illius substantia obstrueretur. Sed hoc quod dicam de cerebello admirabilius videbitur cum tamen verissimum esse non semel, sed sapienter magna cum voluptate in frequenti doctorum conuersione publice obseruauerim. Nullum neruorum oritur ab cerebello exoritur, sed a cerebro solū, quidquid Galenus opinetur, a quo non sunt omnia accipienda, tamquam ab oraculo. Ipse rationē reddit cur cerebellum durius, quam cerebrum natura efformauerit, ut scilicet nerui duri, spinalisque medulla inde exorirentur. Sed cerebelli substantia durior nullo pacto est, neque neruus ullus a cerebello originem ducit. Itaque ratio Galeni sensus aduersatur, qui in rebus Anatomicis rationibus verisimilibus est preferendus.*

## De Organis odoratus, &amp; Neruis.

## CAPVT II.

Processuum mammillarum ortus. *In anteriore cerebro circa ipsius basim exortus duorum organorum cernitur, quae olfactilia Graecis, aliis processus mammillares appellantur: oblongi, tenuisque sunt, & ex ipsamet cerebri substantia constant, tenui dumtaxat membrana inuoluti. Inter cerebrum, os sphenoides, atque*

Progressus. *brana inuoluti. Inter cerebrum, os sphenoides, atque*

atque os frōtis hæc organa deferuntur, supra hæc dura membrana occurrunt intuenti, de quibus Finis.  
 supra abunde meminimus. Desiunt odoratus organa in duas crassiusculas partes, atque hæc in os ethmoides ad latus processus cuiusdā sui eminentioris: ad hæc organa odores per nares attracti ascendunt: itaque distinguimus, quæ bene, quæ male oleant, propterea odoratus instrumenta merito appellari possunt.

Vfus.

De neruis. CAP. III.

SEd quoniā de cerebro proxime locuti sumus, quod tū neruorū, tum spinalis medullæ principium existit, ut sensus contra Aristotelis dogma vociferatur, consentaneum est, ut neruorum Anatomem, quo pacto se habeat, subiiciamus. Sed prius quid sit neruus describamus. Neruus itaque organum est, per quod sensus motusq; ad vniuersum corpus desertur; quæ namque neruis carent, sensu quoque destituuntur. Figura nerui oblonga (sphericag; est, substantia mollis, porosos namque fieri neruos oportuit, ut animalibus spiritibus aditus pateret: Tenui & crassa membrana induitur substantia neruorum, ut tutior sit. Deductus eorum per corpus varius est, atq; instar riuulorū per tellurem. Neruorum origo est a cerebri basi prope tertium ventriculum, ex his dexteri dextrorsum, sinistri sinistrorsum ferūtur. Omnes qui de neruis cerebri scripsere, illos per paria describere, atq; omnes vno ore septem aiunt neruorum

Cerebrū est principium neruorū, & spinalis medullæ.

Cur post cerebrū agat de neruis.

Nerui descriptio.

Figura nerui.

Substantia nerui qualis.

Cur talis.

Cur neruos ambiat dura & tenuis membranae cerebri.

Deductus.

Origo neruorum.

Neruorum septē paria.



**Primū par** *Primum ergo nervorum par, siue coniugium,*  
**nervorum** *sunt nervi bini crassi satis, mollesque, quorum ex-*  
**cerebri.** *ortus ab anteriori cerebri basi nonnihil distat, &*  
**Substantia.** *supra sphenoidis sellam uniuntur quidem, sed*  
**Exortus.** *non in crucis morem, quemadmodum multi falso opinati sunt, qui quod in aribus forte fortuna viderant hos nervos in cruciari, in hominibus quoque reperiri existimarunt. Vbi ŷ, quos diximus, nervi aliquandiu coniuncti permansere, separantur denuo, & ad dextrum oculum dexter, ad sinistrum sinister defertur nervus. Sed de*

**Inuolucrū.** *horum inuolucris pulchrum est scitu, illos ab origine, quam dixi, ad forame in oculi orbita situm, per quod pratercunt, tenui dumtaxat membrana inuolutos esse: inde tamen ad oculum vsque, in quem terminantur, retinamque dictam membranam efficiunt, tum hac, tum dura membrana inuestiri. Hi nervi optici, hoc est, visui, seu visorij nuncupantur: quoniam virtutem visivam ad oculos ferunt. Substantia constant cerebri spongiosa quidem, sed nullus in illa porus manifestō cernitur: quamvis id Galenus assēneret: immo vero non modo in homine meatus nullus est in nervo optico perspicuus, sed neq; in bobus ipsi, aut quibusvis grandioribus animalib. Non est tamen ullo pacto negandum, cum substantia horum rara sit, mollisq;, quin spiritibus transitus pateat, præsertim purioribus: atq; hac de primo*  
*nervo-*

**Etymologia nominis.**

**In nervo optico nullus porus manifestus.**  
**Galenus error.**

**Nervi visui in boue non sunt perforati.**  
**Spiritus puri possunt transire per substantiam raram nervorum opticorum.**

neruorum pari. Nunc de secundo verba faciamus. Secundum neruorum par, primo proximum, fertur per propria foramina, nec non per rimam orbitæ ad quinque musculos oculo famulantes, & ad duos palpebram recludentes, & in quibusdam huius secundi paris ramuli præter dictum iter in musculum temporalem inseruntur. propterea sæpenumero obseruare poteris mirum consensum oculi, temporalisque musculi, ut læso temporali musculo, oculus quoque lædatur, & e conuerso. Tertium neruorum par ortum ducit retro magis versus lateralem partem: duo habet principia, quorum alterum maius est, alterum minus: caluariam penetrat deorsum descendens per id foramen quod tum huic, cum quarto neruorum coniugio commune est, in varios furculos scinditur, variaque est illius propterea distributio. Alter namque ramus ad musculum temporalem reptat, alter ad orbitam oculi, per supercilium ad frontem, musculumque palpebram constringentem, & ad musculum, qui nasum dilatat: deinde ad nasum quoque, infinitosque propemodum ramulos procreat. Alius ramus tertij neruorum coniugij, per eandem quidem orbitam iter habet, sed inferius, transit autem per tertium os maxille superioris, per id foramen, quod circa faciei medietatem positum diximus in tractatu nostro De Ossibus. quo postquam ventum est, in multos insuper neruulos diuiditur, qui per labrum superius

De secundo  
pari neruo-  
rum.

Situs.  
Vsus, & iter.

Læso mu-  
sculo tem-  
porali, lædi-  
tur oculus  
& contra.  
Tertij paris  
neruorum  
ortus.

Progressus.  
Tertij paris  
diuisio in ra-  
mos & vsus.

Foramen  
media fa-  
cie.

disseminantur, necnon per musculum massetera dictum, perque musculos buccæ: & ipsorum nervulorum portio nasci quoque cavitatem ingreditur. Alius ramus ad superiorum dentium radicem tendit, alius ad inferiorem descendit maxillam, atque huius rami portio ad inferiorum quoque dentium radicem distribuitur: quod reliquum est, prope mentum praterlabitur, ut labrum inferius sentiat. Quartum nervorum par adeo proxime accedit tertio nervorum pari, ut

Quarti paris nervorum situs.

Diuisio. quarti origo, tertij portio esse videatur. Tertio minus est, cum quo descendit versus os, & in quatuor ramulos secatur, qui per foramina quinti ossis maxillæ superioris transeunt, & per palati tunicam anteriora versus progrediuntur. Duo alij ramuli præterea apud τράχιδνα, styloidesq; processus descendunt ad linguae radicem, perq; illius

Vsus. superiorem tunicam distribuuntur. Vsus quarti nervorum paris, hic fuit, ut gustus organum ef-

Galenii & Vesalii error.

Causa erroris.

Quinti paris nervorum situs.

set. Tu vero interim adnota Galenum, Vesaliumque in nervorum distributione deceptos, quippe qui quarti coniugij munus, quod diximus, tertio ascripserint. Erroris vero causam tertij quartique paris viciniam fuisse opinor: nam nisi oculatissimus Anatomicus illorum ductus diligentissime persequatur, facile decipi poterit. Quintum vero nervorum par & ipsum ad basim cerebri, & a laterali parte exoritur circa medietatem, foramenq; cecum ingreditur, labyrinthumque in offe-

tem-



temporali sitū q̄ labyrinth⁹ in aures ipsas desinit. Vfus

Sed de hoc labyrintho quo se habeat pacto, in tra-  
statu de ossibus latius explicauimus: huius quinti  
neruorū paris adminiculo audimus. Sed illius hi-  
storiam persequamur. Cum ad labyrinthi dimi-

Progressus

dium peruenit, crassius redditur, & tantum non  
membranam constituit: hic illa est cavit as, quam

nos diligentissime descripsimus, in qua illa tria

oscula admirabilia auditui deseruientia conti-

netur: ex quibus duo Carpus primus inuenit, ter-

tium meum inuentū est, vt in libro De ossibus le-

gere est. In acutum processum illius osculi, quod

temoris similitudinē refert, neruulus desinit ab

hoc quinto pari deriuatus: a quo itē neruulus tor-

tuosus in hunc labyrinthum inseritur: exit autem

per id foramen tēporalis ossis, quod ad radices sty-

loidis positum est: hic neruulus versus anteriore

partem flectitur, & serpentis instar temporalem

musculum ingreditur. Causam huiusce rei Gale-

nus assignat, vt scilicet neruus durior euaderet,

& magis resisteret: hoc eodem loco neruulus alius

inuenitur, qui & ipse tortuosus incedit. Sextum

autem par neruorum ad posteriora basis cerebri

retroque magis conspicitur variis surculis, radi-

cibusve: & per illud foramen descendit, quod

inter occipitium, atque os temporale situm est,

vbi inquam vena ingularis interna ad calua-

riam ascendit: hac sexta neruorum coniugatio

vario modo distribuitur, ad omnia namque tho-

Ex tribus of-  
ficulis audi-  
tus seruien-  
tibus Car-  
pus primū,  
Realdus ter-  
tium inue-  
nere,

Sexti paris  
neruorum  
situs.

Distributio.

Dextri ner-  
ui recurrē-  
tis historia.

Γλωττίς  
quid

Sinistri ner-  
ui recurrē-  
tis historia.

Ramum.

racis, abdominisque viscera sensum desert. Post-  
eaquam igitur dexter nervus sexti paris a loco  
quem supra diximus, egressus est, quosdam ra-  
mulos ad musculos hyoidis, & ad nonnullos laryn-  
gis musculos mittit: postmodum descendit inter  
venam ingularem, atq; arteriam uagantia pene  
asperam arteriā ad ingulum usq; in cuius regio-  
ne nervulus mittitur sub arteria axillari dexte-  
ra, qui versus caput reflectitur, & trachea late-  
ribus adheret, in laryngisq; cavitatem sese infi-  
nuat, & in γλωττίδα (est autem γλωττίς for-  
manda vocis organum) implantatur tandē: atq;  
hac est dexteri recurrētis, seu reuersiui nervi bre-  
uis fidelisq; descriptio: sub inguli regione nervulus  
a se mittit, tū ad πλεῦραν, tum ad radices costarū  
aliū rursus nervulū mittit ad pulmonē dextrum  
quod superest descendit œsophago affixum usque  
ad superius ventriculi orificiū: sinistri autem re-  
currentis nervi historia prolixior erit aliquantū-  
lum. Sinister nervus recurrens, quum primum  
suo fonte scaturit, ramulos promit ad eosdem mu-  
sculos, ad quos dexter: descendit quoq; eodem iti-  
nere, in sinistrique inguli regione ramulos mittit  
ad πλεῦραν, ad costarum radices, & ad pulmonem  
sinistrū: deinde descendit adhuc, donec \*ρρ'γχα  
maiorē arteria aortes pene attingat: quo loco  
mittit nervū, qui sub hac arteria reflectitur, &  
sursum denuo vertitur versus originem suam  
aspera adhærens arteria: atq; item ingreditur in

er os innominatum, & scutalia dicta in parte  
 arynsis interna, & in glottidem ingreditur. At-  
 que idcirco hi sunt nerui celebres, quos tanti facit  
 maximus Galenus, per quos virtus efformanda  
 vocis desertur, propterea vocales etiam vocan-  
 tur. Hunc usum in viua canis sectione plane per-  
 picere unicuique licet. Si quis enim alterum ex his  
 proscindat, semiuocalis redditur: sin ambo, pror-  
 sus obmutescere cogitur. Gal. VII. li. de Vsu Par.  
 causam inquit, quamobrem natura sinistrum  
 recurrentem neruum ad arteriam axillarem sini-  
 stram non conuerterit, cumq; in huiusce rei equi-  
 librio inuenio sibi omnino non satisfacere: nā hoc  
 argumento dimisso glotochomij organi descripti-  
 onem aggreditur. Non est tamē ullo pacto a Gra-  
 ecis hominibus Galeno detrahendum, praesertim  
 in hac materia de recurrentibus neruis. Quam-  
 uis enim veram causam supradictae rei non atti-  
 gerit, sua tamen diligentia, & incredibili cupidi-  
 tate inuendi, posteris primus neruos reuersiuos o-  
 stendit: in qua inuentione, ut Graecis hominibus  
 mos est, se subinde effert. Ab hoc sinistro recurrē-  
 te alius oritur neruulus, qui sequitur radices ma-  
 gnae arteriae, & per cordis tunicam distribuitur:  
 sed ob sui exiguitatem ad illius substantiam mi-  
 nime penetrat: & hac vera causa est, cur natura  
 sinistrū reuersiuū neruū sub magna arteria refle-  
 xerit, nō autē sub axillari, ne scilicet neru⁹ iste ad-  
 eo tenuis, atq; exilis in cordis motib. qui perēnes

Vsus neruo-  
 rum reuer-  
 suorum in  
 viua sectio-  
 ne canis  
 cernitur  
 Gal. in red-  
 denda cau-  
 sa cui sini-  
 ster neruus  
 recurrens  
 non cōuer-  
 tat ad arte-  
 riam axilla-  
 rem sinistra  
 non satisfac-  
 cit sibi.

Galenus  
 primus in-  
 uenit ner-  
 uos recur-  
 rentes.

Alia distri-  
 butio.  
 Vera causa  
 cur sinister  
 recurrēs nō  
 flexatur  
 sub arteria  
 axillari.



Alia distri-  
butio.

Curos ven-  
triculi sit  
sensu adeo  
exacto.

Curos ven-  
triculi ap-  
pellantur  
ragna.

Alia distri-  
butio.

Alia distri-  
butio.

Septimi pa-  
ris neruorū  
situs.

A cerebro  
non a cere-  
bello oritur  
septima ner-  
uorū coniu-  
gatio.  
Galenī er-  
ror.

sunt, dum animal spirat, disrumperetur. Quod  
superest huius recurrentis nervi, descendit æso-  
phago adherens vsque ad superius ventriculi ori-  
ficium, Quam primum autem tum dexter, tum  
sinister recurrens nervus ad hoc, quod dixi, orifi-  
cium vetriculi superius pervenit, in multos ner-  
vulos quasi retis in morem diuiduntur, & hoc o-  
rifitium amplexantur, & hanc ob causam tan-  
exacto sensu præditum est, ut in oris ventriculi  
doloribus cor ipsum dolere videatur, hinc cardi-  
acus dolor dicitur quod rapsia Græci veteres o-  
ventriculi appellauerint: quoniam ipso leso ead-  
pene symptomata, eadem animi deliquia conse-  
quantur, quæ ad cordis lesionem consequi cōsue-  
uerunt. Dexter itaq; ex hoc loco ad membranam  
iecurinuoluentem tendit, & hic neruulum pa-  
rit, alium quoque præter hunc ad bilis vesiculam  
designatum, alium inferius ad sinistrum renem  
& præterea ad superiorem omenti partem: mit-  
tit insuper ramulos ad mesenterium. Eodem pa-  
cto a sinistro recurrente mittitur nervus ad lie-  
nem, ad inferiorem omenti partem, ad renem si-  
nistrum, & ad vesicā: atq; hic est finis neruorum  
recurrentium in maribus, in feminis autem præ-  
ter dicta loca ad uterum quoque delegantur. Se-  
ptima neruorum coniugatio versus occiput ma-  
gis originem habet suā, sed a cerebro & ipsa, nō  
cerebello, ut Galenus voluit, variis radicib; per  
exiguam referta est, illi proprium foramen dica-  
tum

um est obliquum in occipite: ubi vero caluariam gressa est, versus anteriora primum repit: deinde scinditur in neruulos complures ad musculos lingua, hyoidisque & laryngis delatos: quorum maior sub maxilla inferior discurret, nec non sub lingua usque ad eius extremum, ut illam sensus in uniuersum, motusq; participē reddat. Quorum vero par, ut diximus, gustandi sensum illi riuatim defert, linguae enim munus inter reliqua est saporum discretio. Atq; ha sunt breui descriptae septem neruorum coniugationes, de quibus tum veteres, tum recentiores meminere.

Tamen duo alij neruuli adhuc restant in calua- Duo nerui  
ria, & ipsi describendi, ex quib. alterum olfecit præter septē  
Vesalius noster, alterius (quod sciam) nemo ante paria.  
ne quicquam meminit. Inquit itaque Vesalius Vesalius ex-  
neruum hunc esse quinti paris radicem, forte ne cufatur.  
ab aliorum Anatomicorum placitis facile absce-  
lere uelle uideretur, aut neruorum historiam cō-  
fundere. Mihi uero octauum par neruorum cere-  
bri uidetur esse, quod unus Vesalius uidit qui-  
dem: sed inter quintae coniugationis radices ad-  
numerauit. Sub basi cerebri versus anteriora in-  
edit, & per propriū foramen in sphenoide collo-  
atum transit ad musculum temporalem, latitā-  
tēq; & massetera, & a quinto neruorum cōiugio-  
nē illius distat origo. Nonum par neruorū, cuius neq;  
Vesalius ipse uerbū fecit, quodque ego primus in-  
ueni, est neruorum exilium par, ortum ducens a  
cerebri.

Descriptio  
octauī paris  
neruorū ce-  
rebri.

Noni paris  
neruorū de-  
scriptio.

Nonum par  
neruorum  
cerebri.

Galeniet-  
ror.

Nervi mo-  
tui oriun-  
tur quoque  
ab antero-  
re cerebri  
parte.  
Omnes ner-  
ui præter o-  
pticos defe-  
runt sensum  
& motum.

Continua-  
tio huius  
tractatus  
cum supe-  
riori.

binis illis cerebri processibus, qui nates appellantur penes testes: tennes satis sunt, & exiles, ut dixi faciem versus accedunt, transeuntque apud tertium, & secundum par, atque in tertium palpebrae musculum inseruntur. ramulus tamen huius noni paris ad quintum musculum oculi deferitur. Sed si quis rei nouitate commotus, hæc duo paria nervorum non admittat, sed aliorum radices esse contendat, nihil moror. Mihi sat est locum admonuisse, digitoque fontem ostendisse, ne aliquis in cerebro nervus prætermisus negligentia nostra videatur. Animaduertendum præterea est Galenum velle nervos sensum deferentes ab anteriori cerebri parte exoriri, motuos vero dictos a posteriore. Sed pace Galeni dixerim (quem tamen semper maximi feci) sensus dictat, motuos, duosque, quoque ab anteriore parte originem ducere, ut secundum tertiumque coniugium. Adde nervos omnes, cum a visoribus, & sensum deferentibus discesseris, non modo sensum, sed motum etiam deferre. Sed cum historiâ nervorum cerebri, breui, & dilucide absoluerimus, tempus est, ut de spinali medulla pertraheremus, quæ elongatum cerebrum videtur esse. De nervis medullæ spinalis post Caluariâ.

## CAPUT IIII.

CVM Cerebrum hætenus descripserimus, & a cerebro exorta novem coniugia nervorum quanta potuimus brevitate, ac minori quæ fieri potuit, vel nullo potius contradicendi studio



io, iam illi sunt nobis nunc nervi describendi, qui a spinali medulla post calvariā exoriuntur: id antea dicamus quid ipsa sit medulla spinalis: nec nihil aliud est, quam cerebrum oblongū, illud vidē per vertebrae & sacrum os deductum. Est autē eadē cū cerebro substantia: quare nihil mirum est, si quemadmodū cerebrū ipsum absq; ulla anatomicorū controuersia frigidum est, ita frigida ipsa quoq; sit, quidquid dicat Peripateticorum princeps Aristoteles, qui cum frigidissimum esse cerebrum asseueret, calidissimā esse inquit spinalem medullam. quae sententia ita absurda est, ut tantum philosopho indigna non esse non possit. Sed ad rem redeamus. Licet spinalem medullam per se dicamus, eadem a summo ad imum nomenclatura utentes, scio tamen substantiam eius in nomine ipso non esse quemadmodum in brutis & extremum usque medullarum, sed in homine & lumborum initium usq; dumtaxat medullam fert. Differt spinalis medulla a cerebro in duobus. nam primo cerebrum diastolen & systolen habet instar cordis, ut suo loco explicauimus, at spinalis medulla motu caret: secundo per ossa quae ouentur deferri medullam hanc conspicaberis.abilia autem sunt cerebrum ambientia cranijsus ossa. Duplex igitur est spinalis medulla: principiu, ex quibus hoc maius, illud minus existit: maius a cerebro emanat, a cerebello minus. quod a cerebro deducitur unicum est, quod autem

Medulla  
spinalis  
quid.

Spinalis me-  
dulla frigi-  
da est.  
Arist. error.

Substantia  
medullae spi-  
nalis qualis  
sit in homi-  
ne.

Differentia  
cerebri, &  
spinalis me-  
dullae.

Spinalis me-  
dulla prin-  
cipium du-  
plex.

**Principium spinalis medullæ maius.** a cerebello bifidum, itaq<sup>ue</sup> tum in dextrũ, tum in sinistrum diuiditur: sed ad maiorem spinalis medullæ originem reuertamur: ita a basi cerebri proficiscitur, vt ipsa cerebri basis videatur esse: si enim origo illius vt circumscribitur, vere consideretur, a neruorum opticorũ origine parum distare comperietur. Oritur igitur, vt apertius dicamus, spinalis medulla ab anteriore cerebri parte: hic enim candidè lector, eius origo sumenda est.

**Ortus spinalis medullæ vnde.**

**Error non nullorum.**

non autem, vt nonnullis placet, cum vertebra ingreditur, quo loco nulla donatur circumscriptione. Cum itaque tam excelsò in loco eius origo constitutenda sit, ita enim vere exoritur, adnotandum est cogi nos fateri, tertium, quartum, quintum, sextum, septimum, atque octauum neruorum par non a cerebro, sed a spinali medulla exoriri. Dum hac perforamen occipitiẽ egressa, vertebrarum foramen primum ingreditur, in hoc primo descendit, su crassior est aliquantulum, quàm in reliquo itinere. Cum vero ad summum thoracem peruenit, vsque ad summitatem ossis sacri: aequali crassitudine cernitur licet Galen. & post ipsum Vesalius in hoc mire decipiantur, existimantes spinalis medullæ substantiam neruis gignendis absumi: est enim ratio in forũ voluntaria potius verisimilisque, quam vera, cum sensu oppositum pateat, quod scilicet in sacro dumtaxat osse tenuior existit. Caluariam egrediens medulla spinalis tum pia tum dura matre circumdatur, itaque neruos quos ex se producit.

**Spinalis medullæ ubi crassior.**

**Galenus & Vesalii error.**

**Inuolucrum spinalis medullæ.**

mit circumdat, cumque illi per ossa que mouen-  
 ur transeundum esset, quod cerebro minime usu  
 venit, natura aliam membranam tenuem super-  
 induit, ne ab ossis duritie laderetur. In qua mem-  
 brana tota errat via Galenus noster, in hoc parū  
 anatomicus: nam hanc, quam tertiam tunicu-  
 lam libro De Ossibus appellat, ligamentum esse  
 existimauit, quo vertebrae una conuiderentur.  
 Quae sententia falsa admodum est: nam verte-  
 brae propriis ligamentis nullo sunt pacto destitu-  
 ta, quemadmodū in nostro tractatu De ligamen-  
 tis fusius explicauimus: quis enim non uidet tu-  
 niculam hanc tenuē colligandis ossibus, qua tan-  
 to opere mouentur (saepē namq. multūq. mouen-  
 tur vertebrae ipsae) idoneam nullo pacto fuisse?  
 Spinalis igitur medulla ad extremū usq. thora-  
 cem dumtaxat medullosa est, sed cum progredi-  
 tur neruosa euadit, hoc est, funiculorum instar,  
 cuiusmodi ipsius neruos cernes: hoc autem ob ipsi-  
 us diuisionem factum puta. Ex hac historia cau-  
 sam facile venaberis, quid sit quamobrem mate-  
 ria per spinalem medullam descendēte laesio ma-  
 ior inferiore parte praesentiat. In proptu causa  
 est: quoniam hoc loco neruea est spinalis medulla,  
 cum in aliis partibus medullā praeseferat. Me-  
 dulloso autem vocem huic substantiae improprie  
 (ni fallor) adscribimus, cum illi medulla qua os-  
 sa ali dicuntur, nihil certe simile habeat, sed cere-  
 bri potius substantiae affinis esse videatur: prae-

Galenus er-  
 ror.

Spinalis  
 medulla  
 cum pro-  
 greditur, fit  
 neruea.

Cur laesio  
 inferiore  
 partes pina-  
 lis medullae  
 sit maior.



Gal. error.

Spinalis me-  
dullæ vsus.De primo  
pari neruo-  
rū medullæ  
spinalis.  
Mira natu-  
rę prouiden-  
tia.Primū par  
neruorum  
spinalis me-  
dullæ.

rea falsum illud quoque esse palam prospicies, quod Galenus secundo De Tēperamentis libro scriptū reliquit, spinalem scilicet medullam ea medulla qua ossa nutriuntur, molliorem esse. Creauit illam altissimus rerum omnium opifex, humanaque fabrica admirabilis architectus, ut ab ea nervi exorirentur, qui tum sensum, tum motum ad reliquas corporis partes deferret, qua omnia motum inquam & sensum cerebrum suppeditat. Igitur posteaquam e caluaria exiit hoc neruorum coniugium, inter occipitium primamque ceruicis vertebram primum neruorum par adeo clanculum emittit, ut mirabile videatur esse spectatōribus, atque adeo natura miracula speculantibus & introsipientibus, quo pacto exeat ne in motibus capitis lederetur. Exiit itaque hoc primum neruorum par (cur enim hoc quod est pulcherrium non repetemus?) a posteriore capitis parte inter occipitium primamque vertebram: quod ut fieret facilius cavitatem quandā paruā obseruata a natura factam tum in occipitio, tum in prima vertebra parte illa, quam in spinam desinere oportebat. Post exitum hac neruorum coniugatio in neruos spargitur ramulosque per exiguos: neque id mirū, est enim ipsa quoque exigua: ad illum musculorum chorum distribuuntur, quos paruulos esse capitique describere suo loco diximus: orientur autē a prima vertebra atque ad occipitium deferrebantur, rursus ab occipitio ad vertebram secundam

secundam. sed ad primum nervorum par redeamus. prius quā exeat supra spinalem medullam, reflectitur, quæ res spectatū pulcherrima est, & jucundissima. At secundum nervorum conium seu par, cum per vertebrarum latera egredi sequat, binis principiis insignitur. Ex quibus quod maius existit, per posteriora emergens fertur hinc atque hinc per latera spinæ secundæ vertebræ, ubi egressum est, in surculos complures dividitur, qui sursum reflectuntur & ad capitis cutem, ad aures & ad nonnullos musculos tendit. Alterum eius principium, quod est minus, per anteriora egreditur inter primam secundamq; vertebram a dentis lateribus (scitis autem nomine dentis quid sit audiendum, cum de secunda vertebræ cervicis fit mentio.) Distributio vero huius est ad quintum musculum laryngi atque æsophago communem. Tertium par nervorum spinalis medullæ exit per foramen secundæ & tertiaryæ vertebræ commune ab earum lateribus, ut de aliis audistis; deinde in quatuor surculos primo dividitur, postmodum in alios complures, adeo pulcherrima fiat huius tertij nervorum coniugij distributio tum in nonnullos capitis musculos: tum in oblongum illum quadrangularem a carneâ membrana profectum, qui labrum oblique deorsum trahit. distribuitur etiā ad longum illum musculum scapulam sursum trahentem & ad cutem colli disseminatur. Quartum par

De secundo  
pari nervo-  
rum spinalis  
medullæ.

De tertio  
pari nervo-  
rum spinalis  
medullæ.

De quarto  
pari spinalis  
medullæ.

inter quartam tertiamq; vertebrā exire videbis per foramen utrisq; cōmune, quod de subsequētib; quoq; omnib; intelligendū est, quod memoria manda: nolo. n. hoc idem de exitu neruorum per foramē duabus vertebris cōmune amplius in hoc tractatu repetere. Vbi exiit, secatur in surculos multos, ex quib; aliqui ascendūt descendūtque, alij per posteriōrē partem reflectuntur. Hac summa est, magnā esse huius quarti neruorū paris distributionem: neruuli insuper ab hoc mittuntur ad musculos cernici deseruientes, necnon ad musculum cucullarē dictum. Ex anteriorib; autem nōnulli in musculos stomacho substratos inscrūtur, & unus ex his tenuis admodū vnitur cū ramo quinti paris, & quintus cum sexto, ex quib; tribus principis nerui illi cōstituntur, qui ad septū transversum proficiscuntur descendentes iuxta mediastinū, ac supra pericardium. Quinti paris exitus est inter quartam & quintā vertebrā, hoc in multos neruos diuiditur, tum anteriores, tum posteriores. Ramus anterior qui magis est conspicuus, vnitur cum ramo quarti paris, & in quibusdam ramulum a subsequētib; suscipit. hic neruus nunc a tribus constructus descendit ad latus cesophagi per anteriora vertebrarum colli, descenditque semper ad nerueam usq; septi transversæ partem, in qua parte huius nerui terminus adest. Sed in nonnullis (ut iam supra attigi) exoritur a quarto pari. Sed hoc raro videbis

De quinto  
pari spinalis  
medullæ.  
Diuisio &  
distributio.

nam



nam sepius oritur a quinto. Quum primum autem ad thoracis cavitatem pervenit, natura prudens, ne ob assiduum pulmonum motum disrumperetur, membranis illum colligavit supra infraque, & ut dixi transit supra pericardium. Huic aervo vena se comitem præbet. At inquires cur summus rerum opifex Deus tanta arte hunc nervum muniuit? ego vero respondebo illud ob septem rarsuersi nobilitatem factum fuisse: est enim musculus rarus ac nobilis, immo vero musculorum omnium humani corporis nobilissimus existimatur. Quod reliquum est huiusce quinti nervorum paris varie distribuitur, ramum namque vena atque arteria comitante per medium illud mittit foramen, quod in posteriore scapula situm est, ibique ad musculos disseminatur e scapula exortus quique humero dicantur. Alius ramus descendit per colli latera, ut ad *trapezoida* & ad cucullarem musculos distribuatur. Alij rami tendunt ad humerum, alij ad quadratum musculum labrablique deorsum trahentem, item ad quartum musculum hyoidis, alij rami cavitati scapulae mālatur, ubi ad musculum in eius cavitatem latitātem disseminantur, & ad secundum thoracis musculum, nec non ad cutem ibi positum. Et quoniam quinta hæc nervorum coniugatio ad musculos humero deseruiētes disseminatur, placuit Vesalio illā inter brachij nervos connumerare. Ego vero quoniam nō transit una cum quinque nervis

Septū trās-  
versum.

Vesalius ex-  
culatur.  
Opinio pro-  
pria.

manus, illam inter manus nervos nullo pacto adnumerabo. Qui manus nervi quonia eorum Anatomie fidelis & perspicua exoptata admodum est, atq; expetita, quippe qua scitu digna sit, ego de illis mox priuatim agā capite peculiari, vt omnia faciliora reddantur, & perspicua magis.

## De Nervis manus. CAP. V.

Cur de nervis manus particula-  
tim agat.

Manus est organū organorum.

Manus est organum ante organa.

Cur tot organa in manu.

Cur tanta arte cōstru-  
cta.

Cur quinq; paria nervorum in manu.

Ortus quique parium nervorum.

Vbi uniuntur.

Vbi separantur.

Cur vulnera ad scapulae processum internum sint lethalia.

**M**ANVS, vt diuino Aristoteli recte videtur, organum est organorum, atque organum ante organa, qua eo quo cernitis artificio fabrefacta est, vt liberis minimeque impeditis organis praeclita esset, & vt sensu tactus acerrimo polleteret, quinque nervorum paria natura ad manum ipsam relegat, tria nimirum ad extremos digitos, duo ad extremā vsque manum. Quae quinque memorata paria nervorum a spinali medulla ortum ducunt, egressa per communia foramina vertebrarum colli subsequētium & a prima thoracis: uniuntur hac adeo postquam egressa sunt, vt hoc ab illo nervorum coniugium distinguere difficilimum sit vel illi, qui magnos progressus in Anatomie fecerit, separantur tamē deinde, videturque rete quoddam cōstituere, vel quid simile cordulis illis & infulis, qua in Cardinalium galeris Roma cernuntur. Hac quinq; paria nervorum eodem itinere sub clavicula incedunt, nec non ad scapulae processum internum, quo loco sociae quoque transeunt vena basilica, & axillaris arteria, propterea ne mireris si Anatomices perit<sup>9</sup> medicus vulnera

vulnera hac in parte accepta formidulosa esse & timoris plena aſſiſtentibus prædicet: Sed de ſingulis ſeparatim agamus. Primum igitur par nervorum manus quod inter quintam ac ſextā vertebram fertur, ubi vêtum eſt ad cavitatem ſubalis nervum emittit ad primū thoracis muſculū, alium ad ſecundū ſcapulæ, ramum quoq; aliū ad primum & ſecundū cubiti muſculum, a quibus ſectitur: tranſit deinde ( ſi eius progreſſum peræquare ) ſub primo muſculo bicipiti per internā humeri partem, ſed poſt cubiti flexuram vena communi ſe ſocium præbet, atque una ſecum ad extremam manum deducitur, interim variis in locis ramulos ad cutem ipſam mandat. Secundi paris tranſitus per eundem eſt locum, de quo in primi paris itinere verba fecimus, tres nervos ad muſculos humeroſamulantes mittit, ex quib. unū per illud ſcapulæ foramen exit, quod ſub ala latitat, varie primo diſtribuitur, deinde recta fertur ad flexurā uſq; parte humeri anteriore, inter cubitū ac radium præteriēs, in flexura vero ramulos mittit ad quartum muſculū, quintū ac ſextū, a quibus uniuerſi quinq; digiti ſectūtur. at ubi radij medium prætergreſſum eſt, nervulus emittitur ſatis apparēs, profundus, qui incedit adharens ligamēto illi, quod inter cubitum radiumq; ſitum eſt, tandem in muſculū quadratū implatur, qui, ut noſtro De muſculis tractatu expli-  
cauim⁹, penes brachiale ſitū manū agit in pronū

De primo  
pari nervo-  
rum manus.

Post cubiti  
flexurā ner-  
uus cum ve-  
na cōmuni.  
De ſecundo  
pari.



Vesalij  
ror.

quamvis Vesalio nostro secus esse videatur. Maior huiusce nervi truncus cum magis descendit atque inferiora petit, transit sub ligamento brachialis interno, quo loco ramulos parit musculis pollicis dicatos, & alios ad portionem eorum musculorum quos oblongos esse diximus, & a quinti musculi tendinibus exoriri: alios insuper ramulos mittit ad partem illorum musculorum, qui a postbrachiali exorti, primos articulos digitorum

In vola ma-  
nus nunc  
quinq; ner-  
vi, nunc se-  
ptem.

flectunt: hoc itinere peracto in ipsa manus vola in quinque nervos, quod plurimum est, sed quandoque in septem secatur. Horum quinque, duo per latera pollicis ad illius extremum usque pergunt, interim ad cutim surculi ex illis pullulant: duo alij ad indicem vel potius ad indicis extremitatem usque mittuntur, cutim interim propaginibus subeuntes: quintus vero per internam digiti illius partem graditur, qui medius appellatur, sed in quibus septenario numero donatur (donatur enim in nonnullis) sextus per externam regionem medij digiti, septimus per internam auricularis

De tertio pa-  
ri.

ter habet. Tertium par nervorum qui manui addicti sunt, per eundem locum iuxta internum humerum & inferiorem cubitum fertur, deinde supra articulum inter olecranon atque internum humeri tuberculum, ubi surculos profert, qui per primum musculum a quo scilicet latus tendo, disseminantur, item ad secundum tertiumque brachialis musculum, deinde progreditur iuxta longitudinem cubiti

cubiti internam, cuius dimidium, & amplius ubi  
 præterit, in duos ramos inæquales finditur: al-  
 ter namque maior est, alter vero minor, & eorū-  
 dē alter introrsum fertur, extrorsum alter. In-  
 terior transit sub ligamento brachialis interno,  
 ubi, ramusculus producit ad primū illorū muscu-  
 lum, quem ego primus observavi latū tendinem  
 dilatantem: deinde ad sextum a quo minimus  
 digitus ab aliis deducitur: surculos item profert  
 aliis musculis dicatos qui digitos extendūt, quos  
 tendinibus quinti musculi tertium digitorum  
 articulum flectendis oriri suo loco diximus: mit-  
 tit præterea ramusculos alios ad reliquos muscu-  
 los primum internodiū flectentes, quique ossibus  
 postbrachialis adherent, hoc peracto in tres ner-  
 vos diffecatur, & nonnunquam in quinqs, qui in  
 extremos digitos terminum habēt, per latera au-  
 ricularis, & anularis delati, licet in quibusdam  
 in medio digiti medijs sistat: mittit insuper ramu-  
 sculos ad cutē, atq; ad volam ipsam: quamobrem  
 pars interna manus adeo acuto atque exquisito  
 sensu tactus prædita est: minor ramus per exte-  
 riora illius transit, & supra brachiale reflectitur  
 in tresque ramos finditur: & nonnumquam in  
 quinqs, per superiora postbrachialis, & per latera  
 auricularis atque anularis, nec non per medijs di-  
 gitum digiti medietatem, ad quorum extremū usq;  
 deferuntur, quemadmodum de internis diximus.  
 In hoc tamen differunt, quod interni externis

Musculum  
 a quo latus  
 tendō dilata-  
 tur primus  
 inuocat.

Cur interna  
 manus a-  
 deo sentiat.

De quarto  
pari neruo-  
rum manus.

multo maiores existunt: fuitq; hoc prudentis natura optimum consilium, quippe que non ignorabat externa internis facilius ladi posse. atque haec tenus de tertio pari nervorum manus: nunc de quarto. Quartus nervus, seu quartum coniugium, omnibus nervis qui in manu cernuntur maior existit eodem cum aliis exitu atq; itinere, sed cum ad humeri dimidium plus minus deuentum est, ad exteriora illius ac superiora reflectitur, atque ex hoc loco paruuli nervuli emanant ad binos musculos cubiti flectentes, deinde ad alios musculos exteriores, & ad humeri, cubiti que cutim. delitescere quoque comperies inter alios musculos quartum hunc quem nunc describimus nervum & per cubitum ac radium tendere ramulos ad illos etiam musculos emittentem, quia medio cubito exorti pollicis suam operam praestant. Sed cum ad brachiale prouenit, illico quasi truncus in quinque ramos scinditur, ex quibus bini ad pollicem relegantur ad indicem bini, quintus autem ad medij digiti extremum usq; instar aliorum. Ex illis autem quos ad pollicem proficisci dicebamus surculi paruuli exiliunt ad musculum qui inter pollicem & indicem locum habet. Illud etiam praeter haec tenus dicta obseruato, magnam esse huius quarti nerui ad exteriores cubiti musculos distributionem. At quintus tenuis admodum est & cutaneus, cuius ramuli humeri, cubiti que cutem sensu praeditam reddunt: mittit quoque ra-

De quinto  
pari neruo-  
rum manus.



mos sub ala. quod reliquum est venam basilicam comitatur, propterea huius nervi idē est cum basilica deductus, e quo surculi varie per cutim ipsam distribuuntur, & tandē ad extremā manū desinit. Ab hoc eodē nervo quinto sub ingulo mittuntur nervi ad septimum capitis musculum, ad primum & quartum hyoidis, ad primum & secundum thoracis, ad septimū humeri, nec nō ad binos musculos cervicem in latus trahentes. atq; hic est locus e quo nervuli ad membranam carnē demandantur, deinde ad collī cutem. Itaq; sc habet nervorum manus distributio, cuius historiam breui prosecuti sumus. sed anteaquam ab hoc argumento discedamus, scito surculos & propaggines exiguas nervorum manus eodem pacto in omnibus hominibus non distribui, licet in truncis ipsis raro admodum varietas notatu digna reperiatur. si enim in hoc per medium musculum tenderet, in illo prope latera, nihil est quod in re Anatomica versatos in admirationem trahat, & quoniam in illis qui vulnerantur, quandoque sensus amittitur, licet motus integer maneat, in aliis cōtra motu amisso sensum permanere, cōplures existimarūt duas nervorū differētiās ubiq; reperiri vel ut aperti<sup>9</sup> dicam<sup>9</sup>, ubi nervos adesse oportuit, duplex adesse nervorū gen<sup>9</sup>, alterū motū afferre, ab altero sensum afferri, sed hac opinio in illis mea quidē sentētia locū habuit, qui verā nervorū distributionē ignorabāt, tu vero scito ner-

Cur in vulneratis quandoque sensus, quandoque mores amittantur, quandoque uterque.

uos ad cutim desinentes, quoniam cutis motu caret, sensum dumtaxat afferre, eos vero qui musculus additi sunt, sensum motumq, illis imperitari. Quocirca si nerui cutis sauciantur, aut si illos noxia materia laceßit & detinet atque præoccupat, quid mirum si cutis ibi nõ sentiatur? & quoniam nos dum cutim tangimus, cutis nobis dumtaxat sensus occurrit: neque enim sunt in superficie musculi, si illi nerui læduntur, qui in musculos inferuntur, illis illæsis qui feruntur ad cutim amittetur quidẽ motus, sed perstabit sensus: quod si virique noxa illata fuerit, & sensus & motus peribunt. hæc autem noxa intelligitur illata nervo priusquam musculum in loco qui retrahi possit & contrahi, quo factò uniri & coalescere nullo pacto possit: si enim nerui læsio contingat in ea parte, quæ iam musculum ingressus erat, uniri potest, neque sensus motusve amissio perseverabit, quemadmodum ego sæpenumero expertus sum in multis ægris, qui mihi in dies innumerabili multitudine curandi proponuntur, quod etiam

Læso neruo  
quando  
nõ amittitur  
neque  
sensus neque  
motus.

Cur nerui  
thoracis  
sint minores  
neruis  
manus.  
Nerui thoracis  
sunt paria undecim.  
Error Vesalij.

Ludouico Philippino, viro docto familiari meo  
Anatomes studioso lubens ostendi.

#### De neruis thoracis. CAP. VI.

**T**HORACI nerui multo minores contingere, quam manui, neque enim tantos esse necessarium fuit: sunt autem vniuersi paria undecim, non duodecim vt Vesalio placuit, quem miror non animaduertisse, cum tamen oculatissi-

mus

mus fuerit, vertebrae licet duodecim numero sint, tamen foramina undecim habere, non plura, totidemque esse costarum interualla. Oriuntur Ortus. hi quoque a spinali medulla: exeunt vero e foraminibus vertebrae thoracicae communibus: neque tamē ab his ut a nervis manus rete constituitur:

Et ne longam adeo prolixamque de nervis thoracis historiam texamus (quo enim pacto possemus prolixitatem effugere, si unum quemque sigillatim Cur de nervis thoracis agat in vniuersum. & seorsum describeremus) de omnibus simul hac audito. Post eorum egressum e foraminibus ver-

tebrarum bipartitos cernes, non tamen aequaliter: Diuisio & distributio. etenim ex his alter maior, alter minor existit, & alterum anteriora versus, alterum versus posteriora reflecti secundo facile cernes: anteriores igitur sub costis progrediuntur per partem inferiorem, ubi sinus ille per costarum longitudinem cernitur, de quo in libro De Ossibus proprio capite loquuti sumus: atque hoc comitantur rami venae sine pari, nec non rami arteriae magnae, quae tria

vasa, nervus inquam, vena, atque arteria, per eundem locum transeunt, nimirum sub succin-gente membrana a vertebrae ad sternon usque, iuxta longitudinem costarum atque earum cartilagineum, tamquam lineae parallelae & aequi distantes prope musculos intercostales incedunt in quos externos inquam, atque internos ramulos mittunt. Qui musculi numero sunt sexaginta octo, ut in nostro tractatu De musculis latius explicauimus, prae-



hanc quam hactenus descripsimus nervorum thoracis distributionem, alij sexto thoracis musculo sensum afferunt in parte eius interna collocato, quig<sup>3</sup> anteriora ipsius constringit. A superioribus autē nervi fluunt per primū humeri musculum, nec non per secundum scapule: deinde ramuli alij proficiscuntur ad mammillas & ad mammillarum papillas deducti ex his nervis, qui ordine cōsequuntur, deinde deorsum magis a nervis qui in media thoracis regione collocantur pullulant nervi qui ad musculos abdominis obliquos descēdētes demittuntur, in quo magna horum fit distributio. a postremis autem thoracis nervis alij deciduntur, quibus gaudet septi transversus pars carnea. Quod restat horū anteriorū nervorum tum ad cutē thoracis, tum ad partem cutis abdominis distribuuntur. Nervos itē mittunt ad musculos œsophago substratos, & ad radices costarū. cum his autem nervis sexta nervorum cerebri cōiunctio implicatur. Altera horum thoracis nervorum diuisio ad posteriora ipsius reflectitur, & a superioribus enixi nervi sensum deferūt primis, secundisque capitis musculis, ad musculos cervicis ad quintum sextumque humerum circum agentem, ad primum & quartum scapule, ad thoracis tertiu, & ad scapule cutē: alij proficiscuntur ad musculos dorsales, & ad quartum thoracis, ad cutim dorfi distribuitur. Illud tamē animadverendum est, hanc cutaneam nervorum distributionem

Cutanea dis-  
tributio ner-  
vorum non

tionem non esse in omnibus aquatam, propterea <sup>est in omni-</sup>  
*neg, alibi in aliis corporis partibus superficialius* <sup>bus eadem</sup>  
*certo ordine atq, examusim describi ab Anato-*  
*mico quantūvis accurato potest aut debet: nā ne-*  
*que certū ordinem, neg, numerū certū obseruare*  
*possumus, quoniā nūc in plures ramos, nūc in pau-*  
*ciores sese trūci exerunt atq, explicāt, & nūc alti-*  
*us, nunc declinuis eorū fit distributio atque iter.*

## De neruis lumborum. CAPVT VII.

**Q**VONIAM Lumborum regio, ut in libro <sup>Cur post</sup>  
*De Ossibus dicebamus, thoracem immedia* <sup>neruos tho-</sup>  
*te sequitur, post historiam de neruis illius, lum-* <sup>racis agat</sup>  
*borum neruos describere operapretium duxi.* <sup>de neruis</sup>  
*Sunt lumborum nerui thoracis neruis maiores:* <sup>lumborum.</sup>  
*& quamuis ratione superius adducta, dum de*  
*numero neruorum thoracis loqueremur, cum in*  
*quinque vertebrais lumborum quatuor dum-*  
*taxat foramina reperiuntur, quatuor neruorum*  
*aria solum, non quinque esse deberent, sunt ta-*  
*men coniugia neruorum huius partis quinque*  
*numero, quoniam inter extremas thoracis ver-*  
*tebras & primam lumborum incedit primum*  
*neruorū par; quod cum ab vltima costa recedat*  
*inter lumborum neruos potius quam thoracis*  
*dnumerandum est: adde quod ventri inferiori*  
*seruiunt, non thoraci. Hac itaq, prima coniu-*  
*gatio neruorū, qui lūbis addicti sunt, egreditur*  
*per foramē illud cōmune, quod est inter duodeci-*  
*nam thoracis vertebra, & lumborū primam,*

Cur post  
neruos tho-  
racis agat  
de neruis  
lumborum.

Nerui lūbo-  
rum maio-  
res neruis  
thoracis.  
Cur sint  
quinque pa-  
ria neruorū  
lumborum,  
licet qua-  
tuor tantū  
sint forami-  
na in verte-  
bris lumborū.

De primo  
pari neruo-  
rū lūborū.

tenuis est satis & sub peritoneo progreditur, post  
egressum finditur in ramos binos, quorum alter  
alero maior existit: qui maior est ad anteriora  
quidē fertur, sed prius ramusculos parii in prin-  
cipio septi trasuersi: quod septum a corporib. ver-  
tebrarum lumborum exoriri suo loco diximus: al-  
ios insuper ramulos mittit ad principia quinti  
femoris muscoli cognomento lumbalis, & alios  
ramos ad musculos abdominis, qui vero est mi-  
nor nervus ex hac prima coniugatione ad poste-  
riora reflexus, in musculos dorsi terminatur. Se-

De secunda  
pari neruo-  
rum lumbo-  
rum.

cunda coniugatio exit inter primam secundamque  
lumborum vertebra, sub peritoneo graditur  
& sub quinto femoris musculo, in quem ab ho-  
iisque coniugioramuli immittuntur: assurgi-  
deinde, sub peritoneo tamen, & a summo ossis il-  
lij ramus deceditur, qui abdomen exiliēs primi  
femoris musculus & tibie sexto sensum motumque  
afferunt: at ramus alius mittitur ad sextum mu-  
sculum femoris & ad tibie primum, superat ad  
parte superiore ossis ilij ad femoris cutem: ab ho-  
eodem secundo pari exoritur nervus tenuissimus  
& oblongus, qui vasa seminaria comitatur, &

Error non-  
nullorum.  
Quid sint  
cremasteres

tandem in testiculum desinit: quem nervulum  
nonnulli nequiasseas abbellant, qui mine desipi-  
untur: neque enim nervulus hic quē nūc descri-  
bimus, neque vasa seminaria cremasteres dixeris  
sed fibras illas carneas in darti collocatas: illa fi-  
bra carnea, carnea in qua illa fibra darti, crema-  
stere.



terres vere sunt, nō vasa seminaria aut neruulus  
 n̄ testem immissus. Exit tertia neruorum lum-  
 borum coniugatio inter secūdā tertiāq; ver-  
 ebram, sub peritonæo defertur, nec nō sub quin-  
 o femoris musculo. Primus ramus qui ab hoc cō-  
 iugio deciditur, transit sub os pubis prope ilium  
 s, atque hic bifurcatur (cur enim voce in scholis  
 nostris trita non utamur?) atque eius pars altera  
 per superiora fertur cute tenui in genu ipsū de-  
 inens; altera comitatur venā saphenā nun-  
 upatā, reliquā portionem huius nerui post  
 dorsales musculos cutēq; reflecti videbis. Quar-  
 ta cōiugatio ē tertia quartāq; vertebra emergit  
 ēst autem lumbalium neruorum maxima) fer-  
 ur sub quinto musculo femoris, & sub pubis os,  
 omitemq; comitatur venā atq; arteriam in i-  
 ſum inguen: quo loco neruulos profert qui tum  
 eni, tum scroto deseruiāt, sed cutanei sunt, neq;  
 rofundiora petunt. in hac eadem inguinis regi-  
 ne in septem postmodum ramos secatur, qui ad  
 mnes anteriores musculos distribuuntur, qui  
 artim tibiæ, partim femori famulantur. Ex his  
 ramis nonnullos ad genu usque descēdere obser-  
 uatote. Quinti paris egressus ēst inter vertebra  
 quartā ac quintā, deinde in duas partes in-  
 ter aliorum diuiditur. iter maioris nerui ēst sub  
 peritonæo versus anteriora transiēs per foramen  
 tū inter os coxendicis pubis, atq; ilij, atque hinc  
 neruuli deciduntur ob nonum decimumq; mu-

De tertio pa-  
 ri neruorum  
 lumborum.

De quarto  
 pari neruorū  
 lumborum.

De quinto  
 pari neruorū  
 lumborum.

*Sculum femoris, quod in gyrum mouet, nec non alios ad septimum & octauum femoris eiusdem, & alios ad penis musculos, itē ramos alios ad vesicam mittit, & in mulieribus non modo ad vesicam sed ad uterum quoque: cui prater sextum par neruorum cerebri, ab hac etiam quinta lumborum coniugatione neruuli obtigere. atq; hæc tenus de prima parte. Secunda vero reflectitur post musculos dorsales, & ad cutim, quod a quarto quoque coniugio fieri dicebamus. Atque hic sunt quam breuissime descripta quinque paria neruorum lumbalium, a quibus prius quam discedo, adnota illa posteaquam exiliere, primū par cum secundo connecti, secundo cum tertio, tertium quarto, quarto quintū eodem prorsus pacto: quæ implicatio similis est brachij neruorum implicationi. Notandum insuper est, licet hæc quinque neruorum coniugationes descripserimus, non inueniri tamen in omnibus hominibus totidem: cum quandoque quatuor dumtaxat inueniātur: propterea cum quartum & quintum par in nonnullis vniantur, ex hisce duabus vñ dumtaxat par resultat, & efficitur.*

De neruis ossis sacri, & pedis.

CAPVT VIII.

**C**VM hi nerui particulatim & accurate describi consueuerint, nos eundem ordinem sequentes, de his distincte, quantum in nobis erit, agere conabimur: qui nerui, pedis etiam nerui

Quomodo hæc paria neruorum lumborum connectantur.

Lumborum nerui non sunt semper quinque paria.

Orcus.

nerui non iniuria dici possunt. Sciendum itaque hosce exilire inter ultimas lumborum vertebrae & ossis sacri summitatem: item a primo, secundo, tertioque ipsius ossis sacri foramine: at quum primum hæc quatuor nervorum principia exiunt, uniuntur, maximum nostri corporis nervum constituentes, qui sub peritoneo ab interna abdominis parte ad externam repit versus clunes, transitq; inter coxendicem & coccygē supra quartum musculum illum, a quo femur circumagitur ubi exiit prope maiorem trochantera, nonnullos mittit neruulos ad tres musculos a coxēdice exortos tibiā flectentes, alios quoque ad octauum iuidum dictum musculum, qui & ipse oritur a maiori trochantere, deinde recta peregit per posteriora femoris inter quartum, quintumque tibiæ musculum, pene ad flexuram ipsam genu: quo loco in duos insignes ramos diuiditur, ex quibus alter maior, alter minor cernitur: maior posteriorem, minor anteriorem tibiæ partem occupat: maior rursus sub flexura genu neruulos mittit ad primos musculos extremi pedis. A minori autem trunco neruulum exortum conspicies, qui in musculum sub poplite latissimam inferitur, & alium in tertium musculum ab exteriori femoris capite exortum. Sed postquam maior truncus flexuram genu præerit, in alios nervos subdividitur, quorum unus tendit sub duobus primis musculis

Nervus nostri corporis maximus.

Musculus iuidus.



pedis, quorum parte carnea prætergressa sub cutem repit, in qua per posteriora tibiæ properat ad extremū usq; pedē: ab altero ramo emanāt surculi ad quartum musculum qui inter posteriores tibiæ musculos maior existit, deinde per posteriora interioraq; tibiæ delatus iter habet sub interno malleolo, tendens sub pedis plantam, nervos ad cutim emittēs. primo ad primum. secundum, ad tertium pedis extremum musculū, deinde ad omnes illos musculos paruulos in ipsa planta delitescētes: deinde diuiditur adhuc in nervos decem, ex quibus duo per vnumquemq; digitum ad eius extremum usque deferuntur, ramulos interrim ad cutim illorum spargentes. Alter vero ramus profundior penetrat, & permeat inter tibiā fibulamq; ligamento illi adherens, quod inter tibiā ac fibulam situm esse proprio tractatu audistis (quo ligamento posteriores musculi ab anterioribus diuiduntur) mittit quoq; neruulos ad quintum, sextū septimumq; pedis musculum. Alter truncus minor sub fibula appendice præterlabitur, ad anteriorem partem delatus, quo loco neruulos profert, qui musculis tum a tibiā, tum a fibula exortis deducantur: truncus vero deorsum descendit per ipsius fibula anteriora. Quamobrē hic maximopere animaduertas velim lector candidissime, hoc enim scitu est tā necessarium quam quod maxime si cauterium fieri oporteat, ut ne ad fibulam accedat, sed ad tibiā dumtaxat

Vfus ligamē-  
ei inter tibiā  
& fibulam.

Cauterium  
in crure vbi

dumtaxat, neque hoc sat est scire quo loco fit faciendum, sed addito dum fit causticum primū musculum præterea cautio est: nam si magis penetraret hic nervus quam nuper diximus ledere-  
tur quo læso gravia symptomata consequi solent. vel saltem cauterii locus numquam pene dolore aliquo destituitur. Reliqua portio nervi huius deorsum fertur sub ligamento, parteq; pedis anteriore transiit sub externo malleolo per extremi pedis superiora: & ex hac sede surculi mandatur decimo octavo pedis musculo. quod superest in decem nervulos separatur, qui in extremos digitos inseruntur, & desinunt. ab hoc eodem trunco nervulus alius cutaneus proficiscitur, qui ad extremum pedem usq; progreditur. Post tria foramina ossis sacri, sequitur quartum, & quintum in quibusdam, quæ diversitas a vario ossium sacrum constituentium originem ducit: neq; enim in omnibus idem est, nam in aliquibus quinq; ossibus constat os sacrum, in aliis sex, licet nunquā invenire possis os sacrum ex tribus tantum ossibus constructū, ut Galenus falso existimavit se hominem descripsit, sed simiam, non hominem descripsit. In cadavere igitur cuius sacrum os quinque ossib. cōstet, quatuor aderunt foramina, quod senario numero cōstet, quinq; foramina videbis, quæ sita sunt inter os & os, ut abunde suo loco dictum a nobis est. Igitur ex duobus foraminibus subsequentibus egrediuntur duo alia ner-

faciendum,  
& quantum  
profundum.

Os sacrum non  
constat in om-  
nibus toti-  
dem ossibus.

Nervi poste-  
rioris partis  
ossis sacri.

Nervus inco-  
iugatus secu-  
dum Galenū  
vbi esset.

Nervus inco-  
iugatus non  
natur.

Galenī error.  
Coniugatio-  
nes nervo-  
rum sub coccy-  
ge in brutis nō  
in hominib.

uorum coniugia, quæ post egressum ipsa quoque  
uniuntur nervum gignentia, qui reflectitur &  
ad musculos natium distribuitur, necnon ad cu-  
tem illarum: in internam quoque abdominis par-  
tem mittit nervulos ad musculos recti intestini,  
& in nonnullis non modo ad hos, sed ad vesica  
quoque musculos, immo in nonnullis fœminis ad  
uterum quoque, atque ad uteri cervicem, item  
ad earum vesica musculos: alij quoque surculi ad  
perinaeum atque ad scrotum deferuntur. E poste-  
riore vero parte ossis sacri per ea foramina ner-  
vuli profiliunt parvi admodum brevesque, qui ad  
musculos dorsales, ad nates ad posterioremque cu-  
tem delegantur. Et quoniam Galenus alijs A-  
natomici de nervo quodam loquuntur, quem in-  
coniugatum vocant, secundum ipsorum senten-  
tiā si vera est, in extrema spinalis medulla par-  
te deprehenderetur. Ego, ut ingenue fateor, hūc  
celebrem nervum inconiugatum hoc loci num-  
quā comperire potui, licet accurate secuerim hu-  
ius unius gratia saepenumero, sed in omnib. quos  
hactenus secui pene innummerabiles, cōperi ex-  
tremam spinalem medullam in surculos complu-  
res dextros ac sinistros distribui, quæ deinde per  
quartum femoris musculum disperguntur, & per  
cutē quæ inter nates & ad anum usque procedit.  
De illis autē nervorum cōiugationibus sub coccy-  
ge prætereuntibus, quas Galenus somniauit, nihil  
attinet dicere, propterea quod nusquam in ho-  
mine



minere reperiri possunt, cum non adsint. sed priusquam a nervorum historia discedamus, illud adnotes rogo, in quouis humani corporis musculo quamvis minimo suum nervum adesse. quod minimum est, nam in aliquibus nervos duos, in aliis tres, quatuor, ac nonnumquam quinque videre poteris, neque iniuria. Si enim nervis carerent, musculi neutiquam essent, quamvis oppositum Vesalio nostro videatur: cuius opinio in hoc imaginaria potius quam vera existit: forte is aliqui indefessus in nervorum distributione, quæ mihi admirabilis esse videtur, cum secando defessus esset, scriptum reliquit musculos aliquos ab'g. nervis reperiri. Quoniam vero nos in nostra historia de fabrica humani corporis cerebrum ipsum nervorum originem diximus, ut reuera existit, cor autem arteriarum originem, & venarum iecur, non defuturos existimo qui huic nostra opinioni aduersentur, probantes nervos, arterias, venasque spermaticas seminariasque nostri corporis partes neque a cerebro, neque a corde, neque a iecore exoriri posse, sed a semine dumtaxat. Sed nos, qui solidam Anatomem profitemur, sensusque vegeti uti in humanorum corporum dissectione conamur, has futiles & apparentes ratiunculas cum rei veritate nequaquam consentientes, & medico futuro inutiles, tamquam nullius pretij, bona lectorum venia reiicimus.

In omni musculo adsunt nervi unus vel plures.

Vesalij error.  
Vesalius excusatur.

Negligenda  
futilia quædam  
argumenta.  
& argutiola  
medico viro.

REALDI COLUMBI  
CREMONENSIS  
DE RE ANATOMICA,

Liber IX.

DE GLANDVLIS.

Substantia  
glândosa qua-  
lis.



Vfus glandu-  
larum mul-  
tiplex,

In natura nõ  
datur vacuũ,

Primæ in cal-  
uaria,

GLANDULA nihil aliud est (ut  
ad eius descriptionem immediate  
deueniamus) quam corpus rotundũ,  
oblongumue quod plurimũ est rarũ,  
& poris refertũ: diuersis in locis varias ob causas  
posita fuere adenes, siue glandule: est enim earũ  
multiplex vsus, alia venis, & arteriis instar le-  
tuli sternuntur, ut illas detineant, ne ve ledan-  
tur: alia ut sedes vacuas repleant: non enim da-  
tur in natura vacuum: alia ut humiditates sus-  
cipiant, & contineant ne ob motum loca exsicca-  
rentur: alia ut excrementa suscipiant: atque id  
genus glândulas siue adenes in variis corporis no-  
stri partibus reperias. Primæ in caluaria hoc pa-  
cto, una in cerebro, hoc est, inter cerebrum, cere-  
bellumque. quam conarion pineale appellant, de  
qua in tractatu, De cerebro verba fecimus: hæc  
sphærica est, oblonga tamen: alia in sella sphe-  
noidis

voidis extra crassam membranam iacet, in qua  
 peluis, siue infundibulū desinit. Quid aut sit sella  
 tuncalis, dictum a nobis est in lib. De Ossibus. &  
 hac illa est glandula cerebri excrementa suscipi-  
 ens, quæ postmodū ad nasum palatūq; transmi-  
 tit. In oculi vero orbita quatuor adsunt glādulae,  
 duæ scilicet singule orbitæ, dextra sinistræq; duæ  
 inquam supra, infræ reliquæ. quo loco posite sunt  
 in natura, ut humiditatem superuacua ad ocu-  
 los tendentem susciperent, illosq; humectarent,  
 utque irrigarent, ne eorum motu adeo frequenti-  
 rimis exsiccarentur: itaq; moueri deinceps desi-  
 nerent. hæc illæ sunt, quæ mærore, aliave causa cō-  
 strictæ lacrimas excutunt, atq; effundunt. Bi-  
 nas alias glandulas habet pharynx paristhmias  
 dictas cerebri humiditatē suscipientes, partesq;  
 illas humectantes, quæ humectatione maxime  
 indigent, cum continenter laborent nobis nunc  
 loquentibus, nunc edentibus, aut inspirantibus,  
 aut expirantibus. Alias insuper sub radice lin-  
 guæ comperies, quæ in nobis paruula sunt, quarū  
 eadem est cum prædictis utilitas. duæ aliæ herēt  
 laryngi, asperæq; arteria, quæ fæminis sunt, quā  
 viris crassiores: hinc laryngis pars prominentior  
 in paucis mulieribus conspicua est: nā ab harum  
 glandularum crassitie occupatur, & sub ea lati-  
 tat. sub iugulis item, ubi vena cava in axillarē,  
 & iugularē secatur, aliæ adsunt, in nobis tenues,  
 crassæ vero in brutis, quæ lactes dicuntur, & thy-

Glandula in  
 sella sphenoi-  
 dis suscipies  
 excrementa  
 cerebri.

Glandulæ cir-  
 ca oculos v-  
 tus duplex.

Lacrimæ vn-  
 de fluant.  
 Paristhmia  
 in pharynge  
 cur posita  
 sint.

Glandulæ sub  
 linguæ.

Cur latinæ  
 videatur pro-  
 minere ma-  
 gis in viris  
 quam in fœ-  
 mellis.

Thymus siue  
 lactes sub iu-  
 gulis.



Glandule circa œsophagū cur.  
Cur tot glandulæ per mesenterium.

Affusionis & pancreas maior portio inter ventriculum & spinā Parafates & affidentes.

Testes mulierum & mariū inter adenes possunt connumerari.

Cur sint post aures glandulæ,

Parotides unde fiant.

mus. Rursus in thoracis cavitāte duæ aliæ conspiciuntur medio œsophago adnixa, ut ab eo continenter œsophagus humectaretur: ita enim cibus facilius pertransit, delabiturque: at in abdominis concauo, non duæ, sed propemodum innumerales reperiuntur per mesenterium dispersæ, ob diuisionem tum venarum, tum arteriarum: inter quas insignis quadam est sub vetriculo, tum ob venæ portæ diuisionem, tum ut vetriculi propugnaculum foret, ne is spinam contingens lederetur: his nomen est *παρπάς*, hoc est, affusio. Ad radicem penis, vesicæq. extremū, hoc est, ad vesicæ collum binæ ad sunt glādule crassiusculæ, quæ *παρὰσπῆτα* hoc est, assidentes vocantur: hæ semen suscipiunt, & continent: si quisquam est, cui testes tum mariū, tum fæminarum inter glandulas connumerare libeat: huic per me adnumeret licet: nam substantia testium a glandularum substantia parum differt. Nunc, posteaquam internarum glādularum historiam expediuimus, operæpretium videtur de externis quoq. meminisse: deque illis primum, quæ post aures sitæ sunt. Sciendum itaque est penes aures, nec non sub maxilla inferiore multas adesse glandulas, quæ tum venarū, tum arteriarū diuisioni, tū quibusdam cerebri superfluitatibus suscipiendis deseruiunt: propterea emūctoria cerebri appellatur: hæ sunt satis insignes, & crassæ satis: in quibus frequenter fit illud genus abscessus, quod a loco *παρὰσπῆτα*.

Graci

Græci vocant. Præterea sub axilla non pauca ad-  
sunt easdem ob causas genitæ, quas supra memo-  
rauimus: qui locus cordis emunctorium appella-  
tur. In inguine etiam inter abdomen scilicet, &  
femur multas glandulas obseruare poteris iisdem  
rationibus, atque vsibus fabricatas: & hanc re-  
gionem iecoris emunctoriū vocant. Nec desunt  
glandule in flexura tum cubiti, tum genu, sed par-  
uæ, ob vasorum diuisionem factæ atque has glan-  
dulas in omnibus passim comperies: sed in qui-  
busdam præter has in collo, brachiis, cruribus-  
que. Sed quoniam hoc raro euenit, harum histo-  
riam præmittendam duxi. Penis autem extre-  
mitas licet glandis nomen obtineat: tamē glan-  
dula substantiam nequaquam obtinuit. Sed mā-  
millarum substantia tota glandulosa est, ac pin-  
guis, præter papillam, quas glandulas natura  
candidas esse voluit, ut sanguinem rubrum in  
album lac vertere facillime possent: etenim in  
humano corpore quodcumque transmutatur, in  
colorem transmutantis transmutatur. Positæ  
autem sunt mammae glandulosæ, ut diximus, in  
anteriori thoracis parte tum ob venustatem, cu-  
ius ratio habenda erat, tum ut lac commodius  
infanti præberetur: & inter cutem, membra-  
namque carneæ positæ sunt. Atque hæc  
hactenus De glandulis huma-  
ni corporis.

Emunctoriū  
cordis.

Iecoris em-  
ctorium.

Glans penis  
minime con-  
numeranda  
inter glandu-  
las.

Substantia  
mamillarū  
qualis.

Omne quod  
transmuta-  
tur in corpo-  
re in colore  
transmutan-  
tis mutatur.

Cut mammi-  
larū in thorace.

REALDI COLVMBI  
CREMONENSIS  
DE RE ANATOMICA,  
Liber X.

## DE OCVLIS.

Oculi nobi-  
lissimi.

Oculi organa  
visionis.

Cur in loco  
excelsso sint  
siti.

Situs.

Quæ & quot  
sint oculorū  
propugnacu-  
la.



CVLI in homine magna sunt, atque adeo ingentis nobilitatis, cum insignis, & dilecta ab omnibus visive virtutis organa existant, maximo propterea artificio a Dei optimi maximi maiestate, ac sapientia creati sunt, & in sede satis tuta siti, eaque nostri corporis eminentiore, ut instar boni custodis essent, & tamquam speculatores, quos videmus dum ciuitates atque oppida custodiunt, altiora loca ascendere, ut longius prospiciant. Penes cerebrum vero locatos fuisse oculos quid mirum? cum a cerebro ortum ducant. Animaduertendum itaque est naturam binas cavitates in capite, maxillaque superiore exculpisse, ut tuto in loco collocarentur, multisq; illas propugnaculis circumscriptis: supra namque os frontis, superciliaque collocavit, infra os primum superioris maxilla, nec non os male, hinc nares, & res,



Et res & iugale os, præterea palpebras cartilagineas, musculos ipsas constringentes, ciliaque, ut ipsa visui dirigendo deseruirent. oculorum forma in homine vere sphaerica est, idque diligenter obseruato, nihil enim in homine, cum ab oculo discesseris, vere sphaericum est. At aliorum animalium oculi non sunt undique orbiculares, sed vel obliqui, vel depresso; neque id mirum est, cum hominis figura tanto interuallo a reliquis distet animantibus.

Scito præterea neminem ante me hominis oculum descripsisse, sed omnes, beluinum oculum descripsere, magno & turpi errore, in quem ipse quoque Vesalius incidit, in eius vniuersa pene formatione cum aliis Anatomicis deceptus. Quod verum esse facile perspicies, si Galeni, Vesalii, aliorumque Anatomicorum historiam de oculo cum nostra contuleris. Et profecto non leuiter hi homines accusandi sunt, Galenus præsertim, & post ipsum Vesalius, qui tantam rem, tam illustrem, tam optatam, tam negligenter scribendam putarent, beluinum oculum pro humano dissecantes. Quo loco oculi siti fuerint, & cuius usus gratia, visionis scilicet, nemo est qui ambigat: quomodo autem visio fiat, non est facile explicandum, & adhuc sub iudice lis est: aliis namque videtur visionem fieri per emissionem, alij vero per immisionem existimarunt: quod argumentum nunc non est disputandi locus. Illud ad præsentem tractationem scire sat est, oculos videndi causa

Cilia visum dirigunt. Oculus hominis vere sphaericus.

Alij Anatomici brutorum oculos descripsere.

Galenus & Vesalius in oculi fabrica decepti.

Quomodo fiat visio, difficilis est questio.

Oculis capiti  
sunt infeli-  
ces.  
Videndi fa-  
cultas vnde.  
Nervi optici  
qualis sit sub-  
stantia.

Inuolucrum.

Origo.

Progressus.

Insertio.

Oculi consti-  
tuunt mem-  
branam reti-  
nam,  
Ex quibus co-  
stet humanus  
oculus.  
De musculis  
oculorum.

Quatuor pri-  
mi musculi.

Exortus.

Fibrae.

Membranae  
tendinosae  
quatuor mu-  
sculorum in-  
sertio.  
Vnus vnus-  
cuiusque ex  
quatuor.  
Vnus quatuor  
musculorum  
simul opera-  
tium.

factos, quae res ita est homini necessaria, ut quae illa vel natura, vel casu, vel agitudine orbat, sunt, se infelices appellitent. Videndi autem facultas a cerebro proficiscitur, a visuius spiritibus per opticos nervos ad ipsos delata, quos nervos crassos esse, molles, porosos raraque textura esse diximus: necnon a membranis tum dura, tum tenui inuolutos, qui ab interiore cerebro ad basim exoriuntur, & sphenoides os per sua ipsorum foramina orbicularia penetrantes in internam oculorum cavitatem designant, ibique membranam  $\alpha\mu\phi\lambda\alpha\sigma\pi\epsilon\iota\delta\epsilon\alpha$  nuncupatam constituunt. Oculi itaque ex multis partibus constant. Ex quinque musculis nimirum, membranis sex, tribus humoribus, ex nervis, venis, arteriis, glandulis multaque pinguedine circumquaque. Ex musculis oculo deservientibus, quos in nostro tractatu De musculis quinque esse diximus, quatuor ita dispositi sunt, ut in quatuor angulos distribui videantur, supra, infraque a dextris & a sinistris, quorum exortus a sphenotide, duraque matre oblongi sunt, fibrisque rectis constant, & substantiam ipsorum in finibus explicantes, tendineam membranam constituunt, quae in corneam post iridem desinit, quorum unusquisque cum seorsum & absque reliquorum ope suum officium facit, oculum trahunt, vel sursum, vel deorsum, vel dextrorsum, vel leviorum: at si eodem tempore in agendo coeant, tunc oculum sistunt: cum vero non una agunt tempore eodem, sed successine ab iisdem,

dem, quos diximus musculis quatuor, oculus in gyrum vertitur, quā motuū dispari tēpore diuersi atē in illis quoq; quatuor musculis obseruabis, qui brachiali mouendo addicti sunt. Itaq; ab iisdem motoribus diuerso modo se habentibus varios edi notus nullo pacto absurdum esse videri debet. Quintus vero oculi musculus, quē ego primus inueni, oculi dimidiū & amplius amplectitur, trāsverso situ, qui tamē nullo pacto despiciendus erat, cū nobilissima actionis gratia sit a diuina prouidentia constitutus: nam, ut inquit Poeta ille, Pronaq; cū spectēt animalia cætera terrā, Os homini sublime dedit, cælūq; videre Iussit, & erectos ad sydera tollere vultus. At huius musculi beneficio cælū ac beatas calorū mentes intueamur, opificemq; vniuersi purē sancteque veneremur: cuius nutu machina tanti operis cæpta perfecta que est, cuiusque bonitate mouetur, serueturque: neq; solum attolli oculus ab hoc quinto musculo potest, sed etiam sisti, & in gyrum verti, & in sua sede immotus contineri, ne huc atque illuc temere flectatur. Illud præterea meminisse oportet. secundū neruorū cōiugium in hos musculos distribui, quos inter & oculū neruumq; opticū magna pinguedinis portio collocaretur, ne assiduo & perpetuo fere motu oculus exsiccaretur, atque tabesceret. Ad sunt etiam binę glandulæ, quarum altera supra est, infra altera, per quas lachrimas misericordia ducta

Vfus quatuor musculorum successiue agentium.

Cōparat quatuor primos oculorū musculos, quo ad vsum cū quatuor musculis brachialis. Idem motor diuerso modo se habens potest motus diuersos edere.

Quintū musculum oculi Realdus primus inuenit.

Vfus quinti musculi oculorum.

Secundū par neruorum in oculorū musculis insertum.

Pinguedinis vñs in oculi fabrica.

Glandularum in oculi fabrica situs.



Lachrimę vn-  
de exprimantur.

Glandula-  
rum oculo  
feruentium  
vſus.

De membra-  
nis oculorū.

Primę oculi  
membranę  
nomina.

Coniunctiua  
membranę  
deſcriptio.

Iris in oculo  
quid ſit.

Ariſtotelis  
error de Iride  
oculi.

Vuea non eſt  
in omnibus  
concolor.

Iridis oculi  
ętymologia.

Pupilla quid  
ſit.

Pupilla non  
eſt atra.

De ſecunda  
membrana  
oculi.

Secunda mē-  
brana inco-  
gnita aliis a-  
natomicis.

Origo & in-  
ſertio.

De membra-  
na tertia.

Ortus.

negatōis cō-  
ſtituit formā  
oculi.

*effundimus, vel callide muliercula oculos exte-  
rendo exprimunt, vt ab amatoribus aurum ex-  
torqueant: hæ glandule vt oculum ipſe quoque  
irrorēt, facta fuere, Ex ſex oculi membranę pri-  
ma exterior eſt, pluribus nominibus inſignita  
nā adnata, alba, adharens, & coniunctiua appel-  
latur: hæc tenuis eſt & candida a pericranio or-  
tum ducens, & in maiorem iridis circulū deſinit  
eſt autem iris in oculo circulus ille variis colorib.  
refertus: quę colorum varietas (quicquid hac di-  
re Ariſtotele videatur) vuea membrana non hu-  
moribus (vt ille voluit) accepta ferenda eſt. quę  
vuea non eſt in omnibus hominibus concolor: nā  
in hoc nigrior eſt, in illo magis albicat, in alio cę-  
rulea, aut varia cernitur. Iridis vero nomen in  
oculo, a celeſtis iridis ſimilitudine tranſlatū fuit  
ad quod in oculi centro vides inſtar puncti per-  
nigrum, pupilla nuncupatur, cuius ope videmus:  
licet autem pupilla nigra admodū appareat, ta-  
men neque ipſa, neque quicquam, quod eidem  
ſubſit, atrum eſt, ſed pellucens atque perſpicuum.  
Secunda oculi membrana nomine caret: neque  
id mirum eſt, cum hætenus incognita fuerit:  
hæc a nerueis muſculorum oculi tenuitatibus gi-  
gnitur, & ſub adnata terminatur prope iridem:  
mēbrana tertia *κερατινός*, id eſt, cornea, duraque  
dicitur: dura etenim craſſa eſt, cum a dura  
matre exoritur: ab hac membrana ceratoide  
forma oculi conſtituitur. vnāque eſt ſui exortus  
ratione:*

ratione. Arabes autem Anatomici vnica fidelia Arabum epi-  
 duos parietes dealbantes, partē anteriorem cor-  
 neā, quod instar cornu pelluceat, posteriorem sclero-  
 ticam a duritie appellarūt. Sed vna dūtaxat est, Corneavni-  
 non duæ: & a dura membrana vt dicebam pro-  
 ficiscitur. Ceratois anteriore in parte diaphanū  
 est, perspicua, & instar cornu lucens, & subtilis, Cornea mē-  
 quo loco iris necnō pupilla sita est, hæc oculum si-  
 lit, neruum opticum inuestit, & oculū: intus cō-  
 trahit, & in ea tres humores, tresque alie mem-  
 brana continetur. Quarta oculi membrana v-  
 terea dicitur: dicitur & chorion, hoc est, secundina  
 & choriformis: a tenui meninge ortū ducit, pri-  
 mumq; neruum opticum inuestit, deinde sub cor-  
 nea dilatatur & ad anteriora vsque porrigitur,  
 verū oculum vniuersum nō ambit quemadmo-  
 dum corneam facere diximus: postea vero quam  
 ad pupillæ locum peruenit, quam vnea format  
 itque effingit, versus posteriorem partem refle-  
 titur, & ad iridis principium progreditur, ibi  
 vne duplex efficitur atq; a cornea toto illo inter-  
 vallo, quod diaphanum est, abscedit, licet in aliis  
 partibus non parum illi connectatur. Vnea no-  
 men sortita est, eo quod vne granum videatur  
 esse, cui capulus ademptus fuerit. in hac, vt dice-  
 ā, magna colorum varietas aspectatur: in homi-  
 nis namq; vnea nigrum colorem cernes, punice-  
 um, ceruleū, rubrū: at in boue, præter hos viridē  
 & cianeum. Ex qua colorum varietate defesi  
 in homine.

ror in cor-  
 nea.

Corneavni-  
 ca est.

Cornea qua  
 lis sit.

Corneamē-  
 branavtili-  
 tates.

In cornea  
 quid conti-  
 neatur.

De quarta  
 membrana  
 oculi.

Nomina.

Origo.

Progressus.

Insertio.

Quarta mē-  
 brana non  
 ambit totū  
 oculum.

Vbi quarta  
 membrana  
 sit duplex.

Cur vnea dī-  
 citur quarta  
 membrana.

Colores in  
 vneavarij in  
 homine.

In boue co-  
 lores vneæ  
 plures quā  
 in homine.





is dum ego de illa loquar mēbrana instar cilio-  
 rum, quam Vesalius somniauit: nam linea illa,  
 quæ humorem crystallinum circumstant, in hac  
 quam paulo ante descripsimus aranea collocatur.  
 Humores in oculo tres sunt, aqueus, crystallinus  
 & vitreus. Aqueum, qui & albugineus quoque  
 dicitur, natura anteriore in parte locauit inter  
 membranam vneam, ubi duplex & inuersa red-  
 ditur, corneamque: qui humor paucus admodū  
 est, & in eo suffusiones fiunt, quas cataractas re-  
 tentiores appellant. Hoc quod dicam obsecro le-  
 Tor ne excidat, me certa coniectura deprehen-  
 disse humorem hunc instar excrementi esse: nam  
 ego bis hisce oculis vidi totum prorsus effusum es-  
 se ob vulnera: tamen spatio temporis renatum,  
 ita ut eodem oculo cernere deinceps potuerit. Se-  
 cundus humor oculi crystalloides crystallinus ve-  
 nuncupatur, eo quod ita splendeat, ut lumine, &  
 perspicuitate crystallum referat: situs quoque e-  
 us est anteriora versus, pene in centro oculi, e-  
 umque humor vitreus posteriore in parte am-  
 flexatur, neq; ulla inter ipsos membrana inter-  
 acet, ante tamē ab aranea obtegatur. Figura crys-  
 tallini humoris spherica quidem est, sed depressa  
 interiorius: qua humorem aqueum respicit, lentis  
 formam refert. Huius substantia duriuscula est,  
 ruā si e sua sede dimoueris, & ad scriptos chara-  
 cteres accedat, maiores esse videntur, & facilius  
 conspiciuntur, suspicorq; hinc specillorum inuen-

na instat et  
 liorum, de  
 qua Vesa-  
 lius: non est  
 quid distin-  
 ctum a mē-  
 branis de-  
 scriptis ha-  
 tenus.

De humo-  
 ribus oculi.  
 Aquei hu-  
 moris situs.

Humor a-  
 queus est  
 excremen-  
 tum.

Humor a-  
 queus po-  
 test renasci.  
 Cur secun-  
 dus humor  
 oculi dica-  
 tur crystal-  
 linus.

Situs crystal-  
 loidis.  
 Crystallini  
 figura.

Substantia  
 crystallini  
 qualis.

Specillorum

uentio unde  
iniciū sum-  
pferit.  
CrySTALLINI  
humoris v-  
sus.

De tertio  
humore o-  
culi nomi-  
nis, etymo-  
logia.

Situs humo-  
ris vitrei.  
Cur vitreus  
humor sit  
concauus.

Aranea mē-  
brana inuol-  
uit humorē  
cristallinū  
& vitreum.  
Retina alit  
humorē vi-  
treum. hu-  
mor vitreus  
alit crystal-  
linum.

Epilogus  
partiu oculi,  
oculoque

tionem originem duxisse: vsus crystallini humo-  
ris per maximus est, atque extollendus: nam pra-  
cipuum est, ac pene princeps videndi instrumen-  
tū, propter ea idblum simulachrumque visionis  
non iniuria appellatur. Hanc partem libentissi-  
me contemplantur auditores in theatro: nam o-  
culos atque animum delectat, pulchra res est sci-  
tuque digna. Tertium hialoida, hoc est, vitreum  
vocat Anatomici, eo quod vitrum fufum spe-  
cie pra se ferat, posteriore in parte collocatur: neq;  
ibi solum, sed anterioris quoque non exigua  
portionem, ita ut ex quatuor oculi partibus tres  
occupet hialoides: partem autem cum dico, cōca-  
uam intelligo: hic humor concavus in medio fa-  
ctus est, quoniam sibi crystallino cedendum erat,  
ipse quoque splendidissimus est, spectatuz, iucun-  
dus: hunc vnā cum crystallino inuoluit aranea  
membrana, penes quem retina iacet, aqua vitre-  
us humor alitur, at vitreus vicissim alit crystalli-  
num: itaque nil mirū est si vitreus humor pel-  
lucet, cum alimentum immediatum futurum sit  
cristallini praelucis, & in nutritione gignitur  
humor ille, qui aqueus appellatur. Hi sunt tres  
humores in oculo visioni opitulantes: nam horum  
ope nisi quid obster, medio proportionato existi-  
te, visibilibus in intervallo decenter locato, facile  
& recte cernimus.

Præter musculos quinque oculo deseruien-  
tes, præter sex membranas, tres humores, glan-  
dulas

dulas binas, neruum opticum, secundum neruum deferuientium.  
 rum coniugium, pinguedinemque, vena adsunt,  
 & arteria per musculos pinguedinemque disper-  
 se, nec non per membranas, in quas multa ipsa-  
 rum distribuuntur, item per corneam atque  
 vneam.

Et hac est vera germanaque fabrica humani Peroratio.  
 oculi explicatio: quam si cum re ipsa contuleris,  
 tu quoque huic historia subscribes, quam ego pu-  
 re scripsi absque verborum circuituionibus & si-  
 ne fuco. Erroresque Vesalii in historia de oculo Vesalius er-  
 ratur in oculi  
 nullo negotio deprehendes: quem mirum est in  
 membri adeo nobilis descriptione tantopere la-  
 posum esse: nam non modo in musculis & mem-  
 branis, sed in humoribus quoque decipitur, & to-  
 ta errat via, existimans crystallinum hu-  
 morem in centro oculi exquisite sitū  
 esse: item tantum humoris a-  
 quei, quantum vitrei  
 reperiri.





406 REAL. COLVMBI CREM.  
 REALDI COLVMBI  
 CREMONENSIS  
 DE RE ANATOMICA,  
 Liber XI.

DE VISCERIBVS.

De Vuca, Tonfillisque, necnon de Tunica vestiente nasum, palatum, os, cesophagum, ventriculum, intestina & asperam arteriam.

CAPVT. I.

Cur hi non  
 agitur de ieco  
 re, corde, &  
 cerebro.



Cor, cere-  
 brum, iecur  
 instar trium  
 fontium.

Cur venæ  
 genitæ.

Cur lorum  
 vna cum

**Q**UAMQVAM Iecur, & Cor, & Cerebrum viscera sunt, de quibus in tractatu De Visceribus agendum videtur: tamen de his hoc loco non agam, quia de his separatim egi, quod sint instar trium fontium, a quibus varij profiscuntur riuuli, qui vniuersam hominis fabricam irrigant: absque his ceu lapideam, atque inutilem futuram. Propterea, vt alimentum per singulas corporis partes fluere venæ genitæ sunt, quæ naturalem sanguinem in hepate, tamquam in proprio fonte elaboratum deferrent, qui ad superiora non secus atque ad inferiora labitur. Quamobrem natura vna cum sanguine lo-

hujus partem deferri voluit, tum ut vehiculū san- sanguine de-  
 guinis lotium foret, tum ut ne sanguis alicubi si- feratur.  
 steret, & instar gelu rigeret: at eius ope sanguis a  
 magnis venis ad mediocres, atq; ab his ad mini-  
 mas usque properat. Item a corde vitalis sanguis Arteriarum  
 una cum calore ad omnes corporis partes per ar- vtilitas.  
 terias communicatur. Eodem pacto cerebrū per Nervorum  
 neruōs, spinalemq; medullam sensum motumque vsus.  
 ad vniuersum corpus transmittit: etenim absque  
 neruorum distributione, neque sentire neq; mo-  
 ueri villo pacto posses. Dimisso igitur cerebro a su- Proponita-  
 perioribus inchoātes consentaneum est, ut de il- genda.  
 la tunica dicamus, quæ os ambit, linguamque,  
 laryngem, & œsophagum: de gargareone, & pa-  
 ristihiis: ne quicquam intactum pratermitta-  
 mus, deinde loquemur de thorace, postremo de  
 abdomine. Sciendum itaque est tunicam illam, De tunica  
 qua nares intus, palatū, linguāq; circumdatur, nares, pala-  
 me iudice, dura matris portionem esse, quæ post- tum & lin-  
 quam caluariam exteriorem precipue egressa est, guam circū  
 amplificatur, crassior, & pene carnea redditur: a dante.  
 qua cū vniuersum palatum interne, & os ipsum Substantia  
 inuoluatur, ad palati extremitatem duplex euā- & origo, &  
 dit, elongataque aliquātulum partem gignit ro- deductus.  
 tundam, oblongam, crassiusculam, pendulā, va- Substantia  
 riis nominibus insignitam: etenim vna dicitur, vucæ.  
 vuula, columella, gargareon. Vfus eius est, ut hu- Nomina v-  
 miditatē a cerebro precipitantē detineret: idque uucæ varia.  
 non temere, sed ut detenta partes illas, quarum

Secundus.

motus pene perpetuus est, humectaret. Voci etiam, & pronuntiationi non parum confert: vtiliorum exemplo eleganter, facileque discere possumus, qui sauo Gallico morbo diu laborauerunt, quib. cum dira morbi lues columellā exedit, rauco admodum sunt: & crocitare potius, quam humano more loqui videntur. Tertia est insuper

Rauco  
ob morbū  
gallicū ex-  
ta uoca.

Tertius.

Paristhmia,  
vbi sint,  
quid sint,

Vsus pari-  
sthmiarum.

Pharynx.

Complura  
organa.

Cūr dicta  
sint pari-  
sthmia.  
Inuoluerū  
paristhm.

gargareonis utilitas, ne scilicet puluis, qui iam nobis inuitis quandoq. os ingressurus erat, ad asperam arteriam præceps progrediretur Viringque, duæ ad sunt glandula, quarū altera a dextris est, altera a sinistris altera: paristhmia dicuntur, tonsilla, amygdala, faucesque: earum substantia glandulosa est, facta hæc quoq. fuerunt, ut cerebri humiditate suscipiendo essent, idq. propterea quod regionem hanc quam Græci φάρυγξ, Latini fauces appellant, humectando essent: his autem finibus continetur pharynx. Basis capitis, palatig, nec nō corpora anteriora vertebrarum colli: qui loco complura organa cernes, laryngam nimirum, os hyoides, eiusq. musculos, lingua radicem, eiusque musculos, sextum neruorum par, iugulares venas internas, carotides arterias, columellā, maxillam inferiorem, eiusque musculorum portionē, styloidis processus, & œsophagum: propterea cum glandula, quas dixi, tam angusto in loco versentur, paristhmia veteres appellauere. Teguntur autem ab eodem membrana, a qua os, & palatum inuolui diximus: qua descendens œsophago occur-



occurrit: eiusque interiorem tunicam constituit:  
item ventriculi, & intestinorum tunicam inter-  
nam, & deorsum magis lata post linguā epiglot-  
tida ambit, laryngemq; & asperam arteriam, ad  
extremos usq; illius ramos per pulmones delatos.

Extrema autem trachea regio vestitur a succin-  
gente membrana: hac igitur parte satis accurate  
perpensa, reliquum est, ut de pulmone verba fa-  
ciamus.

Pleura inue-  
nit extre-  
mam tra-  
cheam.

### Depulmone. CAP. II.

**P**ULMO in thorace ipso situs est, cuius caui-  
tatis maiorem partē occupat, corporibus ver-  
tebrarū, cordi asperaeque arteriae adnexus. Diui-  
sus est pulmo in duas partes, dextram nempe &  
sinistram; propterea nonnulli sunt, qui binos esse  
iunt pulmones. Eius figura extra sphaerica est,  
intro vero caua: itaque factum oportuit, quod  
sibi cum cordi, tum pericardio cedendum erat.  
Prater eam, quam diximus pulmonis diuisio-  
nem, in quatuor lobos, pinnaeque, aut fibras, (ni-  
hil enim nunc interest, qua ex his voce appelles)  
pulmo diuiditur, ut agilius moueri possit, & cor  
ipsum facilius amplexari. Scribit Galenus pul-  
monem quinque lobis prae ditum esse, ex quibus  
tres in dextro latere esse autumat: quod verum  
esse in brutis quidem animantibus comperies: at  
in homine nequaquam. Causa diuersitatis illa  
esse potest, quod hepar a corde plurimum distat:  
quamobrem cum vena caua a vertebra distet,

Situs.  
Annexus.  
Diuisio.

Figura.

Cur pulmo-  
nes intro ca-  
ui. Cur pul-  
mo diuida-  
tur in lo-  
bos.  
Gal. error.

Cur plures  
lobi sint in  
brutis quā  
in homine.

Hominis  
pulmonis  
lobi sunt  
quatuor dū  
taxat.

Cur pulmo  
nis lobus sit  
concauus.

Gal. non fe-  
cuit homi-  
nes.

Pulmonum  
substantia  
qualis.  
Inuolucrū.

Vasa in pul-  
monibus.  
Arteriæ af-  
peræ descri-  
ptio.)

Vfus.

Arteria ve-  
nalis.

strato opus erat, quo fulciretur. Natura igitur prudēs lobo vno voluit hominis pulmonē a brutis superari, quem lobum vena caua in illis substrauit. Cōcauus autem est, vt Gal. optime dixit, quia cedit vena caua rotūditati: at quoniā in hominibus inter cor, & hepar septum transuersum dumtaxat interiacet, quinto lobo nihil opus fuit. Quare nihil erat, quamobrem Gal. ob hoc tantopere in veteres Anatomicos irueheretur. Verum ex hoc, vt ex aliis cōpluribus locis, aperte cōvincitur Galenum numquā in homine anatōmē exercuisse. Pulmonis substantia rara est, leuis, porosa, & spōgie instar, colore rubello, quod genus substantiæ πασέγχευα, hoc est, affusio a veterib, appellatur. Inuoluitur a mēbrana pleura, quā describemus, tenui satis atque admodum porosa. Per substantiam pulmonis hæc disseminantur, arteria aspera, arteria venalis, venaque arterialis. Aspera quidem arteria per colli longitudinem anteriore in parte sub larynga fertur, quæ ex anulis constat, at non perfectis omnino, vt suo loco diximus, ex cartilagine quæ in dextrum, ac sinistrū diuiditur: deinde pedetentim magis, magisque diuiditur, atque attenuatur ad pulmonis extremitatem vsque. Vfus eius est, vt aerem intro, forasque ferat: atq; hæc e supernis in inferiora procedit: ex infernis autem pene sursum fertur venalis arteria, quæ ipsa quoq; in dextrā, sinistramque partem diuisa est: deinde variis modis rami-  
fica-

ficatur, ad aspera ramos accedens, idemque facit  
 vena arterialis; hac vero tria vasa a substantia  
 rara, porosa, leuique amplectuntur, itaque primo  
 gignitur: cuius vsus est, vt recte Anatomici scri-  
 bunt, ob cordis refrigerationem: quod efficit, ae-  
 rē ad illud frigidū deferens: factus praterea fuit  
 pulmo ad inspirationem, atq; expirationem, &  
 vt voci deferuiat. Atque hos omnes pulmonis v-  
 sus nouerunt, qui ante me scripsere: prater quos  
 ego alium addo maximi momenti, de quo ne per-  
 transennam quidem meminere. Est autem pre-  
 paratio, & pene generatio vitalium spirituum,  
 qui postmodum in corde magis perficiuntur. Ae-  
 rem namque per nares, & os inspiratum suscipit:  
 nam aspera arteria vehiculo per vniuersum pul-  
 monem fertur, pulmo vero aerē illum vna cum  
 eo sanguine miscet, qui a dextro cordis ventri-  
 culo profectus per arterialem venam deducitur.  
 Vena enim hac arterialis praterquam quod san-  
 guinem pro sui alimento defert, adeo ampla est,  
 vt alius vsus gratia deferre possit. Sanguis huius-  
 modi ob assiduum pulmonum motum agitur, qui  
 tenuis redditur, & vna cum aere miscetur, qui  
 & ipse in hac collisione, refractioneque prepara-  
 tur: vt simul mixti sanguis & aer, per arteria ve-  
 ralis ramos suscipiantur: tandemque per ipsius  
 truncum ad sinistrū cordis vētriculum deferan-  
 tur: deferuntur vero, tā belle mixti, atq; attenu-  
 ati, vt cordi exiguus praterea labor supersit: post

Vena arte-  
 rialis.

Vsus pul-  
 monis.

Nouus vsus  
 pulmonum  
 generatio  
 scilicet ani-  
 malium spi-  
 rituum.

Quomodo  
 generantur  
 spiritus ani-  
 males.

Ex venæ ar-  
 terialis am-  
 plitudine  
 vsus inuesti-  
 gatur.



Vitales spiritus in corde perfecti per aortam arteriam ad omnes partes corporis feruntur. Corroboratur opinio quod spiritus vitales in pulmonibus gignantur.

Arterialis venæ usus reperitur.

Quomodo iudicet medici sanguinem ferri e pulmone.

quam exiguum elaborationem, quasi extrema imposita manu vitalibus hisce spiritibus, reliquum est, ut illos ope arteria aorta per omnes corporis partes distribuatur. Non vereor quin nouus hic pulmonum usus, quem nemo Anatomicorum habet. Etenus somniauit, incredulis, atque Aristotelicis paradoxo videri debeat, quos oro, rogoque, ut pulmonis magnitudinem contemplantur, quæ absque vitali sanguine permanere non poterat: cum nulla sit tam minima corporis particula, quæ illo destituitur. Quod si vitalis hic sanguis in pulmonibus non gignitur: a qua parte transmitti poterat, præterquam ab aorta arteria? at ab aorta arteria ramus nullus, neque magnus, neque paruulus ad pulmones mittitur. Nam quo pacto per venam, aut per arteriam venalem deferri sanguis vitalis ad pulmonem potest, cum neutra pulset? hæc igitur candide lector, quam dixi, arterialis vena constructa fuit, ut sanguinem eo, quo diximus, pacto elaboratum intro afferret ad cor ipsum: non ut a corde eliciat & extra ferat. Ad hæc, quæ diximus, illa etiam accedit ratio, Medicos tunc e pulmonibus manantem sanguinem coniectare, atque adeo certo scire, longo rerum usu doctos, non modo quod cum tussi eliciatur, sed etiam quia floridus est, tenuis, & pulcher, ut de sanguine arteriarum quoque dicere consueuerunt. Quas rationes qui sincero animo considerare voluerit, acquiescet, sat scio, veritatique locum dari patietur. At Galenus

genus magnus philosophus, medicorumque prin- Galeno &  
 ceps cum ab Hippocrate discessimus: hunc pulmo- Hippocrati  
 nis vsum ignorasse verisimile non videtur. Esto, licet ob ve-  
 magnus est philosophus, maximusque medicus: ritatem cō-  
 neque hac, aliāq; multa hominem latuisse admi- tradicere.  
 rabile est. Verum, est quoddam hominum genus Pessimum  
 deo vecors, & rude, ut neque inuenire ipsi noui hominum  
 quicquā velint, aut possint: propterea quidquid genus.  
 magni nominis medicus scripsit, illi statim sub-  
 cribunt, neq; ab eius dogmatibus, vel tantillum  
 discedunt. Tu vero candide lector doctorum ho-  
 minum studiose, veritatis autem studiosissime,  
 experire, obsecro in brutis animantibus, quae vi-  
 a ut feces, moneo, atq; hortor: experire inquam,  
 non id, quod dixi, cum re ipsa consentiat: nam in Arteria ve-  
 lis arteriam venalem illiusmodi sanguinis ple- nalis sangui-  
 am inuenies, non aere plenā, aut fumis, ut vo- ne plena est,  
 unt, si Deo placet, capinosis, illi dumtaxat pulsus non aere.  
 est. Nam hic a corde proficiscitur: quemadmo-  
 dum peroptime maximus Gal. probat eo libello,  
 An sanguis in arteriis contineatur contra Era-  
 stratum. Pulmonis tunicam parui neruuli at- Neruuli pul-  
 tinguunt, ut diximus, qui intro non penetrant: monis tuni-  
 propterea pulmo exiguo sensu praeclitus est: ta- cam attin-  
 men membrum est maxime vtile, atque adeo ne- gunt non  
 cessarium: sed hac pulmonis tunica, cum po- penetrant.  
 rosa sit, nihil mirum est, si in Pleuriti- Cur pulmo  
 de & peripneumonia sanguinē parum sen-  
 suscipere valeat. tiat.  
 Cur pulmo  
 nis tunica.

## De pleura, &amp; mediastino.

## CAPVT. III.

Quid in  
thorace cō-  
tineatur.

**I**N thoracis cavitare præter cor, pericardion, arteriam aortam dictam, cauam venam, venamq; tum arteriosam, tum sine pari, præter arteriam venosam, venas, arteriasq; axillares, ite eas, a quibus aluntur costarum interualla. præter illas, quæ sub sternō discurrunt, ac præter illas, iuxta mediastinum deorsum tendentes, præter nervos, œsophagum, arteriā asperam, pulmones, glandulasq; membranæ quoque adsunt, pleura scilicet succingens appellata, mediastinumque. Est autem pleura membrana similis, tenuis, nerveaque, quicquid in thoracis concauo continetur

Pleura quid  
sit.

Vfus & de-  
ductus.

Pleura non  
est simplex.

Vesaliij er-  
ror.

Galenus  
non erat  
reprehen-  
dendus.

Pleura est  
duplex ubi-  
que.

Venæ, arte-  
riæ & nerui  
feruntur in-  
ter pleuram  
internam &  
externam.

complexa: hæc vertebrarum corpori admodum hæret, & sub costis labitur: septum transuersum superne inuestit. Membrana hæc pleura nequam simplex est, licet Vesalius simplicem esse, scriptum reliquerit, qui in hoc Galenum iniuria accusat, cum ipse, ut parum diligens, non accusari non possit: quod si adeo diligens in hac re fuisset, ut in aliis plerisque, comperisset pleuram duplicatam esse. Cum duplicem hanc succingentem membranam dico, ne existimes me dextram illam tantum, & sinistram appellare, sed ubique duplicem esse pleuram aio, duas scilicet esse membranas, quarum altera interna est, externa altera, inter quas vena, arteria, neruique præterlabuntur: quæ omnia inter costarum interualla



cilla ducuntur: atq; hic saepe fit pleuritis. Si cau- Vbi saepe  
 am queris, quare duplicem hanc membranam fiat pleuri-  
 natura genuerit, ob osium duritię opinor, ne in- tis.  
 erna pleura, qua adeo sentit, vt nihil supra, ob Cur pleura  
 ulmonis continentem motum laderetur. Hęc sit duplex.  
 membra, vel potius hæmembra, iuxta late- Interna  
 a sterni deorsum repit spinam versus, atque in- pleura est  
 ter se dextra a sinistra distat, illeque spina affigū- sensus exa-  
 ur, vt thoracem in duas cavitates, pulmonem- cissimi.  
 ue duas in partes secarent: neque id temere fa- Progressus  
 um putes, sed mira natura diligentia, vt lesa pleura.  
 altera parte, ita vt sit, illa salte altera, immu- Dextra pleu-  
 is que relinqueretur: hac vero pleura reduplica- ra a sinistra  
 o, vt ita dicam, hoc loco mediastinum appella- distat.  
 tur: quoniam thoracem mediat, & a summo tho- Cur pleura  
 ce ad imum ducitur. Inter mediastinum, id est, ope thorax  
 unc duplicem pleuram thoracem in duo secan- in duas par-  
 m, materia aliqua colligi potest, qua perforato tes diuida-  
 rno tuto satis extrahi potest a diligēti Chirur- tur.  
 reique Anatomica peritissimo. Præter has mē- De media-  
 anas costæ perioſtio quoq; præditæ sunt: in supe- stino quid  
 re thoracis parte subingalis, vbi tum vena, fit.  
 arterie, diuiduntur, glandosam partem adesse In mediasti-  
 aspicias, quam θυμὸν vocant. Estque θυμὸς in no materia  
 tulus, & id genus animalibus esu suavis. Ad colligi po-  
 ediū œsophagū binæ adsunt paruula glādula, test & extra-  
 us humectandi gratia a natura eo loco colloca- hi.  
 Quid autem sit œsophagus mox audies. Costæ ha-  
 bent perio-  
 stion.  
 Thy-  
 gula vbi.  
 Timus in  
 vitulis esu  
 suavis.  
 Vfus glan-  
 dularum ad  
 mediū œso-  
 phagum.

## De œsophago, &amp; ventriculo.

## CAPVT IIIII.

Oesophagi  
nomina.

Quæ sit in  
vniuersum  
origo & si-  
tus

Oesophagi  
descriptio.  
Iter œso-  
phagi.

Cur ad leuā  
reflectatur  
œsophag.

Terminus  
œsophagi.  
Tunicæ œ-  
sophagi.

Fibræ tuni-  
cæ interio-  
ris quales,  
& cur.

Tunicæ ex-  
ternæ œso-  
phagi qua-  
les & earum  
usus.

Oesopha-  
gus est con-  
tinuus ven-  
triculo.

**O**esophagus, stomachus, gula, vel meri, vnde Arabes vocant, est via potus, cibique: origo eius est in ima pharyngis cavitare, post laryngem, cui adnectitur, neque illi solum, sed etiam anteriori corpori vertebrarum colli. Est œsophagus membranea pars, nerueaque & ex æguis, cuius terminus est superius ventriculi orificium. Iter œsophagi est inter vertebrarum corpora, arteriamque asperam, recta, quousque cordi accedit, nam ibi, ut cordi cederet, ut par erat, dextrorsum tēdit.

deinde prope transversum septum ad leuam de-  
nuo reuertitur, neque enim illi per iecur progredi  
recto itinere licebat: ob iecur itaque, quod obstat,  
cogitur œsophagus supra spinā, sub vena quidem  
concaua, at supra arteriam descendentem  
præterire, septumque transversum penetrat, per-  
foratque, & in superius ventriculi orificium, vi-  
dixi, implantatur. Duabus propriis tunicis præ-  
ditus est œsophagus, externa, internaque. Est au-  
tem interna crassior multo, quam externa. Inte-  
rioris fibræ sunt rectæ, quæ manuum vice fungun-  
tur in cibi attractione, quem ab ore susceptum ad  
ventriculum deferant: propterea a summo ad im-  
mū feruntur: externa vero gula tunica transuer-

sis fibris prædita est, ut cibus potusque, facilius de-  
orsum trudatur. Est autem œsophagus non mo-  
do ventriculo contiguus, sed continuus: quem  
admodum

modum ventriculus intestinis, quæ ad podicē  
lesinunt. Ventriculus, qui & venter dicitur a  
Latinis, a Græcis γαστήρ, & κοιλία, situs est in ab-  
domine immediate subtransuerso septo, adeo de-  
scendit, ut pene ad umbilicum perueniat: pro-  
pterea medio pene corpore inter utrumq; hypo-  
chondrium transuersim collocatur: maior tamen  
eius pars sinistrum præcordium occupat, licet Ga-  
lenus secus sentiat: idq; sapienter factum est, quo-  
dum iam ob iecoris magnitudinem, lienisq; paruita-  
tem, spatiū maius in sinistro latere, quàm in dex-  
tro relinquebatur. Eius figura cucurbitæ oblon-  
gæ, rotundæq; eleganter respondet. Sphericus et-  
nim est ventriculus, licet oblongus: hac autem  
figura membra tum magis capacia sunt, tum ad  
perpetuandum minus idonea. Duobus orificiis in-  
signitur, dextro sinistroque, seu maius superiore,  
etque inferiore: sinistro potum, cibumque susci-  
pit: dextro vero iter præbet cibo, quem ipse con-  
fecerat, & in chylum conuerterat. Bina hæc, quæ  
nunc describimus, ventriculi orificia, ne cibus vel  
incoctus elaberetur, vel retro cederet, crassiora  
facta sunt, fibrisq; orbicularibus, a quibus recte  
retinetur, natura vero iubente dilatantur, per-  
mittuntq; cibos tum ingredi, tum egredi. Illud  
interim adnotes velim, inferius orificiū ventri-  
culi in destitutiore regione situm neutiquam esse,  
quemadmodum aliqui pinxerunt: sed superiora  
versus spectat, neque glādulam illud circumple-

Ventriculus  
est cōtinuus  
intestinis.  
De ventricu-  
lo.  
Nomina.

Situs.

Maiores pars  
ventriculi oc-  
cupat præcor-  
dii sinistra.  
Galeni error.

Cur maior  
pars ventri-  
culi sit in si-  
nistro hypo-  
chondrio.

Figura ven-  
triculi qua-  
lis.

Redditur  
ratio figuræ  
ventriculi.  
Ventriculi o-  
rificia duo.  
Vfus vtriusq;  
orificij.

Cur orificia  
ventric. sine  
crassiora.  
Fibræ orifici-  
orum quales  
& cur.

Error quorū-  
dam de situ  
inferioris o-  
rificij.  
Situs verus  
orificij infe-  
rioris.



Galeni error  
de gland. in-  
ferioris orifi-  
cij.

Tunica ven-  
triculi quot  
& quales.

Vnde oriatur  
tunica com-  
munis ventriculi.

Fibra prima  
tunica & quales  
& cur.

Fibra secun-  
da quales &  
cur.

Fibra tertia  
tunica ventr.  
quales & cur.

Galeni & Ve-  
salij error.

Ventriculus  
præditus est  
quatuor vir-  
tutibus natu-  
ralibus.

Galeni error.

Quid tegat  
ventr. ulum.

Ventriculi v-  
lus.

Cur ventricu-  
lus sit am-  
plus.

*Etentem videbis, licet a Galeno describatur, Tri-  
bus tunicis, illisque nerueis præditus est, quarum  
una aliquantulum carnea est: ex his tunicis dua  
propria ventriculi sunt, alia communis, qua a pe-  
ritonaoprofisciscitur, estq; fibrarū expers. Prima  
obliqua fibra contingere, ut cibum, potumq; tā diu  
continuant, quam diu coquantur. Secunda trans-  
uersis fibris constat, ut postquam confectus fuit,  
extra propellatur. Tertia fibris caret, ut dixi, &  
inuolucrum dumtaxat vice fungitur. Galenus, &  
post illum Vesalius rectas fibras interna ventri-  
culi tunica inesse crediderunt, ut attrahēdi mu-  
nere fungerentur. Verum œsophagus, quacum-  
que deuorantur, ad illum deducit: propterea a  
rectis fibris non eguit. Non est tamen negandum,  
quin quatuor illa naturales virtutes, quæ reliquis  
membris adesse consueuerunt, ventriculo quoque  
adsint, attractrix scilicet, retentrix, concoctrix,  
atque expultrix. Præterea secunda tunica, quam  
carnosam aliquo pacto dicebat, non est tamen in  
fundo carnea magis, quam in superiori parte:  
quidquid Galenus scripserit. Tegitur ventricu-  
lus a iecore, lieneque: & eiusdem particulam o-  
mentum contegit. Vlus eius est cibum, potum-  
que in albam substantiam lacti similem, quam  
chylum vocant, immutare. Estque nostri corpo-  
ris culina: idcirco amplus, capaxque rerum mul-  
tarum effectus est, præsertim in heluonibus, vo-  
racibusq; hominibus, quorum aliqui consumen-  
dis*

DE VISCERIBVS LIB. XI. 419

dis frugibus nati, quorum Deus venter est, tan-  
um cibi vorant, tantū potus ingurgitāt, quan-  
um quatuor viris satis superq; esset. Præter ori-  
ficia, tunicasq; hæcenus descriptas, nervos habet  
ventriculus a sexto pari deductos, venas a porta,  
arterias a magna, vi iam dictū est, arteria: neg-  
d inutiliter. Etenim a nervis sensum, ab arteriis  
vitalem calorem sortitur, venæ vero tum illi nu-  
rimentū deferunt, tum chylo suscepto illum ad  
ecur deferunt. Qui vero existimant ventricu-  
um chylo nutriri, decipiuntur. Nulla enim cor-  
oris pars præterquā a sanguine alitur: propterea  
venarum copia exuberat. Quandoque euomit,  
ad motus ille violentus est, & contra naturam,  
tunc autē obliquæ, transuersæque fibra vna, ma-  
nog; conatu propellunt, & recta œsophagi oppo-  
sio motu agunt, quā natura postulet. Cum. n. na-  
ura deorsum pelleret oporteret, in eo nixu deor-  
um trahunt. atque hæc de ventriculo sat sunt.

Nervi vētri-  
culi.

Ventriculus  
non nutritus  
chylo.  
Cur ventricu-  
lus abundet  
venis.

De intestinis. CAP. V.

VM Intestina sint ventriculo continua,  
quemadmodum supra dicebamus, consen-  
aneum est historiae quam de humani corporis fa-  
rica scribimus: ut nunc de intestinis loquamur.  
Intestina igitur a ventriculo exoriuntur, eadem  
que pene substantia videtur: licet aliquantulum  
enuiore. Situs eorum est ab inferiori ventriculi  
rificio ad anum usque, abdominisque maiorem  
artem occupāt. Veteres Anatomici intestina in

Continuatio.

Intestinorū  
ortus.

Situs.

Diuisio intestinorum secundum veteres Anatomicos. Diuisio propria. sex partes distinxere, distinctisq; singulas nominibus appellauere. Ego vero si post tot seculorum recepta vocabula noui aliquid in medium proferre fas esset, intestina duo esse dicerem, quorum alterum tenue est, crassum alterum. Sed ut aliorum vestigia sequamur (neque enim temere veterum placitis discedendum est) sex esse dicemus intestina, duodenum inquam, ieiunum, ileon, cæcū, colon, rectumq;.

Duodenum.

Cur duodenum dicatur. Nomina varia duodeni.

Progressus intestini duodeni.

Ieiuni intestini origo.

Cur ieiunum dicatur. Cur ieiunum semper fere vacuum videatur.

Cur bilis ad ieiunū transmittatur.

Duodenum, ut ab hoc incipiamus, nam ventriculum subsequitur, ita appellatur, quoniam longitudinem eius duodecim digitorum apicibus metiri possumus: Græcè dicitur δωδεκαδάκτυλος: dicitur & ianitor: portanarius, πύλαρος, ἐκφυσις: quæ nomina nonnulli ad inferius orificium ventriculi transferunt Duodenum post suum a ventriculo exortum, spiram versus descendit, quo postquam peruenit assurgit, & gyris initium dat, ibiq; terminū habet, unde est origo ieiuno intestino, quod longum admodum est, sed duodeno tenuius. Ieiunum dicitur, quoniam in cadauerū dissectione vacuum semper reperitur: hoc autem contingit, propter ea quod chylus hac præteriens adhuc fluidus est, satis, deinde ob bilis vesicula meatum, qui in huius principia desinit: transmittitur autem bilis ad eum locum natura providentia, ut vis expultrix ad suum munus excrementorū eiiciēdorum excitetur: hisce itaque duabus de causis hoc intestinum ieiunum antiquiores appellauerunt: cuiusmodi ileon.



leon succedit ob varias spiras ita nuncupatum: Ilei siue.

tenim satis longum existit: sed illud scias velim,

lei principium, nec non ieiuni fines non ita cuiq;

Cur dicatur  
ileon.

in Anatome peruios esse: nam eadem substan-

cia, colore eodem conspiciuntur Neq; ego alia via

Quomodo  
distinguantur  
fines intesti-  
ni ieiuni &  
principium  
ilei.

discrimē horum inuestigo, quam quod venæ me-

irica in ieiuno ipso tum maiores, tum frequen-

tiores, quam in ileo spectantur: cuius ilei fines a

Quæ dicatur  
intestina te-  
nuia & quæ  
crassa.

coli principiis excipiuntur. Atq; hæc tria intesti-

na, quæ hætenus memorauimus, tenuia omnia

sunt. Tria vero alia, quæ consequuntur, crassa

sunt, cæcum inquam, colon, & rectum. Cæ-

Cæcum qui-  
bus nomini-  
bus donatū.

cum monoculum quoque dicitur, & saccus: vno

namque foramine dumtaxat donatum est quod

foramen coli ipsius pars esse videtur, cui sua ad-

est appendix longiuscula, tenuisq; ob quam Ve-

Appendix  
cæci.  
Vesalii opi-  
nio suspecta.  
Quid vere in-  
telligendum  
sit nomine  
intestini cæ-  
ci.

alius cæci nomen huic intestino impositum fuisse

arbitratur. Mihi vero secus videtur, veteres

scilicet, cæci intestini nomine intellexisse, quic-

quid a tenuiorum intestinorū insertionē ad co-

lon usque porrigitur: sed hoc interuallum in bo-

vis, suis, glirib; sciurisq; adnotatu dignum est:

Observatio  
pulcherrima.  
Colon inte-  
stinum.  
Iter coli in-  
testini.

in cæco igitur in dextro ileo colon exoriri vide-

ris: deinde ad dextrum renem deorsum flecti-

tur, cui adnectitur: deinde conuoluitur, sursum

reuertitur, & ad abdomen sub ventriculo trans-

uersum fertur, non supra ventriculum, ut Mun-

Mundini ex-  
tor.

dino parum Anatomico visum fuit, qui callide

commentus erat, dum excrementa in hoc inte-

Coli distri-  
butio.

Cur colo duo  
obtingant li-  
gamenta.

Longaon &  
rectum.

Intestina  
quid sint.

Substantia.  
Tunica quot  
& quibus fi-  
bris prædita  
& cur.

Cur in in-  
testinis aut pau-  
cæ aut nullæ  
sint rectæ fi-  
bræ.

stino detinentur, ventriculi coctionem adiuuari.  
Vbi ad sinistrum latus colon peruenit, versus si-  
nistrum renem descendit, cui item colligatur. De-  
inde rursus inflectitur, & descendit, & cum ad  
sinistrum ileon accedit, duos gyros efficit, & in  
rectum tandem intestinum in summo osse sacro fi-  
nem habet. Colon hoc, quod diximus, oblongum  
est satis, crassumque, & cellulis hic atque illic re-  
fertur: quare cum amplum admodum futurum ef-  
fet, natura illi duo ligamenta parauit inftar dua-  
rum zonularum, quarum una superius est, inferius  
altera. At extremum intestinum, quod & lon-  
gaon etiam appellatur, rectum dicitur ob situm  
ipsius. etenim a summo osse sacro ad extremum  
usque coccygem defertur: atque in ano terminos  
habet, a quo constituitur. Sunt autem intestina  
( si naturam illorum in uniuersum scire cupis,  
postquam historiam didicisti ) corpora oblonga,  
teretia, & concaua, quarum situs is est, quem su-  
pra unicuique assignauimus. Eorum substantia  
neruea est, ventriculi substantia non dissimilis.  
Tunica illis bina existunt, illa inquam intestino-  
rum propria, & peculiare, quibus tertia accedit  
communis, quam a peritonaio mutuo accipiunt:  
prior interna obliquis fibris prædita est, ut con-  
tinendi munus obire possent: secunda transuer-  
sis, ut propellerent: rectas autem fibras aut nul-  
las, aut paucas quidem certe in intestinis conspi-  
caberis. Chylus namque fluidus in eorum inanita-  
tibus

ibus, spatiiſque diſcurrat, atque pererrat: at ſi-  
 ra tranſuerſa manuum inſtar comprehendunt. Cur inteſtino-  
 rum circum-  
 uolutiones  
 varia:.  
 Cauſa prima.  
 varia illis conuolutiones, ſpiræque contingere na-  
 turæ beneficio non vulgari: vt cibus in illis diu-  
 ius moraretur: neq; noſtris negotiis. ſi recta ſita  
 ſſent, impedimento forent. Propterea obſeruare  
 poteritis animantia omnia, quorum inteſtina  
 aucus gyris abundant, ſubinde fameſcere, & ad  
 abum capiendum non modo inuitari. ſed etiam  
 ogi. Secūda utilitas eſt ob chyli diſtributionem. Secūda cauſa.  
 Tertia, vt faces contineant. Neque neruis de-  
 tituntur inteſtina a ſexto pari ad ipſa delatis,  
 neque venulis, quas vena porta ſubminiſtrat, Venæ.  
 quas meſaraicas appellant. arterias itidem ha-  
 bent inteſtina. Quamobrem ipſa quoque ſangui-  
 ne aluntur, vimque habent coquendi, ſi quid a  
 ventriculo incoctum exciderit. propterea natu-  
 ra, quæ nihil fruſtra condidit, omento inteſtina  
 ipſa obtexit. Sed priuſquam hunc de inteſtinis  
 ſermonem abſoluamus, rem admirabilem adno-  
 tes volo, lector candidiſſime, naturam craſſa in-  
 teſtina vndique in abdomine valli inſtar collo-  
 craſſe, tenuia vero in medio craſſorum, vt ab ex-  
 ternis iniuriis facilius tuta euaderent.

De meſenterio & omento.

CAPVT VI.

**M**ESENTERIVM, ſiue meſaraeon, qua Ciceronis er-  
 voc. uſus eſt Cicero lib. ſecundo de Nat. Meſenterion  
 Deorum, licet perperam meſenterij naturam quid propriè  
 ſignificet.



Exortus.

Substantia.

Venæ & arteriæ mesarai-  
cæ.Glandularū  
vſus in me-  
ſenterio.Cur multe  
glandulæ ſub  
Ventriculo,Gland. ſub  
Ventriculo  
nomina va-  
ria.Meſenterii  
vſus.Meſenterii  
diuiſio in  
partes tres.

De omento.

Nomina.

Situs.

Hipp. error.

Exortus.

intellegerit: non enim medium inteſtinū ſignificat meſenterium, ſed membrum eſt, quod inter inteſtina medium collocatur) exortum ducit a ſpina: neque ſi introſpicias, aliud quicquam eſt, quam peritonæū ipſum duplex. Inter hāc igitur peritonæi reduplicationem, quā hoc loco meſenteriū appellamus, vena adſunt, arteriæq; meſaraicæ: adſunt & nervi, & glādula complures hic appoſitæ ob magnam horum vaſorum diuiſionē, quibus robori ſunt, & tutamento. Sub ventriculo præſertim harum glādularum non aſpernanda copia viſitur, nō modo ob vaſorum diuiſionē, ſed etiam ne ventriculus ſpina contactu ledere-  
tur: hæc glādula ταναρέας, ſine ταναρέας, & καλλι-  
κρίας, & affuſio, & lactes quoque appellantur. Vſus meſenterij eſt, ut inteſtina contineat, ne vel temere implicata euaderēt, vel deorſum delabe-  
rentur. Videtur in tres partes diuiſum hoc, quod dixi, meſenterium, quorum pars colon detinet, quod tranſuerſum fertur, atque hæc omenti pe-  
ne portio exiſtit: alia continet inteſtina tenuia, tertia vero craſſa. Sed ſi cui libeat meſenterium unum dicere, vel in duas partes ſecere, ego nihil  
moror. Omentum Latinis, Græciς ἐπιπλεον, A-  
rabibus Zirbus, in anteriori parte omnium inte-  
ſtinorum, necnon ſupra lienem quoque ſitum eſt, licet ſecus ſcripſerit magnus Hippocrates, hoc a ventriculi fundo iuxta eius longitudinem  
exortum, & a colo in ſuper inteſtino, in duas  
ſcin-

Scinditur partes, superiorem nimirum, & inferiore- Diuisio  
 riorem, quæ uniuntur, & sacculi, vel marsupij  
 potius figuram præseferunt. Vt rem in pauca Figura.  
 conferam: omentum nihil aliud est, quam perito- Omenti de-  
 neum, in quod tum venæ, tum arteriæ, tum ner- scriptio.  
 ui, tum adeps disperguntur: intestinorum tuta- Vfus.  
 menti gratia factum est, estque non exiguo co-  
 ctioni conficienda adiumento.

De liene. CAP. VII.

**S**PLEN, seu maior lien, membrum est in sini- Situs lienis.  
 stro hypochondrio sub costis septo adharens  
 transuerso, cuius innata figura oblonga est, instar Figura.  
 plantæ pedis: suprâ gibba est aliquantulum: at quæ  
 interiorem partem spectat, concauâ speciem re- Cur cōcauū.  
 fert: idque non temere, sed ut vetriculo cederet:  
 ubi linea adest, in quam eius vasa inseri videbis, Linea in lie-  
 propterea nonnullis eminentiis ibidē prædita est. ne.  
 Color lienis subliuidus est, eius substantia poris, & Colon  
 inanitatibus referta spongiæ in morem, vt hu-  
 mori melancholico crasso, terreog, ad illâ trans-  
 misso suscipiendo esset: In lienis substantia, quam Substantia.  
 dixi, tum venas tum arterias, illasq, perspicuas nullo  
 negotio deprehendere poteris: licet Galenus op- Vfus.  
 positum senserit in hoc mire deceptus, ita vt nul- In liene videtur arteriæ & venæ contra Galenum.  
 lus excusationi locus relinquatur: hæ autem ve- venæ lienis vnde.  
 næ, quas in liene conspiciaberis, a vena porta deri-  
 uantur, cuius sunt rami, arteriæ itē ab aorta sub  
 septo transuerso. Circundatur lien a tenui perito- Inuolucrum  
 nei membrana in quâ neruulus inseritur a sexta lienis vnde.

**Nervus lienis** nervorum coniugatione deductus. lienis utilitas unde.

**Vitus lienis.** est, ut melancholicus sanguis ab illa attraheretur, cum praesertim eodem alendus esset. In qua nutritione (est autem hoc observatum pulcherrimum) acidus quidam humor seijungitur, & per venae portae ramum ad ventriculum delatus famem dormientem excitat, quae utilitas nullo pacto spernenda est.

**Succi acidi lienis utilitas.**

### De vesicula bilis. CAP. VIII.

**V**ARIIS nominibus, ut plerumque alia nostri corporis referta est haec bilis vesicula. nam aliqui ita appellant, aliis Graeca vox magis arridet, usus felle, alij rudiores voce dicunt, bursam choleram citrinam, hanc naturae industria sub iecore parte dextera, eaque concava collocavit. Figura huius vesiculae, si quaeris, oblonga est: substantia vero membranacea. venas a porta sortita est, arterias vero ab ea mutuatur, quae ad iecur tendit, nervos demum a sexto pari. Haec bile suscipit, continet, atque expellit, & hic est eius usus, quae bilis a vesicula expulsa ad intestina propellitur, ut virtutem eorum irritaret, atque ad faeces excernendas exciteret compelleretque. Propterea natura nunquam satis laudata meatum unum duntaxat, (seu porum, seu ductum dicas, nihil interest) prudenter effecit, qui bilem flavam ad intestina, & ieiunij summitatem deferat. Equidem ingenue fateor, me numquam meatum vidisse, qui ad ventriculi fundum, vel cavitatem a bilis vesica feratur: licet non semel, sed sapius diligenter

**Nomina.**

**Situs**

**Figura.**

**Substantia.**  
**Venae vesicae bilis unde.**

**Arteriae.**  
**Nervi.**

**Usus vesicae bilis.**

**Meatus vesicae bilis ad intestina & summitatem ieiunij.**

**A bilis vesica non defertur meatus ad fundum ventriculi.**



genter intuitus fuerim, non negauerim tamen  
 cū huiusce bilis flauæ magnæ adest copia, eam ad  
 ventriculū regurgitare consueuisse. Sed hoc præ  
 ter naturā euenit, non secundum naturam. Si. n.  
 hic meatus a cysti fellis ad vētriculi capacitatem  
 daretur, in causa esset, ut is quicquid continebat,  
 dictū ac factū propelleret: itaq; nulla prorsus co  
 cctio in ventriculo confici posset. Immeditate sub  
 iecore sita fuit hæc vesicula, ut bilem susciperet,  
 quæ per vniuersum corpus delata plurimū obesse  
 poterat, prodesse nihil. cum præsertim ignea vir  
 tute prædita sit. Igitur a iecore ad bilis vesicam  
 meatus perducitur, qui ab eo ad hanc bilem deri  
 uat. Scito tamen inter venæ caueportaq; ramos,  
 ramulos cōplures dari, qui licet per iecinoris sub  
 stantiam dispergantur, omnes tamen in dictum  
 meatum desinunt, qui cum bilem suscepit, illam  
 ad propriam vesiculam defert. Est autem bilis,  
 ut omnes norunt, tenue sanguinis excrementum.  
 ut atra bilis crassum eius recrementum existit.

tricoli, vt sa  
 ma est.  
 Cum bilis re  
 gurgitat ad  
 ventriculum  
 præter natu  
 ram est.  
 Probatur nō  
 debere dari  
 hūc meatum  
 cysti fellis ad  
 vētriculum.  
 Cur vesica bi  
 lis sub iecore  
 sita sit.

Ramuli cō  
 plures bilem  
 suscipientes,  
 & ad eius ve  
 sicam deferē  
 tes.

Quid sit bilis

## De Renibus. CAP. IX.

**R**ENES duo numero sunt, dexter scilicet, Renes dua.  
 & sinister: quorum uterque, tum dorso,  
 tum nothis costis annectitur. Illud scitu pul  
 cherrimum est, Galenum diu multumque labo  
 rasse causam anxie quarentem, cur renem dex  
 trum natura superiorem sinistro collocauerit, ita  
 ut dexter ren altius, quam sinister sit situs. Sed  
 profecto nimis accurate, ne dicam inutiliter,

Connexus  
 renum.

Cur ren dex  
 ter sit supe  
 rior sinistro.

hoc inuestigauit Galenus noster, cum sensu contrarium prorsus facillime cuius constare possit.

Est imbecillitas intellectus repugnare sensui.  
Galenī ratio cur dexter ren sinistrum superet in brutis locum habere potest

In homine ren sinister est superior dextro.  
Cur sinister ren superet dextrum.

Inuolucrum renum.

Neruulus propriæ tunica renum vnde.  
Renum figura.  
Substantia.  
Color.  
Venæ & arteriæ emulgentes.  
Vfus.

Renes præter serosum, bonum sanguinem trahunt.

Est autem intellectus imbecillitas, teste Aristotele, sensui ita palam repugnare, adeo ut verisimiles Galeni rationes inspecta hominis Anatome falsæ appareant, statimq; corruant. Tamen si bruta feces hac non temere Galenum scripsisse comperies: in quibus sinister a dextero rene superatur: in homine vero oppositum omnino cernitur. Cur autem in hominibus secus contingat, ut sinister sit dextro superior; potius ob hepar, quam ob lienem euenit. Etenim hepar in nobis permagnum est, lien paruus: at in brutis deorsum vergit. Quare cum renes iecore, lieneque inferiores admodum existant, consentaneum est, ut illis optimo iure de habitatione accommodent. Integuntur renes peritonæo, eoque crasso satis: non deest tamen præter peritonæi velamentum propria renibus tunica, ad quā paruus neruulus, a sexto neruorum coniugio peruenit. Renū figura fascoli vulgo dicti speciem imitatur: spinam versus gibbi, caui quā viscera spectant: at substantia corū dura, densaq; est, cordi substantia similis, color subruber. In renes vena, & arteria emulgentes inseruntur, perque eorum corpus disperguntur. Creati fuerunt renes, ut serosum sanguinem attraherent, itaq; iecur expurgarent. Tu vero caue existimes serosum dumtaxat sanguinem a renibus trahi: nam cum hoc vnā boni quoque sanguinis

uinis portio aduehitur, qua ipsi aluntur. In re-  
 nibus lotium a sanguine segregatur, quod deinde  
 in aliam cavitatē emittitur: quæ cavitās instar  
 cribri nullo pacto efficta est, ut aliqui falso puta-  
 unt, & ab hac cavitāte, quā dicimus, vretēres,  
 hoc est, urinaria vasa nascuntur. Vasa inquam  
 concava, alba, crassaque, arteriarum instar, neruea-  
 idmodum, a renibus ad vesicam usque progre-  
 dientia: progressus autē huiusmodi est: Sub peri-  
 toneo etenim lumbis adherentes discurrunt, &  
 urinam ad vesicam deferunt: insertio vretērū  
 sub vesica est collum versus, in quorum vasorum  
 finib. natura duas membranas affabre apposuit  
 illis similes, quas in foliis quotidie intuemur.  
 Earum membranarū structuræ usus est, ut, po-  
 teaquam urinam ingredientem vesica benigne  
 susceperit, hæ membranæ claudantur, ne denuo re-  
 rocedēs elaberetur, magno mortaliū incōmodo,  
 magno sanitatis detrimento: cum lotiū post san-  
 guinis distributionem inutile pōdus corpori ex-  
 stat. Non desunt, qui harum membranarum  
 ignoratione ausi sint asseuerare, urinam per re-  
 fundationem in vesica colligi: at isti, si vesicas, qui-  
 bus loco pile ludunt subinde pueri in trivis, dili-  
 genter introspeciant: aerem in illis vesicis re-  
 lusum harum quoque membranarum bene-  
 ficio contineri, obseruare facile poterunt: neque  
 mirum illis amplius videbitur, si earundem ope  
 urina suscipitur ab vretērib. in vesica, & deti-

Renes alitur  
 bono sangui-  
 ne.

Opinio falsa  
 de cribro in  
 renibus.

Vretērū va-  
 sorum ortus.  
 Vretērū va-  
 sorum descri-  
 ptio.  
 Progressus v-  
 retērum.

Insertio vre-  
 tērum.

Membranæ  
 duæ in fini-  
 bus vretērū.

Usus mem-  
 branarum v-  
 retērum.

Urina nō col-  
 ligitur in ve-  
 fica per refu-  
 dationem.



Membranarū  
quæ sunt in  
extremitatib.  
mesaraicarū  
vñs.

netur ne superius reuertatur. Huiusmodi mem-  
branulas in mesaraicarum quoq; extremitatib.  
eadem industria conspiciaberis, vt superius pro-  
prio capite explicauimus. Cum emulgentibus di-  
ctis venis in corpus renum ingrediendum esset,  
noluit natura solers, atq; in humana fabrica sapi-  
ens supra quam dici posset, membranas in huius  
ingressu statim apponere, ne sanguis nimis præ-  
ceps flueret, atq; elaberetur, vt saepe fit, renibus

Renibus affe-  
ctis sanguis  
quandoque  
præceps ruit.  
Renum sub-  
stantia cur  
monticulorū  
figura.

præter naturam affectis: hoc ne fieret, curauit re-  
num substantiam in collum, seu monticulorum  
figuram augeri. hac enim sanguini occurrenti  
obiiciuntur, obstantq; quo minus sanguis, serum-  
que ad membranam deferantur ex qua fiunt v-  
reteres. Quare cum exire prohibeatur, prius per  
ramos tū sanguis, tum serum per renum ipsorum  
substantiam distribuitur. At renes, posteaquam  
sanguinem ob sui alimentum ad sese attraxere,  
ipsos saturati sunt, serum purum iam redditum,  
ad urinarios meatus transmittunt, qui illum in  
vesicam postmodum deferunt. hæc igitur partes,  
quas prominentiores dixi: in corpore ipso renum  
continentur ea utilitate, quam paulo ante breui,  
quoad eius fieri potuit, expressimus.

Renū opus.

### De vesica. C.A.P. X.

Vesicæ situs  
& connexio.  
Tutamentū  
vesicæ.

**V**ESICA in imo abdomine, quod sumen  
appellant, sub ossæ pubis sita est, cui dili-  
genter est connexa. Vesica posteriore parte,  
tum

um rectum intestinum, tum sacrum os illi maximum est tutamento, itaq; optime custoditur. Eius figura rotunda quidem est sed oblonga, intus autem concaua satis: hac in ceruicem, meatumque urinarium desinit: substantia vesicae nervosa existit, crassa satis, tribus fibrarum generib. donata, ut Galenus optime adnotauit: rectis inquam, transuersis, atq; obliquis, idq; ut tum attraheret, tum contineret, tum expelleret. Tunicam unam peculiarem adeptam est, quae extenditur, contrahiturq; alteram a peritoneo ascititiam mutuo sumit, quae integitur. E vesicae fundo in foetib. vas exoritur quod οὐραχὸς nominatur, quoniam huius ductu urina extra fertur, dum in matris aluo delitescimus: exit autē vrachos per umbilicum, ut in tractatu De foetu, latius explicabo: & postquam in lucem proditi sumus huic muneri amplius non deseruit, sed cum umbilico connexus vesicā sustinet, quae, ut antea dicebamus, in collū, & urinarium meatū terminatur. Est autē Vesicae collum, seu ceruix eius oblonga pars semidigiti batio, ut nunc loquuntur angustaq; & pene carrea, cui duae adstant glandulae παραστάται, hoc est, assistentes propterea dictae, crassae, & albæ, quæ per vasa κισσινῶν appellata semen suscipiunt, quod deinde in meatum ad extremum penem desinentem in coeundi voluptate dimittunt, quo tandem foras pellitur, atque eiacular: etenim meatus hic tum lotio, tum semini

Figura vessicæ.

Cervix vesicæ

Substantia vesicæ.

Fibræ &amp; earum usus.

Tunica.

οὐραχὸς.

Vrachi nullus usus in lucem editis.

Cervicis vesicæ descriptio.

Glandulae para-  
statae.

Vfus

παραστάται.

Meatus communis lotio & semini.  
Semen qui exeat.

communis est. In eodem collo inter binas dictas glandulas partem quandam eminentiorem, oblongamq; videre est. Quasemen exit, nullum est foramen patens & perspicuum, sed foraminula plura spongia instar, neq; ipsa primo intuitu conspicua: apparent autē cū primū glandulas cōprimis. Tunc. n. illis expressis semen emergit, quod delitescerat: in eiusdē ceruicis finibus musculus adest constringens, ne nobis inuitis, atq; aliud agentibus urina exeat, atq; absque interpellatore elabatur. Vesica ut reliquæ pene omnes partes nostri corporis, venas atque arterias nacta est, a quibus alimentum vitamq; suscipiat: nervos autem duorum generum tum a sexto nervorum pari, tum a medulla spinali. Vesica utilitas, ne vos multis morer, est, urinam, ab ureteribus aduēctam, primo suscipere: deinde aliquamdiu detinere: postremo expellere. Quamobrem nihil mirum est, si fontis imaginem pra se fert: in seminis matrici adheret, & parastatis glandulis caret.

Musculi in finibus colli vesicæ vsus. In vesica venæ & arteriæ cur.

Nervi duorum generum ad vesicam. Vesicæ vsus.

Cur vesica fontis imaginem referat. Vesica in seminis vbi.

## De peritonæo. CAP. XI.

QUEMADMODUM uniuersa thoracis cavitates una cum internis membris omnibus, quæ thorax continet, a succingente membrana, quæ πλεῦρα, dicitur, optime circumdatur: ita in abdominis cavitate membra vasque in eo contenta, a tenui, nerueque membrana, quam Græci περιτῶναιον dicunt, siphac Arabes, magna naturæ providentia obuoluntur: idcirco hanc

πλεῦρα quæ ambiat in thorace.

περιτῶναιον quid ambiat. Substantia. Nomina.



hanc Græci *Σελτόνιον* dixere, quod scilicet vasa,  
 visceraque omnia subiecta pratendat, & cir-  
 cumplectatur. Peritonæi figura sub spherica est: *Figura.*  
 bina, quo loco se ipsa crassior existit, belle admo-  
 dum, valideq; connexa est: est autem prope spi- *Adnexio.*  
 ram crassius peritonæum, quoniam inde multas  
 partes diuidendum erat: itaq; iam supra me-  
 norauimus quo pacto mesenterium, atq; omen-  
 tum parturiat, iecur inuestiat, neq; iecur solum,  
 sed lienem quoque, transversum septum, ventri-  
 culum, intestina, renes, vretes, vesicam, atque  
 uterū in fæminis, ut suo loco explicabimus, ve-  
 nas quoque, arterias, nervos, glandulas. Perito-  
 næum (cuius historiam nunc præ manibus habeo  
 nus, quamque breui absoluemus absque verbo-  
 rum lenocinio, ut consueuimus) sub transversos  
 abdominis musculos venit, ibique cum eorum  
 tendinibus valide connectitur. Animaduer-  
 sum autem hoc, quod mox dicam: est enim scitu-  
 mulcherrimum, atque a nemine hætenus ani-  
 maduersum: peritonæum a dimidio abdomine  
 transversum versus Anatomen conspicientibus sim- *Nova obser-*  
 plicem esse membranam, dispicientibus autem *uatio de pe-*  
 b umbilico infra membranam hanc duplicari: *ritonæi sim-*  
 plicis reduplicationis usus est, primum ob arte- *plicitate &*  
 as umbilicales nūcupatas, ob vas, quod *reduplica-*  
 icitur, ob venas, arteriasque sub rectos epiga- *tionem.*  
 rii musculos ascendentes (quæ vasa inter hanc *Cur peritonæ-*  
 ritonæi reduplicationem continentur, quæ ego *um redupli-*  
 cetur.

Cur perito-  
næum intus  
leue sit, extra  
asperum.

Vesalij error.

Abdomen  
qui sit, & eius  
nomina.  
Quæ in abdo-  
mine conti-  
nentur.

Ope memb.  
gener. species  
æternæ philo-  
sophis.

Ex membris  
generationis  
quæ sint cõ-  
munia, & quæ  
propria.

primus omnium obseruauit) necnon ob vesicam, deinde hac eadem peritonæi duplicitas, ut ita dicam in causa est, ut intestina validius, tutiusque contineantur. Peritonæum interna parte laue est, extra asperum, neque id iniuria, sed ut dictis musculis, atque eorum tendinibus fortius adhaeresceret: multis quidem in locis perforatum peritonæum cernes: sed tamen tot locis foramina eius spectabis, quot illi bonus Vesalius assignauit, vel somnauit potius. Atque hæcenus de peritonæo: nunc reliqua persequamur.

#### De abdomine. CAP. XII.

**I**N abdomine (est autè abdomen regio illa, quæ inter costas, & os pubis sita est, quodque Græci *ἐντὸς τοῦ πύθω*, Arabes *mirach* vocant) præter membra illa nutritioni deseruientia, iecur inquam, splenem, ventriculum, intestina, renes, vesicam, omentum, mesenterium, pancreas, venas, arterias, necnon peritonæum, adsunt quoque membra alia generationi opè ferentia, quorū ope species æternas fieri autumant naturæ arcanorum indagatores. Quamobrem, posteaquam ea, quæ potuimus breuitate, & perspicuitate historiæ de nutritione deseruientibus membris absoluiimus, reliquū est ut de illis, quæ plantando homini necessaria sunt nunc verba faciamus: ex quibus nonnulla utriusque sexui communia, nonnulla propria sunt: communia cum dico, vasa seminaria, & testes intelligo propria vero in mare penem, in femina uterum

De vasis seminariis, testibus, eorum-  
que membranis. CAP. XIII.

**D**VPLEX igitur genus est eorum vasorum Vasa semina-  
ria duplicia  
& vsus eorū  
qua seminaria appellantur, quorū alterum  
materiam ad testiculos desert, ex qua semen ela-  
boratur: alterum vero, quod iam elaboratum est  
in testibus semen, ab ipsis suscipit, & ad penis ra- Nomina  
licem desert: propterea hac vasa deferentia, illa  
preparantia vno Anatomicorū ore appellantur.  
Preparantia quatuor sunt tā in mari, quā in fœ-  
nella, licet in hominibus longiora sunt, in mulie-  
ribus breuiora. Deferentia vero duo: neq; in hoc  
interest, an de mare, vel fœmina loquaris: totidē  
namque in utroque conspiciuntur. Preparantia  
ag; generationis materiam vasa sunt vena dua  
minales dictæ, due item arteriæ eadem voce  
uncupatæ. Vena, ut in tractatu De Venis, fusius  
eximus, in exortu suo varia sunt: nam dextra a  
vena caua sub emulgenti pullulat: at sinistra ab  
sæmet emulgente deducitur. Anatomici, postea  
iam harum venarum diuersitatem conspici-  
unt, sinistram seminalem ab emulgente originem  
habere censuerunt: quod necesse esset falsum hu-  
morem ad testes deferri, cuius titillatione se in-  
titut antopere aiunt commoueri. Ego vero sen-  
tentiam hanc falsam esse prorsus opinor: nam Anatomico-  
rum opinio  
cur vena fini-  
stra seminalis  
oritur ab e-  
mulgente.  
multos noui, quibus, ut ab herneia intestinali,  
τὰ ἐντεροκήλη Grace dicitur, sani euaderent,  
his sinister ablatu fuerat: qui tamen dum



Causa vera  
cur vena  
sem. sinistra  
oriatur ab  
emulgente.

Arteriarum  
feminalium  
ortus.

ἀνὰ σὺν ὁμοῖς  
venarum &  
arteriarum  
in pluribus  
partibus cor-  
poris.

In vulnerib.

mulieribus coirent, eadem voluptate, qua antea se perfrui solere, mihi de industria diligenter interroganti sancte iurabant: alia igitur huius diuersitatis causa querenda est, cum prima nullo pacto satisfaciat, & dicta instantia allata statim corruat. Ego causam, quam verissimam puto, in mediū adducā, vos eritis iudices. Cum hæc seminales venæ exiles admodum sint, & parua: atque in sinistro latere magna arteria prope venā cauā sita, quæ arteria magna numquā nō vniis nobis mouetur, periculum ingens, atq; adeo euidentis imminebat, ne hæc tenuis vena in iis perennibus motibus disrumperetur. Natura igitur prudēs, vt hoc incommodum euitaret, sinistrā seminale venā ab emulgente, nō a venæ caue trunco decidi voluit: ne in descensu supra magnam arteriā iaceret. At due arteriæ, quas seminales diximus, a magna arteria trunco sub emulgentibus scaturiunt. Hæc vasa dum descendūt, primo aliquantulum distant, postmodū ita implicātur, vt vena arteriam, arteria venā ingrediatur, sitque præclara illa, & admirabilis, ac aspectu iucundissima, a Græcis hominibus vocata ἀνὰ σὺν ὁμοῖς, quod genus ἀνὰ σὺν ὁμοῖς, si in corporum dissectionibus te accuratū præstabis, in aliis quoq; partibus conperies, in brachiis præsertim, & cruribus: propterea quandoq; euenit, vt vena vna dumtaxat sauciata non modo naturalis sanguis vniuersus, sed vna vitalis quoq; effluat, ita vt vulneratus intereat

intereat: horū vasorum plexus vitium capreolis conferri nō inepte potest: qui plexus summo studio, atq; mira effectus est, ut scilicet materia illa, atq; ille seminis apparatus, qui primo ruber erat, sensim alterari parariq; inciperet, & albefieri: qua elaboratione inchoata non dubium est, quin magna pars laboris testibus imminuatur, quorum hic vniversus labor futurus erat, ni horum vasorum complexus, hæc venarum, atq; arteriarum <sup>de vasorum</sup> suppetias attulisset. Idcirco hæc implicatio deorsum vsq; ad testes descendit, perforatq; epididymo ad ipsam testium substantiam penetrant. Ab hisce duobus vasis aliud vas oritur, quod deferens <sup>κρυφοειδής</sup>, & variciforme nūcupatur, crassum, anfractuosumque. supra testem inuertitur: deinde sensim assurgit eodem itinere, quo deorsum deflecebat, ita ut reuertantur, unde exierant præparantia vasa, perq; idem foramen ingreditur, quod in tēdinibus musculorum abdominis descendit, ascendentium, & obliquorum supra os pubis situm est: quo loco pubis os cavitatem habet superficiariam, ut cederet horum vasorum rotunditati. Vbi in abdominis capacitatem peruenit, deorsum fertur prope os pubis, & sub vesica, ubi magis, ac magis amplificatur, & iuxta fines suos multum implicatur, & contorquetur, donec in glandulas parastatas tandem implantetur, quæ ad penis radicem, & vesicæ fines collocantur, in quibus

cur quandoque sanguis vniverſus exeat.

Plexus vasorum feminalium, & cur.

Anastomosis vasorum feminalium quousque progreditur.

Deferentis variciformis vasis descriptio.

Foraminis in tendinibus musculorum abdominis utilitas.

Glandulæ parastatæ ubi sint sitæ.

Cur tot gyri  
& glandulæ.

Gyris, & obvolutionibus, plexisque implicitis, & glandulis, tantum seminis continetur, quo tres, quatuorve fœtus seris facile possent, præsertim in in fœcundioribus: propterea nihil mirum nobis videri debet, quod Aristoteles tãquam admirandum proponit, taurum, cui quamquam testes ex-  
ecti fuerant, genuisset tamen. Atque hæc sunt in homine generationi dicata vasa. nam in mulieribus ipsis neq. abdomen prætereunt, neque in parastatas desinunt, neque ad vesicam perueniunt, sed ad matricis dumtaxat cavitatem, in quam semen transfundunt.

Quod Aristoteles tamquã admirandum proponit, nõ est admirandum.

Vasa gen in mulieribus abdomen nõ prætereunt. Mulieres in vteri cavitatẽ semen fun- dunt.

#### De testibus. CAP. XIII.

Testes cur  
ἰδιώτοι dicti.  
Locus testium.

**T**ESTES vocant Latini, quos Græci ἰδιώτοι vocant. ἰδιώτοι autem vocant, eo quod duo sint. locus testium in homine scrotum est ipsum, quod ὄρχος dicitur. qui situs ita notus cuiq. est, ut nulla descriptione indigeat: illis præcipue, quibus cum magnis, & fœcundis testibus res præclare, & feliciter agitur. eorũ figura orbicularis est, at non exquisita, sed oblonga ouorum instar. Substantia rara, laxa, alba, mollisq. in maribus: sed in feminis intus in abdomine occluduntur, neque ita crassi sunt: neque adeo rotundi & molles, quemadmodum in viris. Testes in utroque sexu seminis generationis gratia conditi sunt: nam absque his neq. semen gigni, neq. generatio perfici posset: membranis pluribus in homine obducuntur, de quibus magna lis, magna controversia, ne dicam confusio

Testium figura.  
Substantia.  
Testium in foemina si-  
tus.  
Substantia & figura.  
Vtus testium in mare & foemina.  
Testes in mare habent plures tunicas.



confusio apud Anatomicos reperitur : cuius in causa fuisse arbitror dissecandi vel imperitiam, vel negligentiam, vel utrumq; dum alteram ab altera vel parum perite, vel oscitanter seiungebant. nos autem conabimur dilucide satis hæc distinguere. Igitur membranarum in testibus alias communes, peculiare alias appellamus. Dum scrotum hominis dissecandum ob oculos habes pro testium Anatome conspicienda, primo occurrit tibi cuticula, deinde cutis, quæ in hac parte est tenuissima, rugosaque; deinde membrana carnea, inter quam & cutem nulla adest pinguedo, ut facilius extendi, & contrahi, elongari & corrugari posset. Proprie testium membrana tres numero sunt, quamvis Vesalius duas solum agnoscat: quarum prima (de tribus externis nunc loquor) oritur a neruea tenuitate muscutorum obliquorum descendunt, quam ego ἐρυθροειδὴς appello, fibris carneis intertexta, quæ testis musculus consociunt. Secunda δαπνὴς dicitur, quæ nihil aliud est, quam peritonæi ipsius substantia, candida, vasisque adherens, & affixa. Ab hisce membranis, quarum partem proprias membranas, partem communes dicimus: & vasa seminaria, & testes inuoluuntur. Tertia, & postrema testis substantiam immediate integit, alba colore, structura crassa, quam ego ἐπιδιδυμὸν appello, quicquid alij sentiant: nam aliqui epididymon vocant plexum illum vasorum, qui supra

Anatomici  
certant de  
membranis  
testium.

Admiratio  
testium.

Membranz  
testium pro-  
priæ tres.  
Vesalij error.  
Prima mem-  
brana testiū  
propria.  
Ortus.  
ἐρυθροειδὴς.  
Secunda  
membrana  
δαπνὴς.

Tertia mem-  
brana.

ἐπιδιδυμὸς.  
Error nō au-  
lorum.

Testes for-  
minarum,

Cur scēmi-  
narum testes  
pauciores  
habeant  
membranas.  
Cur testes in  
fœminis in-  
tro collocē-  
tur.

testiculum cernitur. Testes fœminarū una dum-  
taxat membrana, <sup>et didupis</sup>, a nobis dicta, cir-  
cumdatur, & a peritonæo: neg, illis pluribus opus  
erat membranis, cum in abdito, tutoque loco, in  
naturæ inquam penetralibus contineatur. Quo  
loco ob innatā mulierum frigiditatē positi sunt,  
at viris extra prominere voluit: ne assidua coeū-  
di cupiditate torquerentur, quod & vite breui-  
tatem inducere, & a negotiis peragendis non ab-  
ducere non potuisset.

Depene CAP. XV.

Nomina pe-  
nis.

Nominibus  
student me-  
dici ratione  
rerum.  
Penis figura.  
Situs.

Substantia  
penis in ho-  
mine qualis.  
Cur penis nō  
fit ossæus in  
homine.

**N**E existimetis deesse nomen peni: penè ete-  
nim sunt innumerabilia, cū plura sint in v-  
naquaque lingua tritissima. & in dies ioci gratia  
efformetur parasitis, & otiosis hominibus, ac in  
venerē prunis, ab amatorib. a mæchis, a procis, a  
lenonib. a meretriculis, a lascivis poetis, a scurris:  
nos aut, qui nominib. tantū studemus, quantum  
nos in rerum ipsarum notionem deducunt, pau-  
ca dumtaxat enumerabimus. Penis itaq, dicitur  
<sup>καυλός</sup>, mentula, virga, virile membrum. Eius fi-  
gura non modo veleunuchis ipsis, & lippis notis-  
sima est, situs item notissimus: substantia vero  
per paucis admodum cognita est, quamvis cogni-  
tione digna, & nō vulgaris existat speculationis.  
Nam in homine penis substantia neg, ossæa est, ut  
in lupo, cane, & vulpe mare: quæ si ossæa in nobis  
foret, & instar baculi rigidi semper prominere-  
t, multis negotiis gerendis impedimēto nō esse non  
poterat.

poterat. Neque cartilaginea est, neq; ex ligamēti  
constat substātia, neq; musculoſa, neq; neruea, ne-  
que vena, neq; arteria, neq; membrana: licet ex  
his, quæ enumerauimus. nonnulla ad penis ipsius  
structurā cōcurrant. at nulla ex ijs seorsum sum-  
pta consiciendo peni accōmodabatur. Neque. n. id  
præstare potuissent, cuius gratia illum natura pa-  
rens genuerat: neq; enim lotij vnus emittendi,  
sed seminis quoq; in vterum sobolis gratia eiacu-  
laudi natura penem effinxit. Cum igitur natu-  
ra humani generis sollicita indiuidua quotidie  
peritura animaduertetet, miserta est, & vt per  
speciem, ac propagationem immortalis homo e-  
uaderet, sedulo curauit, hominisq; penem ex sub-  
stantia quadam efformauit, quæ & erigi, & flac-  
cescere, & rigida fieri & vieta posset. spongiosa  
itaq; merito est, rara, porosaque, pene lienis sub-  
stantia similis, quam tamen crassis induit liga-  
mentis, quæ vnā cum rara, quam diximus, penis  
substantia ab inferiore parte ossis pubis, non a su-  
periore (vt male in hoc Galenus) ortum ducit su-  
um. Hæc quæ diximus, ligamenta ex inferiore  
pubis ossē exorta sunt, & quidem in ano origine  
carneā: deinde superiora versus tendit, in medio  
vero ossis pubis plus minus dextrum principium  
cum sinistro vnitur, coitq;. Deinde deorsum ver-  
sus inflectuntur, & ad grandis fines implantan-  
tur, quæ glans reliquis penis partibus magis dura  
existit. Dextrum ligamētum cum sinistro iuxta

Cur non sit  
cartilagineus.  
Cur non con-  
stet substātia  
ligamenti.  
musculi, ner-  
ui, venæ, arte-  
riæ, membra-  
næ seorsum.  
Vſus penis.

Substātia pe-  
nis cur talis.

Ortus penis.

Galenī error.

Ligamentorū  
penis impli-  
catio.

Glans penis  
qualis.

Cur arteriæ  
in pene.



Cur arteria  
in pene.

Quomodo  
fiat erectio  
penis.

Utilitas liga-  
mentorum.

Arteriarum  
penis utilitas  
omnibus a-  
liis ignota.

Vesalii error.  
Musculi pe-  
nis quatuor.

Meatus com-  
munis lotio  
& semini in  
pene ex qui-  
bus confect.

penis longitudinem unitur. At penis substantia, quippe quæ rara compage, porisque multis constabat, erectioni in coeundo necessaria parum apta futura erat, & uno ligamentorum auxilio tantundem fere opis assequebatur. Natura provida arterias duas per hæc, quæ diximus, corpora diffudit, quæ a radice penis ad extremam usque glandem recta feruntur: sed infinitos (ut ita dicam) ramulos huc illuc dispergi iussit: cum vero novus hominis gignendi libido incescit, magnam spirituum vim per arterias illas, quas diximus, capillaresque arteriolas diffundit, & ad penem detru- dit, quorum auxilio substantia illa paulo ante ru- gosa, & flaccescens attollitur, erigitur, indurefcit, riget: fulciunt autem illam, quæ antea diximus ligamenta, quæ crassa sunt duobus nominibus, tum ob hoc, tum ne spiritus cito nimis euolarent absumpti. Has autem arterias penis, atque hoc earum munus nemo hætenus, quod sciam ante me cognovit, ut in tractatu de arteriis latius diximus, per quas alimentum quoque desertur: cum in pene nulla adsit vena, nullus nervus, ut Vesalius in hoc deceptus perperam existimavit. Præter quæ hætenus memoranimus ad penis fabricam a natura excogitata quatuor quoque musculi adsunt, ut in nostro libello De Musculis latius habetis: adest insuper communis ille meatus, tum semini, tum lotio, qui sub hisce duobus corporibus positus est, neque aliud est quicquid, si recte perpendas, quam vesicæ

vesica substantia ad penis fines elongata: hac au-  
tem omnia integuntur cuticula, cute, carnea me-  
brana, nulla presente pinguedine, ut in scroto di-  
cebamus: quam hic motus gratia deesse opinor: &  
ut ne in tantā molem penis ipse ex cresceret, qua  
uterus expauesceret: licet hunc rerum omnium  
capacissimum meretrices pradicent. Pars extre-  
ma penis praputium dicitur. estq; pellis illa, qua  
glans integitur, qua in coitu ipso nunc sursum,  
nunc deorsum fertur infinita propemodum mu-  
lierum voluptate, & tentigine: hac in Hebraorū  
circumcisione aufertur: propterea vetus verbum  
est, Iudæus apella. Quæ res magnam voluptatis  
partem Hebræis mulieribus adimit, dum venus,  
oscula amanti quinq; parte sui nectaris imbuat.

Penis tegu-  
menta.  
In pene non  
est pingue-  
do, & cur.

Præputium.

Cur Iudæus  
dicatur a-  
pella.

De utero, siue de matrice.

CAPVT XVI.

SIVE μήτραν dicas, siue ὕστεραν *matricem* ve, *ute-*  
*rum*, aut *vuluam*, nihil refert. Situs eius est  
in abdomine, inter vesicam, rectumque in-  
testinum. En qui superbis homuncio, terra, &  
cinis inter excrementa natus? Sed ad *Anato-*  
*men* reuertamur; nimis enim profecto miseri  
sumus, si rem ad viuum consideremus: neque  
nos φιλαυδία cæcos efficiat. Uterus anteriore  
parte ab osse pubis, posteriore ab osse sacro, a late-  
ribus, ab ossibus ilium, tanquam firmissimis ac tu-  
tissimis vallis circumdatur, ex quibus sacro ossi,  
& pubi cōnectitur. Figura veteri tum rotunda, *Figura.*

Vteri nomi-  
na diuersa.  
Situs.

Apostrophe.

Vteri tuta-  
menta.

Vteri con-  
nexio.

tum oblonga est, supra deprimatur magis, quam infra. Illud potissimum pro comperto habeas, & *uteri muliebris figurā a bouillo, caprino, & ouilo non parum differre, quicquid Galenus in hoc parum Anatomicus in lib. De Fæt. formatione necnon de Dissectione uteri scriptum reliquerit.*

*Crassam uteri substantiam, carneam, & nerveam quoque naturā mixtā esse voluit: ut, dum fœtum continet, facilius extēdi, & dilatari possit.*

*Tribus generibus fibrarum intertextis constat matrix, ut Galenus optime docuit, rectis in quā obliquis, & transversis, ut semen pro fœtu effundendo attraheret, contineret, statoque tēpore expelleret. Interna uteri cavitās una dūt axat est præterea nulla, atque illa parua satis, in qua tamē, licet una sit, & exigua, iuxta immisi seminis quantitatem non modo fœtus unus formari potest, sed gemini, tres vel plures fatus, ut in multis Europæ urbibus non semel contingit: qui deinde non cellulis, sed propriis membranis a sese mutuo distinguuntur, quemadmodum tūc apertius explicabo, cum de fœtu ex professo scribere aggrediar: quam partem nostrorum librorum vobis tam gratam fore certe opinor, quam quod gratissimum. Interim moneo, ne vllam Mundino fidem adhibeat. quem parum Anatomicum vos quoque iudicabitis, si, ut reliqua nūc illius errata missa faciam, quod de uteri Anatome scripsit, cū rei natura conferetis. Inquiens in hu-*

*mano*

Vteri muliebris figura ab utero brutorum differt.  
Galenī error.

Substantia vteri qualis.  
Cur nervea.

Vteri fibra.

Cavitās uteri vnica.

Quomodo possint in vnica uteri cavitāte plures fœtus generari.

Plures fœtus distinguuntur membranīs non cellulis.

Mundinus parū anatomicus.



nano utero septem cellulas adesse, thalamos etiam, & atria dicere potuisset: tantumdem enim esset. Rei veritas hac est, mulieris uterum unica cavitata præditum esse, quæ intus satis lenis con-  
 bicatur, quamuis nonnulla foramina adsint, quæ nihil aliud sunt quam venarum, & arteriarum apertura, quæ veteres Anatomici acetabula nūc-  
 arunt, quoniā concavae partes sunt, quib. semen adheret, tuncq. arteriae arterias, venas venagi-  
 nunt. Cavitata uteri in foramen satis angustum andē dehiscit, quod os matricis appellatur, quod  
 extra spectes, tincturae piscis, vel canini oris nu-  
 er in lucem editi, imaginem tuis oculis offeret:  
 hoc autem foramen in matricis collum spectat:  
 per quod foramen uteri semen ingreditur, dum  
 imia delectatione dilatatur: aperitur autem eo  
 tempore, quo mulier semen emittit: colli, vel cer-  
 vici nomine in utero non corpus illud, quod su-  
 ra descripsimus, sed partem illam intelligimus,  
 quam mentula, tanquam in vaginam immit-  
 titur, cuius longitudo est, quantum undecim di-  
 gitis apicibus metiri possumus: rugosa est, & mē-  
 ranosa, non cartilaginea, ut Herophilo placu-  
 it: suntque rugae illius circulares, ut in coeundo  
 irile membrum amplexaretur, atque exuge-  
 ret: quibus rugis attritio fit, ex qua miram vo-  
 ptatem amantes in coeundo percipiunt. In cer-  
 vici uteri finibus vulvam versus nonnullae ca-  
 vunculae prominent, a quibus voluptas, ac dele-

Fabula est in  
 humano ute-  
 ro adesse se-  
 pte cellulas.

Cavitata hu-  
 mani uteri v-  
 nica est &  
 qualis.  
 Foramina in  
 cavitata uteri  
 quid sūnt.  
 Acetabulorū  
 uteri vsus.

Os matricis.

Figura oris  
 matricis.  
 Os matricis.  
 quando dila-  
 tetur & ape-  
 riatur.

Cervix uteri  
 quid.

Longitudo  
 cervicis uteri.

Rugae in col-  
 lo matricis.

Rugarum cer-  
 vicis uteri v-  
 sus.

Caruncularū  
 in finibus cer-  
 vicis uteri v-  
 sus.

Nympharum  
fitus & vsus.

Hymen in  
virginibus  
nonnullis.

Vnde men-  
ses fluunt.  
Vteri tunica.

Vasa semina-  
ria mulierū  
in quo distat  
a viris.  
Testes.

Vesalius la-  
tas particu-  
las membra-  
neas vteri,  
appellat mu-  
sculum.  
Vasa defe-  
rentia.  
Cornua vte-  
ri vere cor-  
nua in bru-  
tis videntur,  
secus in ho-  
mine.

Etatio in coeundo non parum augetur: sub hisce  
vuluae labellis duae adsunt a lateribus latae mem-  
branae: nymphea a veteribus dicta, quarum uti-  
litas est, ut a puluere, frigore, & aere uterum tue-  
antur, sub nymphis in nonnullis virginibus (non  
omnibus) alia membrana cernitur, hymen a ve-  
teribus appellata, quae cum adest, raro autem ad-  
est, obstat quominus penis in uterum immittatur:  
nam crassa est valde, supra vesicam versus  
foramine donatur per quod menses fluunt. Vte-  
rus humanus (hunc enim describimus) eiusque  
cervix, praeter tunicam, sibi propriam, peculiaremque  
aperit onae inuoluitur, ut supra attigimus. Vasis  
quoque seminariis praedita est matrix, quemad-  
modum in viris diximus: hoc uno differt, quod  
in mulieribus breviora sunt. Testibus quoque non  
destituitur, qui superiori in parte nonnihil de-  
pressi videntur, apud quos sita sunt duae latae par-  
ticulae membranae, nonnullis carneis fibris do-  
natae, quas membranas Vesalius musculum voca-  
uit: in harum summitate a testibus, hoc est, prae-  
parantibus vasis deferentia proficiuntur, quae in  
faemellis non minus anfractuosa sunt, quam in  
viris ipsis: & in matris cauum terminantur: hac  
supra, hoc est, prope eorum corpus, partes binas  
prominentes instar vituli cornuum nuper erum-  
pentium profert, quae forte illa sunt ab antiquis  
dicta matricis cornua: veram enim cornuum ver-  
uecis speciem in vacca, caprae, canis, ovis suis, &  
id ge-

DE VISCERIBVS LIB. XI. 447

ad genus animalium utero videbis, nam in his  
nere incuruantur, & concaua sunt, & in his fa-  
cus gignuntur. At mulieris uterus longe ab his  
distat, ut tu quoq; nisi conferre pigeat, facile ex-  
periri poteris, sed ad uteri humani historiam re-  
uertamur. Auxilio vasorum seminalium, illius-  
que membrana, quam Vesalius pro musculo de-  
scribit, sacro ossi uterus appenditur: in fine vero  
una cum cervice, ossibus pubis, & coxendici. A-  
natricis lateribus (mirum audies) bini proces-  
sus constituuntur, quae duo oblonga ligamenta vi-  
lentur esse, neruea cauag, ligamenti etiã mune-  
re fungi creduntur: at ad summũ os pubis mini-  
ne perueniũt, ut Vesalius existimauit, sed per ea  
foramina transeũt, quae in nervosis tenuit atibus  
musculorum obliquorũ descendentiũ, ascendẽ-  
tium & transuersorum sita sunt, quemadmodũ  
in viris, per quae vasis seminariis aditus patet: et-  
nim sceminis hi tendines perforati cernuntur:  
quamuis Vesalius id inficietur. Processus igitur  
ab utero exorti prope id foramen, quod os ma-  
ricis vocatur, extra abdomen exeunt, supra pu-  
em ascendunt, desinunt autem in particulam  
quandam excelsam in vuluae apice circumuolu-  
am supra id foramen, unde lotium exit, & hac  
etor candidissime illa, illa praecipue sedes est de-  
etationis mulierum, dum venerem exercent,  
quam non modo si mentula confricabis, sed vel  
minimo digito attrectabis, ocus aura semen hac

Vteri connexio.

Processus vteri bini.  
Vfus.

Vesalij error.

Iter processuum vteri.

Tendines perforati.  
Processuum vteri epilogus.

Sedes delectationis in mulieribus.  
Quo pacto cogere poteris mulierem semen emittere.



Quæ pari in  
mulieribus  
venerem pe-  
tentibus du-  
riuscula appa-  
reat.  
Pars in mu-  
liebre specie  
penis.  
Processuum  
uteri vsum  
nemo ante  
me aduertit.

Non concipi-  
tur fœtus  
absq; mutua  
voluptate.  
Arteriæ &  
venæ uteri  
vnde.

Menstruus  
sanguis non  
expurgatur  
per venas u-  
teri.

Menses per  
quas venas  
fluant.

atq; illac præ voluptate vel illis inuitis profluet  
Hanc eandem uteri partem dum Venerem ap-  
petūt mulieres, & tamquam æstro percitæ viri  
appetunt, ad libidinem concitatæ: si attinges, du-  
riusculam & oblongam redditam esse comperies  
adeo ut nescio quam virilis mentula speciem præ-  
se ferat. Hos igitur processus, atq; eorumdem ve-  
sum cū nemo hæcenus animaduertit, si nomi-  
narebus a me inuentis imponere licet, amor Ve-  
neris, vel dulcedo appelletur. Non dici posset quā-  
topere admirer tot præclaros Anatomicos, tam  
pulchram rem, tanta arte effectam, tanta utili-  
tatis gratia, ne olfecerint quidem. Vos autem  
qui in has meas lucubrationes Anatomicas le-  
gēdas incideritis, scitote absque processibus, quos  
ego vobis paulo antea fideliter descripsi, neque  
mulierem aliquam in Veneris amplexibus dele-  
ctationem percepturam fuisse, nullos fœtus con-  
cepturam, non enim absq; mutua maris, & fœ-  
minæ voluptate concipi posse crediderim: sed de  
his satis. A venis, arteriisque seminalibus,  
(quemadmodum suo loco diximus) tum venæ,  
tum arteriæ ad matricis corpus tendentes deci-  
duntur, nō ut per has menstruus sanguis expur-  
getur, ut communis est sententia: sed ut lauda-  
bili sanguine tū illa, tum conceptus fœtus ali cō-  
mode possit. Non enim hæ sunt venæ, quarum o-  
pe menses fluant mulieribus: sed illa a venæ caua  
dumissione exorta, quæ in uteri cervicem ad ipsius  
latera

latera inferuntur, ut eo loco latius habetis. Vtero  
duo nervorum genera donata sunt, a sexto scilicet  
pari, & a spinali medulla. Vulva extra membra-  
nosa est, pinguedine referta, non musculosa, ut al-  
iqui opinantur, propterea motu voluntario de-  
stituitur. Longitudo, quam supra cervicis fora-  
mē videtis, a natura partus ergo prudentissime  
confecta est, ut pariendi tempore dilatari posset,  
& infans in lucem facilius prodiret. Illud histo-  
ria de utero addendū est, ad eius cervicis extre-  
mitates vesica cervicem desinere, ubi foraminū  
ū adest immediate sub pubis osse: caue enim exi-  
times, ut idiota, & muliercula ipsa mingentes  
opinantur, per uteri cervicem lotium exire. In  
fœminis ad vesica collum non adsunt illa glan-  
dula parastata, veluti in maribus, quod vesica  
collum in fœminis, tum brevius, tum latius est,  
quam in hominibus.

Nervi uteri.  
Vulvæ deseri-  
ptio.  
Vulva nō est  
musculosa,  
nō movetur  
voluntarie.  
Longitudo.  
Vfus uteri.

Vnde exeat  
lotium in ma-  
liere.  
Lotium non  
exit per cer-  
vicem uteri.  
Cur ad vesicæ  
collum non  
adsint glan-  
dula parasta-  
ta.

## De umbilico. CAP. XVI.

UMBILICVS, qui & vetula a quibusdā  
nominatur ratione rugarum quas præse-  
fert, in medio corpore situs est, ut recte sentit Ga-  
lenus ipse, & ante ipsum Aristoteles: quanquam  
vesalius frivolis quibusdam rationibus delusus,  
contra videatur sentire. Hic iure optimo me-  
liam corporis partem occupat, quod dum in ute-  
ro matris latitamus, per eundem nutrimur, per  
eundemque excrementa reddimus. Nihil autem  
est aliud umbilicus, nisi receptaculum horum.

quatuor vasorū, unius vena scilicet umbilicalis dicta (qua a matrice ortum sumens per umbilicum sursum partem quādam iecoris diuisam ingreditur, terminaturq. in venam portae) & duae arteriae umbilicales iidem appellatae (quae deorsum per fœtus abdomen tendentes, in duplicatione peritorae iuxta vesicam deferuntur, desinūtque in diuisione magna arteria) præter hæc quartum adest vas οὐραχὸς dictum, quod a fundo vesicæ initium sumens, urinam ex fœtu trahit: ea vero inter ἀμνιον membranam, & δεινυτοειδὴ reservatur. Sed hæc vasa infante postmodum in lucem edito eo quo diximus munere priuantur: sunt tamen instar funiculi cuiusdam, ne penitus inutilia corpori existant.

REAL-



REALDI COLUMBI  
CREMONENSIS  
DE RE ANATOMICA,

Liber XII.

DE FORMATIONE FOE-  
tus, ac De situ infantis in  
vtero.

**P**OSTQVAM de organis gene-  
rationis tam maris, quam femi-  
na tractatum absoluiamus, neces-  
sarium videtur ad fœtus humani  
tractationem deuenire. Qua in  
e illud primum admonendus est prudens, piusq;  
ector, hominis generatione, fœtus inquam, for-  
natione nihil admirabilius excogitari posse, ni-  
hil quod aque naturæ miraculum videatur, esse  
nihil quod humanū genus diuina prouidentia,  
sapientiæq; amore magis inflammet; ea enim ar-  
e effectus est, atq; efformatus hominis fœtus, ut  
llam admirari magis, quam laudare; laudare  
magis, quā exacte intropiscere omnia possis: nam  
icet omnibus in rebus Dei potentia, cuius maie-  
tati nihil obstat, nihil est difficile, elucere pos-

Continuatio.

Utilitas histo-  
riæ de forma-  
tione fœtus  
& nobilitas.

Difficile est  
scribere de  
formatione  
fœtus.

*sit in hoc tamen mihi illustrior videtur. Hoc igitur argumentum difficile satis nos, quantum in nobis erit, faciliiori modo, breuiorique [ni fallor] tractabimus, quam hactenus audieritis: idq; rationibus euidentibus & perspicuis, quantum res ipsa ardua patietur, nostrig; ingenij vires imbecille: & illarum quæstionũ, quæ ad rei cognitionem minime spectare videbuntur, exactam disputationem prudens omittam quæstiones vero, quas nõ disputaturus, sed sensus auxilio explicaturus sum illa sunt: Virum semen viri habeat tantum ratione efficientis, an vero etiam materie: & utrũ mulier concurrat ad generationem fœtus: & utrũ mulier habeat semen, an in coeundo semen emittat: & utrum fiant omnia membra simul: & utrum omnia reperiatur distincta in ipso semine: & utrum cor sit primũ, quod generetur, cum sit vltimum, quod moriatur: & utrum fœtus nutriatur sanguine menstruo: & an detur superfœtatio: & multa alia id genus quæstiones, quas breuitatis causa omitto. De hominis generatione verba facturus, cur nõ de brutis loquor, cum ab illis dedita opera natura nos distinxerit. Quamobrem non possum illos satis admirari, qui cum de hominis in utero matris formatione omnia pene ignorarent, & quæ in brutis imperfecte obseruabant, ad hominem maximo errore trãstulerant, de brutorum generatione scribere nõ erubuerint, præsertim de genera-*

Quæstiones  
aliquot quæ  
studiole præ-  
termittuntur.

De formati-  
one humani  
fœtus tracta-  
dum.

Quæ viden-  
tur in forma-  
tione fœtus  
beluini, non  
sine errore ad  
hominem  
trãnsferuntur.

ione piscium, quos ego in aquis natat, & quolibet vagari permitto. Illud profecto adnotatundignum est, testes in mulieribus genitos esse, ut vignerent semen: equidem testari ingenue possum me quandoque in fœminarum testium dissectione semen inuenisse album, crassumq; quodq; bene concoctum spectatores omnes uno ore fateantur: immo vero quale in viris ipsis nondum nueni. In coitu agitur, quo tempore vir semē eacalatur, idem quoq; a muliere fieri necessarium est: alioqui os uteri, quod angustū esse diximus, nullo pacto aperiretur. at aperiri os uteri necesse est, ut semen adeius concavum permeet, penetraretque: quæ si tunc bene affecta est, semenque utriusque bene concoctum, in utero ipso uniuntur, & fit cœceptio: quicquid de hac re dicat Philosophus, qui ex uno semine animal vnum probat generari. Illud vere scito. si viri seminis moles maior existit, virtusque maior, maremfœtum concipi, ac gigni: sin fœmina semen quantitate ac virtute superet fœminam euadere: nam ut maius lumē minus obscurat, ita presenti maiori virtute minor cesset, necesse est. Præterea cū hoc in philosophia receptū sit, omne simile suū simile appetere: quid mirū, si cū mas marē gignere appetat, fœmina fœminā, cū alterius semen alteri nūc præstat, maris exempli gratia, nūc mas gignatur, non fœmina: quod si fœmina, fœminam non marem? Quod si posteritatis causa, ita

Vfus testium  
in mulierib.

In testibus  
mulierum semen album,  
crassum.

In coitu mulier semen emittit.

Quando fiat conceptio.

Aristotelis error.

Quando mares gignantur & quando fœmina.

Cur quandoque mas gignatur, quandoque fœmina.



Vbi natura  
dominatur  
voluntate res  
illa non im-  
mutatur.

Cur semē vi-  
ri non detine-  
atur semper  
in Vtero for-  
mā.

Cur meretri-  
ces non con-  
cipiant, vel  
raro.

Cum mulier  
concepit, cur  
os uteri clau-  
datur.

Membrana  
allantoidis  
quomodo ge-  
neretur, & e-  
ius vsus.

A venis mat-  
ricis oriun-  
tur venæ in  
fœtu.

Venæ matri-  
cis a venis fe-  
minatis ori-  
untur.

Vena umbili-  
calis perforat  
allantoidem.

Iecoris gene-  
ratio.

Vena porta  
continua est  
venæ umbili-  
cali.

Quæ vena  
umbilicalis  
dicatur.

ut sit, marem semina cupiat, voluntatis hic est  
appetitus, non naturæ: at in quibus natura domina-  
tur, voluntate non immutantur. Igitur postquam  
semini ab utero obuiam itum est, & is in suam i-  
psius cavitatem illud suscepit, & detinuit (neque  
enim quoties viri semen uteri fundum petit, re-  
tinetur, sed quandoque excidit, vel quia male co-  
ctum est, vel quia loci muliebres nimis humidi,  
lubricique sunt, ut in meretricibus, quæ paucis non  
sunt contentæ, quarum ager die, nocturne mari-  
um imbribus irrigatur) tunc naturæ sagacis, &  
providæ motu, statim os uteri arctatur, ne semē,  
quod tanta voluptate suscepit, aliqua exeat, at-  
que elaboratur. Circa hoc conceptum semen mem-  
brana generatur, quæ amniotica appellatur, v-  
niuersum semen inuoluens, matricisque cavitati  
adhærens. Ne autem semen corrumpatur, di-  
ctum ac factum a venis matricis, quas a venis se-  
minariis proficisci suo loco diximus, venæ oriun-  
tur, quæ coeuntes venam producunt: quæ dictam  
tunicam tenuem, mollemque adhuc, quippe quæ  
paulo ante genita fuerat, perforat. Itaque ad me-  
dium usque, semen allantoidæ obvolutum penetrans  
globum efficit, qui globus ipsum est iecur. Deinde  
gignitur vena porta, quæ ut dixi in tractatu De  
Venis, continua est huic venæ umbilicali: (um-  
bilicalis namque dicitur ea vena, quam ad semē pene-  
trare perforat a allantoidæ, hepatis gignere diceba-  
mus, eo quod per umbilicum ingreditur, atque ad  
hepar

hepar ascēdit) post vena portæ ortum oritur ca-  
 va vena: idque ut uniuersum semen nutriri pos-  
 sit. Item ab arteriis vteri, quas a seminalibus or-  
 tum ducere proprio tractatu docuimus, arteria  
 generatur, quæ in duas arterias umbilicales quo-  
 que dictas euadunt, quæ non ascendunt, ut vena  
 umbilicalis: sed descendunt potius os pubis ver-  
 sus: diuisioq; illarum est supra ilia: deinde fit ma-  
 gna arteria, & immediate cor, & arteriæ ascen-  
 dentes: adeo ut arteria gignantur, priusquã cor  
 ipsum generetur. Arteriarũ autẽ generatio non  
 fuit supernacua, sed seminis viuificandi gratia.  
 Viuimus enim prius vita plantæ, deinde brutorũ  
 vita in vtero matris: hoc peractõ, cerebrũ gene-  
 ratur, ut merui ab eo profecti sensum primo, dein  
 de motum ad uniuersum fœtum deferre possint.  
 Interim enim alia fiunt membra, quæ deline-  
 ta primo, deinde aucta, & robustiora reddita mo-  
 uentur. Sileant hic obsecro Aristotelici, vnã cum  
 principe Peripateticorum Aristotele, qui (in hoc  
 mire deceptus) cor primo gigni voluit, & si Deo  
 placet, sanguinis fontem esse, & sensuum omni-  
 um: qui nisi obstinate Aristotelem tueri volent,  
 quiescent veritate iubente, desinentque tam fal-  
 sa profe re, & mordicus tueri: fatebunturque  
 non cor, sed iecur primo gigni. Cerebrum item  
 corde nobilius esse, non fateri non poterunt:  
 quippe quod ex ipso semine fiat, non ab vtero,  
 ut de corde audistis. Non equidem negauerim

Ortus venæ  
 causæ, & vsus  
 Arteriæ vteri  
 vnde oriatur.  
 Arteriarum  
 umbilicaliũ  
 ortus & pro-  
 gressus.

Arterię nũ ge-  
 nerantur ante  
 cor.

Cur arterię  
 generentur.  
 Fœtus viuif  
 prius vita  
 plantæ, dein-  
 de vita ani-  
 malis.

Cerebrum  
 quando geno-  
 retur, & cur.

Cor primo gi-  
 gni falsum  
 est contra A-  
 ristotelem.  
 Cor non est  
 fons sangui-  
 nis & sensuũ.

Iecur gigni-  
 tur prius cor-  
 de.

Cerebrum  
 nobilius esse  
 corde proba-  
 tur.

Cor est primum quod oritur in animalibus quæ nascuntur in ouis. In homine nascitur iecur priusquam cor. Spina dorsi inter ossa primo generatur. Aristoteles laudatur. Hieronymus Pontanus. De aliis partibus, obseruare non potuit.

Affusio orbicularis instar placentæ. Vfus. Galenus non descripsit humanum fœtum. Galeni error. Placentæ huius substantia qualis. Placentæ situs. Non circuit vniuersum fœtum. Cur in partu

in ius animalibus, quæ in ouis nascuntur, primum quod oritur esse cor ipsum. At in homine iecur, priusquam cor generatur: quemadmodum mihi non semel, sed sæpius intueri, & animaduertere contigit. Inter ossa si quæras quid primo generetur, vertebrae respondebo. Spinam scilicet, ut Aristoteles eleganter scripsit, & vere. Hanc veritatem corona illustrium virorum, & præ excellentium magna cum voluptate vidit in Romano theatro, cū Hieronymus Pontanus summus Philosophus embryonem menstruum mihi publice disse candum tradidisset, ob communem Romanæ Academiæ utilitatem: reliquorum autem membrorum quod primo fiat, quod posterius, nondum mihi licuit obseruare cum abortuum non ea sit copia, quæ in tanta re necessaria esset. Genita allantoides, venis, arteriisque per umbilicum tendentibus, quæ suo in exortu plurimæ sunt, ut fulciantur, natura affusionem quandam genuit, quæ orbicularis sit placentæ in modum: facta autem fuit, ut vasa, quæ diximus, unita detineret: hæc a Galeno, qui humanam non descripsit, membrana  $\chi\omega\pi\iota\omega\nu$ , hoc est, secundina appellatur. Sed hæc in nobis minime est membrana, sed crassa quadam materia excrementorum instar: usus eius est, quem paulo ante dicebamus: hæc licet allantoidi superposita sit, tamen fœtum vniuersum minime circuit, matrici admodum coheret. Itaque nihil mirum est, si in partu magna sit san-



sit sanguinis effusio: venæ etenim, arteriæq; dis-  
 rumpuntur. Anteriore in parte sita fuit, ut pro-  
 pugnaculi vicem gereret, quod nos ab externis  
 iniuriis tueretur: hac in brutis, ut boue, capra, e-  
 qua, & id genus animantibus membrana qui-  
 dem est, internam regionem omnem ambiens,  
 in illisq; quibusdam eminentiis prædita est, quæ a  
 veteribus acetabula appellantur. In canibus hac  
 quam dicimus, secundina est instar fasciæ, quem  
 admodum illam Vesalius pinxit, qui caninā pro  
 humana pinxit, licet in ea nō catellum, sed infan-  
 tulum pinxit: sed secundina in homine est, quem  
 admodum ego supra explicavi. Allantois vero in  
 nobis membrana insignis, & magna uniuersum  
 fœtum inuoluēs, ante scilicet, retro, infra, supra-  
 que, sed in animalib. quæ paulo ante dicebamus,  
 facta est in morem sarciminis, quod vox Græca  
 sonat ἀλλαντοειδής, neque in illis fœtum undique  
 ambit, sed illi substernitur: neq; illud temere, sed  
 ut urinam suscipiat. Præter hæc, quæ hæcenus  
 memorauimus, tertia est in humano fœtu consi-  
 deranda membrana, quæ neq; bruta ipsa destitu-  
 untur: hoc unū interest, in illis crassa est, quem-  
 admodum ait Galenus, in nobis autem tenuissi-  
 ma est, diciturq; ἀμνιος, vel ἀμνέτιος: ab hac quoque  
 uniuersus inuoluitur fœtus, & in ea immediate  
 fœtus situs est, & sudor a fœtue manans, atq; eius  
 excremētū cōtinetur, in quo sudore innatat, atq;  
 ab eo fulcitur: ita. n. minus molestus est puer ma-

magnum so-  
 quitur sangui-  
 nis profluuiū  
 Ratio situs  
 placente red-  
 ditur.  
 Hæc placenta  
 in brutis qua-  
 lis sit.

Acetabula,  
 quæ dicantur  
 vteri Anat.  
 Secundina ca-  
 nis instar fa-  
 sciæ.

Vesalius astu-  
 tus qui secū-  
 dinam canis  
 cum pinxisset  
 non catulum  
 sed infantu-  
 lum in ea  
 pinxit.

Allantois mē-  
 brana in ho-  
 mine qualis.  
 Allantois qua-  
 lis sit in bru-  
 tis.

Allantois quid  
 significet.

Tertia mem-  
 brana amni-  
 os qualis &  
 eius vsus in  
 humano fœ-  
 tu.

Sudoris detē-  
 ti ab amnio  
 vsus.

Cur præter u-  
 rinam & su-  
 dorem non  
 sint alia ex-  
 crementa fœ-  
 tus.

Fœtus nutri-  
 tur sanguine  
 laudabili, nō  
 menstruo.

Error vulgi.

Vrina infan-  
tis vbi serue-  
rit.  
Cur vrina nō  
attingat for-  
tuna.

Quid  
ubi, & cur.

Cur sudor &  
vrina pueri  
tot mensib.  
detenta non  
putrescant.  
Vtilitas sudo-  
ris & vrinae  
dum in ute-  
ro sumus.  
Vtilitas sudo-  
ris & vrinae  
in partu.  
Quid appel-  
lent obste-  
trices aqua.

tri. Ne mireris aut factu alia excrementa nō dect-  
di prater urinā, & sudorē. nā ratio in prōptu est,  
quod scilicet fœtus ex solo sanguine alitur, eoque  
laudabili, nō mēstruo & teterrimo, vt vulgus ho-  
minū putat. Sudor, vt diximus, penes fœtum ser-  
uatur hac in membrana, quae <sup>amnios</sup> dicitur, utri-  
na vero ipsa, alterū scilicet fœtus excrementum  
seruatur inter amnion, & allātoida: hoc autē non  
temere, sed summa cū prudentia effecit Dēus o-  
mnipotens, ne lotiū attingeret fœtū, qui cū temel-  
lus sit, supra quam dici possit, a lotio falso atq; acri-  
facile exesus fuisset. Natura itaq; Dei ministra in  
fundo vesicae porū, seu meatū genuit, qui <sup>ouipax</sup> <sup>χρὸς</sup>  
nominatur, qui a vesica fundo ad umbilicū sur-  
sum fertur, exit vero ea in parte, per quam vena  
arteriaq; umbilicalis ingreditur, ipsiq; adhare-  
scit hic vrachos, amnion mēbranam perforat, i-  
taq; fœtus urinā in allātoidē defert. Hic querere  
aliquis posset, neg. id iniuria, quo pacto tāta excre-  
mentorū vis tā diu putrescēs detineatur. Cui re-  
spondere facile possum, id caloris naturalis cōser-  
uantis virtuti acceptum ferendū. Neg. hac tam  
diuturna excrementorū fœtus cōseruatio inuti-  
lem prorsus naturae existimes, immo vero & dum  
in utero fœtus alitur, ita ab utero gerētibus faci-  
lius sustinetur. Dum vero partus instar tempus,  
has duas mēbranas amnion, & allantoida disrū-  
punt, & exeūt, secūq; vna fœtus, propterea obste-  
trices duo, quae diximus, excrementa aqua nomi-

passim

nasim vocant; cum aquam exeuntem vident,  
 partum mox in lucem proditurum astantib. præ  
 dicunt: qui si tunc exit, partus ipsius exitus est fa-  
 cilior, feliciorg. Nam parum excrementorum hu-  
 miditate partes lubricæ redduntur (quod si remo-  
 rantur, magna cum difficultate, aggreg. paritu-  
 ram puerperam certo scito. Scire omnes cupiunt,  
 quæ sit pariendi dolorum causa potissima: quibus  
 breui satisfaciam, dolere vehementissime parie-  
 tes ob angustiam in oris matricis: quã tunc adeo  
 dilatarî necesse est, ut fœtui absq. difficultate exi-  
 tus pateat: & quoniam ex mulieribus nonnullas  
 inuenias, quibus os uteri durius est, & nerueum  
 magis, hinc dolores parturientium non sunt iidẽ  
 sed aliquæ statim, & pene sine dolore pariunt, alia  
 diutius in doloribus, & cruciatibus, illisq. vehe-  
 mentissimis versantur, priusquam pariant: ita  
 ut inueterata sit inter mulierculas, & vetulas o-  
 pinio, in ipso partu nullum esse os, quod suo stet lo-  
 co mulieris parturientis: sed omnia dimoueri, at-  
 que e sua sede exire, licet rei veritas hæc sit, os coc-  
 cygis dumtaxat in partu pati: propterea observa-  
 mulieres quæ peperere de regione coccygis sæpe,  
 multumq. conqueri. sed iam ad fœtum ipsum re-  
 deamus. Fœtus in matris utero alimẽtũ per um-  
 bilicum suscipit, venæ umbilicalis ope: fabuleq.  
 sunt, quas magnus Hippocrates, qui omnia scire  
 non potuit solus, de pueri nutrimento in aluo ma-  
 tris dixit: quod scilicet per os exugat: & profecto

Si cum ex-  
 cremẽtis ex-  
 eat fortus,  
 partes est fa-  
 cilis, & cur.

Cur tãti sint  
 dolores par-  
 turientium.

Cur aliæ ma-  
 gis, aliæ mi-  
 nus dolent in  
 partu.

Ossa omnia  
 mulieris in-  
 partu e sede  
 moueri fabu-  
 lum est.  
 Coccyx in  
 partu pati-  
 tur.

Quomodo  
 fœtus nutri-  
 tur.  
 Hippocratis  
 error maxi-  
 mus refelli-  
 tur.



tāti viri errorem tam crassum, nequeo satis mirari: nam inter os foetus, matricisq<sup>3</sup> substantiam multum interest. sed fac nullum inter hæc spatiū dari: age, os foetus uteri corpus attingat: quo pacto succum, qui vel in matris ventriculo est, aut in intestinis, exugere posset optime Hippocrates? Quamobrem haud dubie scias cādide lector, factum nihil prorsus per os assumere: quod si assumeret. suo ipsius sudore hausto obrutus non interire non posset: sed per venam umbilicalem dum taxat nutriri, nutriri inquam bono sanguine, atque adeo perfecto, qui per vasa seminaria deferatur: quod idcirco factum fuit, ut materiam una cū sanguine continenter deorsum ferrent, tanquā auxiliares copias, si quandoq<sup>3</sup> sanguis deesset. Quod si perfecti seminis numeros omnes nō explet, nihilo secius materia est, quā natura eo mittit, ut in semen tandē conuertatur. Vana quidē est, falsaq<sup>3</sup> eorum sententia, qui foetum sanguine menstruo nutriri aiunt: nam quod illi pro huius rei probatione in medium afferunt, dum foetus in utero est, stato tempore menses nō fluere, nihil est: nam ego complures noui, quibus uterū gerentibus singulis mensibus menses profuebant, quod ob magnam sanguinis copiam in illis mulieribus euenire certum est. Quibus vero tanta sanguinis copia non adest, iis dum grauida sunt, neque adsunt menstrua purgationes, quia non gignitur, quod superuacaneum sit natura inutile, &

Infans in utero alitur per venam umbilicalem sanguine perfecto.

Cur sanguis e quo alitur infans in utero per vasa seminaria deferatur.

Sanguine menstruo nō ali foetum probatur. Aliquibus uterum gerentibus fluit menstruus sanguis.

Quibus praegnatis menses non fluunt, cur non fluant.

in utero eiiciendum: sed uniuersus ad fœtum i  
 sum natura miraculo distribuitur. Nihil enim  
 aliud esse existimato menstruum sanguinem, qui  
 diuersis rationibus diuersas habet appellationes,  
 quam sanguinem superuacuum, qui herbas, atq  
 arbores non cogit arescere: quemadmodum scri  
 psit Aristoteles. Hippocratis vero sententiam,  
 quod infans ore sugat, hinc ortam puto: quod is  
 materiam illam, quæ in fœtus intestinis conspic  
 tur, facies, cibique excrementa crediderit, quem  
 admodum in adultis: sed deceptus est bonus Hip  
 pocrates. Non enim cibi, sed sanguinis excrementum illud  
 est, quod in fœtus intestinis continetur: propter  
 ea non male olet materia illa, quemadmodum fa  
 ces nostra. Quod si cibi excrementa forent, e  
 mitterentur, veluti lotium emittitur. Itaque  
 undique conspurcati essemus magno natura er  
 rore, magno infantis detrimento, quod absurdum  
 esset. Natura igitur sapiens noluit nos, dum in  
 utero matris versamur, neque oculis uti, neque  
 auribus, neque instrumento odoratus, neque  
 gustus, neque ore, neque pulmonibus, neq  
 ventriculo, neque intestinis, neque ano, neque pene,  
 neque manibus, pedibusve: quo enim tendas in  
 illis materni uteri tenebris? quod atroctes? quis  
 penis usus? quis ani? quis intestinorum, aut ven  
 triculi? quid ore trahere nisi mortem posset? quid  
 gustet? quid olfaciat? quibus harmoniis aures  
 detineat, & mulceat? quorsum oculos flectat,

Menstruus  
 sanguis quid  
 sit.

Mensibus nō  
 arescunt ar  
 bores.  
 Causa erroris  
 Hippocrat.  
 quod infans  
 ore lugat ci  
 bum in ute  
 ro unde ma  
 nauit.

Cur quod in  
 intestinis in  
 fantis, qui in  
 utero est con  
 tinetur, non  
 male oleat.  
 Quibus mē  
 bris dum in  
 utero sumus  
 non sit opus  
 uti.

Infans in utero non indiget usu cordis.  
In utero per arterias respiramus.

Arteria & vena umbilicales describuntur.

Obstetricum prædictus tot fore partus quot nodi cernuntur in vasis arteriarum venarumq; umbilicalis.  
Vfus venarum & arteriarum umbilicalis.

Vasorum nexus in umbilico, nexus, progressus & utilitas. Non est la-

*Et recreet? imo vero quod magis miraberis, neque cordis usu tunc eget infans, nam vitalis spiritus, seu maior spiritualis sanguis per arterias matris umbilicales ad foetum fertur, quibus arteriis mediis, quarumq; auxilio respiramus, si illa respiratio dici meretur: adeo ut foetui nihil sit elaborandum, neq; in sanguinis, neq; vitalium spirituum generatione. hac namq; a matre iam elaborata ad omnes foetus partes deferuntur: haec arteriae umbilicales & vena item umbilicalis a matrice ad umbilicum usq; longo nimirum ductu a peritonaeo inuoluntur ibi crasso satis, quae vasa contorqueantur, & quosdam nodos efficiunt: quibus visis nodis (non enim iidem numero sunt in omnibus quae peperere) prædicunt obstetrices, quae medicæ ipsae quoq; si Deo placet, videri volunt: tot foetus ab eo utero prodituros, quot ipsi sunt nodi, licet totidem plus minus in extremo foetu, quot in puerperio conspiciantur. Haec autem vasa creata sunt non temere, sed ut sanguis ad foetum ductus cunctaretur, & cessaret quodammodo in ipso cursu: ut hac cunctatione ad ipsum perveniret. Vasa haec, quae diximus, a membranis tecta ad cervicem tendunt, & circa ipsam flectuntur deorsum tendentes, atq; in umbilicum infiguntur. Quot vasorum nexus per sinistram scapulam ascendens per dextram descendit: idq; ut in exitu membranas cum secundina secum una traheret, quod superstitiosa muliercula laqueum esse dicunt, atq; in lucem editis male ominan-*

ominan-



ominantur, quasi illi si superstites sint, non possint  
 ande non suspendi. Sed si diligentius hac natura  
 arcana scrutaretur in illis praesertim, qui non sunt  
 ingrippae sed capite antesignano prodeunt, idem in  
 omnibus obseruarent; cum tamen pauci suspendan-  
 tur, non omnes. Illud praeterea adnotandum est,  
 quamuis unica adsit in utero cavititas tamen plu-  
 res fetus in illo concipi posse, si apta adsit tot con-  
 ceptibus materia: quae conceptus materia, semen  
 in qua est: dum vero fetus delineatur nisi suis singu-  
 li membranis distinguatur simul cohereret, monstra-  
 que hominum sese attingeret in finit. De fetus forma-  
 tione satis multa haecenus dicta sunt: nunc de situ  
 eius in utero dicamus: quam partem libentius, ut o-  
 minor, lector candidus percurreret, quod alii non rem-  
 ipsam, sed quod verisimile cuique visum est, ita scri-  
 ptum relinquerent: omnes tamen a rei veritate tam ab-  
 errarunt, quam qui maxime. Ego vero non semel, sed  
 saepius non modo mortuos fetus, sed viuos etiam e  
 matris utero hisce manibus extraxi, quod dum ef-  
 ficerem, situm eius in utero diligenter obseruavi,  
 quem a quibusdam Anatomicorum picturis adeo di-  
 uersum esse facile perspexi, ut non potuerim eorum  
 temeritatem non valde mirari, qui quod falsum est,  
 cuius oppositum sensu deprehendi potest posteris scri-  
 ptum relinquere non erubuerint. Tres igitur fe-  
 tus in utero situs obseruasse fateor, & profiteor  
 praeter ea nullos: quorum prior est caput deorsum  
 versum, hicque est situs omnium frequentissimus

queus qui  
 praedicat sus-  
 penderet  
 quae putans  
 obstrictes.

Quomodo  
 possunt gi-  
 gni plures for-  
 tus in utero.  
 licet vna tan-  
 tum sit eius  
 cavititas.

Quomodo  
 fiant mon-  
 stra plurimum  
 infantium se at-  
 tingentium.  
 De situ in-  
 fantis in ute-  
 ro.

Situm infan-  
 tis in utero  
 quem ima-  
 ginabantur,  
 non quem vi-  
 derant descri-  
 ptere, anatomi-  
 ci alij.  
 Temerarium  
 est scribere,  
 cuius oppo-  
 situm sensu  
 deprehendi  
 possit.

Tres situs so-  
 lidantur in-  
 fantis in ute-  
 ro.  
 Primus situs.

Secundus si-  
tus.

Tertius situs  
Qui primo  
sunt in v-  
tero, quo-  
modo exeāt  
uterum.

Qui secundo  
sunt in vtero  
contineantur  
agrippa.

Qui tertio si-  
tu sunt in ma-  
trice quomo-  
do in lucem  
ferantur.

Non potest  
infans in vte-  
ro a capite ad  
pedes delabi,  
vel contra.

Quocumque  
situs sit in ans  
in vtero sphe-  
ricus in oblo-  
gum vergens  
situs est.

Particularis  
descriptio  
singularium  
partium in-  
fantis quo si-  
tu sunt in vte-  
ro, & vera.

*Secundus capite sursum elato quo situ raro videtur infantes in vtero. Tertius transuersim iacet, atque hic est secundorarior. Propterea priore situ infantes capite praeunte in lucem prodeunt. Secundi pedibus, qui & agrippa vocantur Tertij natibus, facie omnes coccygē matris versus respiciunt. Iam enim explosa illorum sententia est, homines prius quam uterum exeant, simiarum instar seu funambulorum, & mimorum capite ad pedes, vel e contra dilabi, & procumbere: vel e conuerso. Id enim loci angustia minimopatitur, quæ tāta est, ut vix nostri sit capax, cum excrementis, membranisque, siue capite elato, siue deorsum labente, vel transuersi siti simus. Quocumque autē situ ex hoc triplici toties enumerato nos uterus exceperit: in globum atque orbem excipimur, sphericusque est omnis situs infantis in vtero sphericus inquam in oblongum vergēs & ut priuatim res magis innotescat, dexterum brachium nobis tunc flectitur, manus autem extrema una cū digitis extenditur, qui digiti sub aure dextera, superque ceruice positi sunt: sinistrum vero brachium tantum non extenditur, supraque sinistram mammam, necnon supra faciem (caput namque in vtero ita flectitur, ut mentum ad thoracē perueniat: ) sinistrum itaque brachium medio cubito dextero fulcitur digitis semitextensis, pollice deorsum: crura tāta arte sursum feruntur, & incuruantur, quasi in arcū, ut dictu visique*

visuqueres pulcherrima, & admirabilis existat: femur, tibia, pesq; extremus dexter nobis eo tempore flectuntur, adeo ut a femore abdomē attingatur, a genu umbilicus, deinde tibia deorsum flectitur, calceq; sinistras nates attingit, extremum eleuās pedem, pudendaq; occultās, adeo ut pollice dimidiū, tibiā ipsemet tāgat, sinistrū crus ipsum quoq; semiflectitur: femur ventrē imum tangit, tibia supra abdomen, thoracēq; vertitur, & sub extremū brachiū: pes autē extremus sursum voluitur dextrum ὡς ἐκ παραυα attingens, sinistrig; brachij μετακλίστιον dorsum deinde in anteriora fertur, adeo ut ex his omnib; sphericus oblongus euadat: atq; hic est verus, & legitimus situs humani fœtus in utero, quem ego Iacobo Antonio Bono Ferrariensi Medico præcellēti, qui simplicia medicamēta in Romana Academia publice proficitur, estq; rei Anatomica, reliquarūque bonarū artiū, & scientiarum tam studiosus, quam qui maxime, cum eum vnice diligam, prium lubens ostendi. Qui rei pulchritudine alle-  
tus, & detētus obstupuit, summique opificis scientiā inenarrabilem summis laudibus extol-  
lebat. Quis enim fœtus humani generationem nutritionem, situmque contemplatus non obstu-  
rescat? Quis Dei infinitam bonitatem satis lau-  
let? Equidem de his silere satius est, quam pauca  
licere.

Iacob. Bonus Medici-  
cus Ferrari-  
sis.

Fœtus hu-  
mani gene-  
rationis, nu-  
tritionis &  
situs confi-  
deratione  
ad Deum  
laudādum  
inuitat.



466 DE TEGENTIB. FABRICAM  
REALDI COLUMBI  
CREMONENSIS  
DE RE ANATOMICA,  
Liber XIII.

DE TEGENTIBVS FABRI-  
CAM HVMANI CORPORIS.

De cuticula, cute, pinguedine, membrana  
carnosa, pilis & perioftio.

CAPVT. I:



*C*ORPVS nostrum, in quo tan-  
tum industria natura meritocol-  
locavit, vndiq<sup>3</sup> tectum esse decu-  
it, ne ab aere ambiente alterari  
ab externisq<sup>3</sup> rebus ladi tam fa-  
cile possset: propterea natura prudens hac tegu-  
menta genuit, extrinsecusque in vniuersi su-  
perficie obduxit, primo cuticulam, quam *indeq<sup>3</sup>*  
videt<sup>r</sup> & *indeq<sup>3</sup>* cuticula. *videt<sup>r</sup>* vocant Graci, qua cutem supereminet, &  
ambit: hac nobis communis est cum ceteris ani-  
mantibus: tenuissima est, earu pellicularum in-  
star, quas inter caparum septa videmus, facile  
aboletur, facile etiam restituitur, estque omni-  
prorsus sensus expers. Huic epidermidi vera cu-  
tula

Deperditur  
& renasci-  
tur facile.  
Sensus ex-  
pers.

tis subest, <sup>deppem</sup> *de qua a Gracis dicta, quæ & ipsa uni- vera*  
 uersum corpus inuestit: quædam tamen loca ex- <sup>cutis.</sup>  
 cipio, ubi perforatur, ut in auribus, oculis, nari-  
 bus, ore, pene, ano, vulua, extremis digitis, ubi  
 ungues affixi sunt: his addere poteris umbilicū  
 in fœtu. Præter hæc cutis foramina, vel lippis no-  
 ta, & perspicua ubique poris refertissima est, &  
 instar cribri foraminulæta, per quæ sensui occul-  
 ta foramina sudor exit. Sed hæc in nonnullis la-  
 tiora sunt, in aliis angustiora: hinc aliis sudor nul-  
 lo negotio profluit: aliis agre excitatur. Cutis sub-  
 stantia non est ubique eadem: nam hic crassior  
 existit, ibi minus crassa, illic tenuior. Crassior cu-  
 tis in capite conspicua est: licet Aristot. opposi-  
 tum scripserit, cutem, inquam, capitis omnium  
 tenuissimam esse. Subtilis admodum est cutis in  
 facie, pene, scroto, vola, atque internis digitis, seu  
 digitorum interuallis: quamuis illa ob exercitia  
 frequentia crassescere consueuerit: reliquas cor-  
 poris partes si accurate contempleris, parum  
 interesse indicabis: cuius substantia neruea est:  
 nerueum autem, seu nervosum cum dico, rem ex  
 nervis conflata minime intelligo, sed ex sub-  
 stantia alba, sensu prædita: ex nervorum filamē-  
 tis, venis & arteriis conflata: quare cum nervis  
 non careat, optimo sensu præditam esse quid ve-  
 ruit? quāuis contrarium senserit philosophus, qui  
 sensum in carne falso posuit. Cutis alicubi perti-  
 nax est, alibi laxa: in facie nāq, in aurib. in vola,

Substantia  
varia,

Aristotelis  
error.

Vbi tenuior  
fit cutis.

Substantia  
neruea.

Quid per  
nerueum sit  
intelligen-  
dum.

Cutis sentit  
contra Ari-  
stotelem.

Vbi fit perti-  
nax.

in planta pedis pertinacem esse excoriando experieris. Quoniam in hisce locis cutim mobile esse oportuit. Sub cute pinguedinem, seu adipem cernes, nihil enim nunc refert, quæ colore alba est, itaque nota unicuique, ut neque descriptione, neque alia egeat explicatione. Usus pinguedinis est, ut calorem natium non secus ac vestis detineat: neque hoc solum præstat, sed propugnaculi vice fungitur, cibi etiam vice in extremis inediis fungitur, & in maribus quemadmodum in fœminis reperitur, quicquid Gal. lib. De temper. scripserit, in maribus scilicet nullam, aut exiguam quidem certe adesse pinguedinem. Gignitur autem ex sanguine crasso e venis exudante, eiusque copia ingens in frigidis temperaturis cernitur, contra exigua in calidis, cum a pene, scrotorum discesseris, in reliquis nostri corporis partibus inueniri pinguedo potest. Quod si motum usumque eorum, quæ pinguedine carent, consideraueris, facile rationem diuersitatis inuenies. Substantia pinguedinis non est omnevis ubique: nam in vola, & sub pedis planta, pene carnea est, ac dura: huiusmodi vero ob motum ipsum effecta est: non est tamen sensus organum, ut Auicenna scriptum reliquit. Pinguedini subest membrana carnea dicta, quæ ipsa quoque vniuersum corpus ambit: & quartum illius inuolucrum existit, a summo capite ac extremum usque pedem velaminis instar. Carnea vero, seu carnosâ dicitur eo quod in collo car-

Adeps sub  
cute.

Vtilitates  
pinguedi-  
nis.

Galenî er-  
ror.

Generatio  
pinguedi-  
nis.

In scroto &  
pene.

Vbiduræ re-  
periatur a-  
deps.  
Error Auicennæ.

Quantum  
inuolucrum.  
Quare dica-  
tur carnosâ.



rosa euadit, atq; adeo carnosae, musculosa. Adde  
veteres Anatomicos huic membranae carnosae  
nomen imposuisse: quoniam infantibus carnea  
est, multisq; fibris referta, quae deinde euanescent  
tractu temporis. Illud velim nō oscit ante anim-  
aduertatis, carneam membranam sub ala mini-  
me musculosam dari: licet Galenus primo De A-  
nat. administ. musculosam ibi esse hāc membra-  
nam existimauerit. Ex quo loco, ut reliquos nūc  
missos faciam, aperte colligi potest Galenum simi-  
les, brutaq; non homines secuisse. Adhaeret carnea  
membrana musculis ipsis, & inter ipsam, cutem-  
que vena ambulant, superficiariae, e quibus san-  
guis mittitur, & arteriis carent. Tempora exci-  
pio, frontem, caput, penem, scrotum, & digitos,  
quibus locis exigua numero inueniuntur arteriae  
inter cutim, & membranam carneam.

Galenus er-  
ror.

Colligitur  
Galenum  
non secuisse  
homines.

# De pilis. CAPVT II.

**P**ILI quamquam superuacuae partes nescio quo  
pactō videntur esse, tamen quoniam corporis  
nostri veluti tegumentum existunt: de his quo-  
que sermo a nobis habendus est. Nam prae-  
terquam quod corpus tegunt, ut diximus, eidem  
propugnaculi vice deseruiunt. Addunt aliqui  
tertium usum pilorum, ut vapores illi fuliginosi  
qui in tertia alimenti coctione eleuantur, dum  
in substantiam membrorum transit, in pilorum  
nutrimentum consumerentur: quam sententi-  
am neque laudo, neque vitupero: facti etiam sunt

Vfus Pilorum.

Pili pro se-  
cundo tegu-  
mento.

Vnde oriatur.

Ex qua trahant alimentum.

Hispanus pilosus.

Vestalis pilosa.

Quare vola & planta careant pilis, aliorum fenetria reprobatur.

pili ad ornatū. Ortus eorum hic est: e cute emergunt, eam totam perforantes: in radice crassiorcm pilum, quam in reliquis partibus deprehendes, pinguediniq; illi affiguntur, quam inter cutem, membranamque carneā sitam esse diximus,

praterquā in scroto: propterea pili alimentū a pinguedine trahunt: itaq; augescunt. eorum substantia sicca est, ut videtis in variis nostri corporis partibus: vix enim agrestē hominem inuenias, qui pilosus undique cōspiciatur, ut in brutis cernimus. Ego tamen Hispanum quēdam vidi pilis refertissimum in omni corporis parte, praterquā in facie, & manuum parte. Vidi etiam vestalē adeo pilosam. Sunt qui scribāt neq; in plāta pedis, neque in manus vola, pilos oriri posse. Causam in lacum tendinē reiciunt, cū nullo pacto sit causa: sed depiles he partes facte sunt tum ob vsum, tū

ob motum. Quod autē hac pilorum carentia (ut ita dicamus) in latum tendinem reici nequaquā debeat, instantiam in prōptu habeo plāta, vola, & leporis, quae depilis non est. sed pilis referta: licet lati tendinis ex pers non sit. quas partes in lepore natura sagax pilis muniuit leuitatis gratia, queres in animali adeo timido ob fugam necessaria erat. Sed iam de pilis satis.

### De perioftio. CAP. III.

Substantia.

**P**ERIOSTION membrana est neruea, tenuisque, quae ossa ambit, illisque valde, atque adeo, valide adhærescit, multo sensu prae dita.

pro.

propterea multi decepti sunt huius membranae i-  
 guratione ossa sentire existimantes. Hanc in in-  
 terna caluaria ne querito: nā ibi nulla est, quam-  
 uis sub pericranio inueniatur: neque dentes peri-  
 ostio inuestiuntur. Quid enim dentibus opus e-  
 rat periostio? neque illud in articulationibus osti-  
 um spectatis: quod si adesset, miros dolores exci-  
 taret in illorum motu.

Periostion.  
 in interna  
 caluaria nō  
 reperiri.  
 Dentes va-  
 cant perio-  
 stio.  
 Cur in arti-  
 culis nō in-  
 ueniatur.

REALDI COLUMBI  
 CREMONENSIS  
 DE RE ANATOMICA,  
 Liber XIII.

DE VIVA SECTIONE.

**D**um Anatomes cognitioni studio-  
 se incumbimus, velis (ut aiunt)  
 & equis: nonnulla quandoque oc-  
 currunt, quae nos in ipso cursu re-  
 morantur, quorum actionem scire nullo pa-  
 to possumus, nisi viua sectione utatur, non  
 hominis quidem, ut veteres vsi sunt, quod ne-  
 fas, atque impium Christiano Medico non vi-  
 deri non posset; sed brutorum, cum praesertim  
 animaduertere liceat, ob viua humani corpo-

Viua sectio.  
 Cur viua v-  
 tamur secti-  
 one.



ris Anatomicen, quaprisici medici utebantur, adeo male audisse, ut non modo viuos homines secare, sed ne hominis quidem cadauer liceret.

Galen. cur non secuit homines. Non debet Gal. antiquis contradicere,

Atque hanc vnā ob causam Galen. adductum puto, ut ab humani corporis Anatome abstineret. Sed bone Galene si tibi crudele nimis videbatur viuū hominem secare, si animus horrescebat, si reformidabas, vel si tibi neg, vel mortuum hominem secare per Principum edicta, aut inueteratam cōsuetudinem non licebat: quo pacto licebat tibi simias secanti veteribus contradicere, quos humana corpora secuisse, tu ipse testis es locupletissimus? Profecto hodie cum ob cōmunē viuorū utilitatem cōcedant Pontifices, Reges atq; Imperatores, ut in publicis Academiis quotannis Anatomici reorū cadauerib. secandis Anatomicen profiteantur, facile est controuersias istas diiudicare. Multis in locis veteres reprehendis,

Ex simia sectione perfecte humani corporis Anatome acquiritur non potest contra Gal. ordinem. Non licet homines viuos secare.

cum tute maiore his dignus sis reprehensione. Nā etsi simia simile quid habeat hominis, simia tamen est, non homo: neque eius compago hominis fabrica omni ex parte respondet, partesq; nōnullas in homine conspicies, de quib. veteres Anatomici loquebantur, quibus simia caret. sed ad rem redeamus. Cum viuos homines secare Christiana Religione prohibemur, si neg, simia, neg, vrsi aut leonis copia suppetat, cuius fabrica humanae proxime accedit, quorū etiā viuorū sectio, quod ferē sint, licet mansuesacta, cum irritatur difficilima esset,

esset, de viui canis sectione loquamur. Canem i-  
 gitur deligito, seu marē illum, seu feminam ma-  
 uis, iuuenem. catelli namq<sup>3</sup>, dum secantur, voci-  
 ferantur magis, quam senes: oblonga etiā sit cer-  
 uice. Canem propono viuū secandum potius,  
 quam suem, quod pro reuersuorum neruorū v-  
 su dignoscendo sues minus accommodi sunt, tum  
 ob pinguedinem extuberantem, tum ob eorum  
 ingratum nimis aurib. clamorem, & grūnitum,  
 quod ego Cremonæ expertus sum, ut præcellenti  
 medicorum collegio in hoc quoque satisfacerem,  
 præsertim Bonhomini Ofredo, Hieronymo Ma-  
 tagno, Petro Manæ, Ioanni Baptistæ Picenardo,  
 Ioanni Francisco Borgio, Ioanni Baptistæ Bonet-  
 to. Cum enim totius Anatomæ historiam ex hu-  
 manis cadaueribus accurate me dissecante con-  
 spexissent, efflagitarunt, ut viui canis Anatomæ  
 pro vocis organo præcipuo illis in iuene sue ostē-  
 dere ne grauarer. Quod lubens feci, neque sine  
 frustrati sumus, sed nimis obstrepebat. Dimisso i-  
 taque sue, canis iuuenculus in promptū sit longo  
 (ut diximus) collo. (est enim canis animal, quod  
 latratu vocem effingit, atque efformat) Tabella  
 ad sit necesse est supra, infraque foraminibus eo  
 ordine distincta, ut iis vinculis suscipiendis sat  
 sint, quibus quatuor canis crura vincias: ita ta-  
 men, ut explicata sint, & distincta. Caput iū eo  
 modo deligandum est, ut canis quidē vociferari  
 possit: at non mordeat. In cuius viua sectione,

Cur in iuue-  
 ne canē tra-  
 ctanda viua  
 sectio.

Quare non  
 in sue tractā-  
 da viua se-  
 ctio.

Canis po-  
 tius quam a-  
 liud animal  
 in viua se-  
 ctione capi  
 debet.

Quomodo  
 cōstitui de-  
 beat canis  
 pro sectio-  
 ne viua.

Quæ confideranda in viua sectione.

priusquam ad eam accedas, illud primo animaduertendum est, in quo vox consistat, quod admirabile est: deinde pulmonis motum contemplaberis: deinde quo pacto pulmo cor amplectatur: deinde cur fiat, ut altera thoracis parte laesa, illa altera perstet. Vnde mediastini utilitas elucet.

Diaphragmatis motus contemplatio. Viue sectionis summa utilitas. Motus arteriarum ex viua anatomie.

Præterea diaphragmatis motum contemplari potest, quod inspirando dilatatur, & expirando constringitur: quod cum sit, sursum agitur, cum vero dilatatur, deorsum fertur. Ad hac pulcherrima visu illud quoque accedit, motus scilicet cordis quemadmodum amplificetur, atque arctetur: item qualis sit motus arteriarum, in viua Anatomie, si lubuerit, conspiciaberis: nunquid idem sit, vel oppositus motui cordis. Comperies. n. dū cor dilatatur, constringi arterias, & rursum in cordis constrictione dilatari. Verū animaduertas, dum cor sursum trahitur, & tumesceri videtur, tunc constringitur. cum vero se exerit, quasi relaxatus deorsum vergit: atque eo tempore dicitur cor

Cordis constriction, & dilatatio qui fiat.

Cordis systole.

quiescere: estque tunc cordis systole, propterea quod facilius suscipit, minoreque labore: at cum transmittit, maiori opus est robore. Neque hoc floccifacias: etenim non paucos reperias, qui eo tempore cor dilatari certo opinantur, quo vere constringitur. Illud insuper adnotare debes, omnem

In detecto corde pulsus differentias dignoscere.

pulsus differentiam detecto corde conspici posse: ita ut ex hac viui canis sectione plus una diecula discas, quā multis mēsisibus ex pulsu arteriarū: ne-

qui



que tantum tribus integris mensibus voluptatis, atq; pulsū cognitionis capies ex lib. Gal. De Puls. quantum una horula ex inspectione cordis mouentis canis. Præterea videre licet, quo pacto cor, non modo ut omnes norunt, dilatatur, atq; constringitur: sed cerebrum quoque, quod paucis notum est. In cordis sectione quum primum pericardium aperis, humorem aqueum in pericardio detentum diligenter inspicere ne asperneris: si canem fœmellam prægnantem secabis, abdomen resecrato, uterog; accurate, quod eius fieri poterit, secto, fœtū inuolutum eximito, & quo pacto x̄o-  
eov membrana utero annexa sit, non oscitanter considerato, & quo pacto vena, arterieque disrumpantur. Idem secundinam in canibus instar fasciæ fœtum circumdare, ut Vesalius pinxit, dū ipsum humanū fœtum pingentē expectabamus, non canis, ut in nostro tractatu De fœtu aptius explicauimus. Allantoide postmodum abrupta lotium diffluit, disrupta amnio, sudorē manentem cernes, situmq; canis in utero pulcherrimum obseruabis. Anterioribus enim pedibus ceu manibus crucem referentibus iacent catelli, ac si omnipotēti Deo supplices pro eorum creatione, atque in lucem exitu preces effunderent. Illud insuper numquam credidisses, quod vidēs obstupesces: morientem matrem catulorum quos Anatomicus ab eius utero abstraxit, maiorem curam gerere, quam suimet. Nam si coram ipsa fi-

Cerebri motus cū cordis motu concidit.

Vteri viuentis canis sectionio.

Allantois membrana lotium continet.

Amnios membrana sudorē continet.

Mira sectæ canis mortuæ in fœtum beneuolentia.

lium ledis, latrat, vociferatur: sin illum ori illius  
 admones, silet, atque magna pietate labit. Quod  
 si aliud, non catellus ori eius, quam secas, matris  
 accedat, rabie percita mordet, quem nature amo-  
 rem, atq; adeo parentum in liberos incredibilem  
 charitatē in publicis theatris maxima spectato-  
 rum admiratione saepius ostendi, Patavij praefer-  
 tim, cum adesset Illustrissimus ac Reverendissimus  
 Rainutius Farnesius, tunc Venetiarū prior, nūc  
 Cardinalis S. Angeli nuncupatus, quem hono-  
 ris, & observantia gratia nomino. Aderat item  
 Bernardus Salviatus Romae prior, nunc Episco-  
 pus\* & Aluisius Ardinghellus Episcopus Fo-  
 rosempronienfis. Aderat Felix Acrabonius,  
 Ioannes Baptista Vrsinus, nunc Archiepiscopus,  
 Eques Ugolinus Fanēs, Bernardinus Thilesius,  
 omnes tunc invenes magnae eruditionis, & expe-  
 ctationis, qui expectationem, quam de se Patavi-  
 na Academia conceperat, longo intervallo supe-  
 rarunt. Hi omnes, item alij multi summa cum  
 voluptate huic viuae canis sectioni interfuerūt,  
 & illud insigne exemplum de ingenti amore vel  
 brutorum in filios se numquam oblituros asseue-  
 rabant: neq; has dumtaxat discendi voluptates,  
 quas hactenus memoravi, ex viua canis sectione  
 percipies, sed cognosces, quam in hoc lōga errave-  
 rit via Peripateticorum princeps Arist. cum au-  
 sus est dicere tres ventres inesse cordi, in quorum  
 dextro sanguis adsit calidissimus, in sinistro frigi-  
 dissimus.

Aristotelis  
 error de cor-  
 dis ventri-  
 culis.

mus, in medio mediocris. Tu vero dextro cordis  
 ventriculo inciso, si digitum immiseris, calor te-  
 pidus tibi occurret: at in sinistro tantus, ut ferre  
 vix possis. Illud insuper, quod sæpe in disquisitio-  
 nē venit, quo pacto vere se habeat experieris, an  
 in arteria venali aer, & vapor ille, quem capino-  
 sum quasi fumidum dicunt, vel sanguis contine-  
 atur. Caue autem putes Anatomicum tot, tanta-  
 que spectatōribus ex vnius vini canis sectione o-  
 stendere posse, sed plures adsint necesse est: nam a-  
 nimam prius efflasset canis, quā hoc vel illud ob-  
 servare potuisses. Postquam igitur canem, ut di-  
 ximus, tabella affixeris, nouacula, cuius acies pul-  
 chre abradat, colli cutem recta aperi, a larynge  
 initio sumpto, & pene ad summum usq; thoracē  
 peruenito: deinde profundiori sectione musculos,  
 qui asperæ arteriæ imminēt, parumper secato:  
 deinde dimisso rasorio cultro, vel digitis potius  
 ab aspera arteria musculos sciūgito, idq; ita dex-  
 tere, ne reuersiuos nervos, qui ibi in cōspectū ven-  
 tūri sunt, villo pacto ledas. Hi reuersiui, seu recur-  
 rentes, seu vocales nervi sursum reuertuntur aspe-  
 re arteriæ adhaerentes, atq; in laryngam immit-  
 tuntur: recurrentem nervum ita facile agnosces,  
 tum quia albicat, tū quia instar fili videtur esse:  
 hunc eleuato. nam si illum digitis compresseris,  
 dictum, ac factum misero cani vox imminuitur:  
 si manum detrahas, ita ut animalibus spiritibus  
 auditus pateat, vox denuo reuertetur: sin dextrū

Improbatur  
 ridicula  
 de capinoso  
 vapore sen-  
 tentia.

Plures ca-  
 nes compa-  
 rentur in vi-  
 ua sectione  
 oportet.

Quomodo  
 thorax ape-  
 riri debeat  
 in viua se-  
 ctione.

Recurrētes  
 nervi quo  
 pacto inue-  
 niantur, &  
 tractentur.



neruum abscindas, prorsus amittitur. Nunc de sinistro reuersuo neruo dicamus. Administra-  
tio eodem modo fiat, quo in dextro dictum est, si  
neruum vinculo excipias & coarctes, statim mu-

Quomodo  
vox aufer-  
tur & minu-  
itur.

tus efficietur: si dissoluas, semilatrabit, ob dexteri  
nerui abscissionem; sin transuersum diffecaueris,  
mutus in aeternum fiet: superuiuere tamen posset,  
si dimitteretur cū tāto vulnere, nisi alia afflictio  
afflicto adderetur. Profecto pulchrum est specta-  
tu, cōsideratuque pulcherrimum, quo pacto duo  
neruuli adeo paruuli tam bellam edant actionē,  
qualis est vocis ipsius efformatio, nemoque est,  
qui non obstupescat. hanc rem non poterat non  
satis mirari doctus, atque insignis philosophus  
Hieronymus Pontanus, & excellentissimus Pon-  
tificius Medicus Paulus Manilius, necnon ex-  
cellens Ioānes Valuerdus Anat. artis admodum  
studiosus, meique amantiſſimus: cum praesertim

Vocem non  
a corde, vt  
Aristoteli  
visum est  
proficisci.  
Aristotelis  
erroris cau-  
sa.

Aristot. scirent sentire vocem a corde proficisci.  
Quod si quis obstinate Arist. sententiam tueri  
velit, inquiens arteriis carotidibus deligatis vo-  
cem amitti, is sciat nisi vnā neruum recurrētem  
vincias, quod saepe vsu venit, id nullo pacto fa-  
ctum iri. Verisimileq; est eos, qui Aristoteli impo-  
suerunt de vocis origine, quod a corde oriebatur  
ea cōiectura, neruum reuersiuum vnā cum car-  
tide arteria vinculis excepiſſe, & hāc praecipue,  
iſſe erroris causam, cū veritas hac sit, neruis quos  
diximus, scētis, vocem omnino tolli, compressis

*non tolli quidem, sed animal semiuocale reddi.*

*Postquam iam mutus canis prostat, septi trāsuer-* Septi trans-  
*si motum tibi licebit contemplari, si abdomine a* uersi motus  
*summo ad imum secto, contractisque tum inte-* cōtemplatio.

*stinis, tum ventriculo, & deorsum detrusis, & si*  
*opus fuerit sectione facta, iuxta costarum inferi-*  
*orum deductum. Deinde pulmonis motum con-* Pulmonis  
*templaberis thorace antè resecato, & ex alte-* motus con-  
*ro latere costarum cartilaginibus cultro excisis:* templatio.

*nam hic non est nouacula locus tutus. Caue autè,* Cautio a  
*dum id ages, ne pulmones, aut cor vsquam offen-* pulmone.

*das: nam tanta sanguinis copia exiliret, ut vide-*  
*re amplius, quod cupiebas, nullo pacto posses: ab-*

*scisis, quæ diximus, thoracem manu dilatato, &*  
*binas spōgias frigidiuscula aqua prius madidas,*  
*deinde expressas in illum immittito: tu alteram,*

*alteram vero minister, qui tibi opitulatur, car-*  
*tilaginibusq, quas abscidisti, admoneto, ut san-*

*guinem a venis, arteriis intercostalibus manan-*  
*tem, neque cunctantem desinant, & remoretur,*

*comprimant ve: itaq, compressas tamdiu detine-*  
*to, ut pulmonum motum spectare, ac speculari*

*possis: quo facto pericardium aperi, & aquam in*

*viuente adhuc animante intueberis: licet nō de-*  
*sint qui affirmare audeant in cadaueribus dum-*

*taxat animalium aquam in pericardio cōtineri.*  
*Si post tot infelicitatis canis cruciatus, vel felicitatis po-*

*rius, qui ob rerum pulcherrimarum agnitionem*  
*spectaculū de se præbuit, superuixerit, omnes vel*

Aqueus hu-  
 mor in pe-  
 ricardio, &  
 viuientis, &  
 mortui inef-  
 se.

plurimas saltem pulsuum differentias obseruare poteris: cor illius conspiciaturus, qui an catellus sit, vel plurium mensum, tunc nihil interest. Nam iam vocis originem in alio cane tuis oculis intuitus fueras, & latrantem primo magno eiulatu, deinde voce imminuta, postremo amissa ob eam, quam diximus, causam considera ueras. Thorace igitur huius secundi canis primum aperto per re-ctam lineam in cartilaginē: sed illum confestim aperi, atque vnā pericardion: deinde abdomine quoq; aperto magnæ arteriæ manum admoeto: diligenterque, quoad eius fieri poterit, considera, an illa dilatetur, dum constringitur cor: vel opposito modo se res habeat, ibique differentias omnes pulsuum sub oculos intueberis in rem presentem deductus magnos, longos, latos, veloces, latos sceleres, frequentes, paruos: neque hos modo, sed veloces quidem tardos ve, aut frequentes, sed interpolatos, item frequentissimos, minimos, tardissimos, undosos, & formiculares. Aliud præterea spectaculum incūdum, quod ad cognitionem attinet, de se præbere miser canis poterit. Nam si arteriam asperam inter anulum, & anulum secueris, & arundinem immiseris, si eam ori ad-moueris, & buccis infles, pulmones illico attol-luntur, & cor ipsum amplexabuntur, & paulo post pulsus immutabitur se ipso maior factus, quo viso sat scio obstupefces. Quod si tertium ca-

Pulsus con-  
templatio.

Quomodo  
cor a pul-  
monib. am-  
plectatur, &  
ex pulmo-  
nib. pulsus  
augeatur.



nem viuum secare in animum induxeris: thoracem eo quo diximus pacto aperire poteris, motūq; pulmonum denuo diligentius considerare: deinde dextro cordis vētriculo adaperto in illum digitum immittito, ut certior fias, numquid sanguis ille calidissimus existat, statimq; sinistro cordis ventriculo secto, animadvertere tuo periculo poteris, tātum caloris ibi adesse, ut manus illum ferre nullo pacto possit, tātum abest, ut iuxta Aristotelis sententiam frigidissimus existat. Rursum in quarto alio cane arteriam venalem reserabis, sed procul a corde, ut certo discas sanguisne, an aer in illa contineatur. Quod si es indefessus lector optime, & sciēdi cupiditate flagras: quintus adhuc adsit in prōptu canis, ut rem admirabilem, neque omnibus obuiam contempleris: thoracem cultro, ut diximus, ocius aperi, corque apprehēdito: minister vero tuus diligens atque expertus, mira celeritate acu crassa, & cōtorta, quam manibus gerebat, in qua cōtortum filum immissum est, quatuor cordis vasa arctē colliget: deinde cor abscindat, eodemq; tempore vincula abscindantur, quibus crura quatuor iuncta erant, & in pedes proiciatur. Canem absque corde vociferari audies, progredi videbis: quare nihil magis admirabile conspiciari poteris; & hac re visa definas adeo obstinate in omnia Aristotelis verba iurare, qui licet magnus Philosophus fuerit: scire tamē omnia solus nullo pacto potuit. In sex-

Vtriusque ventriculi cordis sanguinis experientia adversus Aristotelis sententiam.

Probationum sanguinis, an aer in arteria venali contineatur,

Quomodo abscindi possit cor a cane & adhuc illi vitæ parumper supersit,

Mirum nō esse Aristotelem cuncta non novisse.

*to prater ea cane aliud, ne pigeat, cernito: cranio  
nāq; excoriato eius partē frangere celerrime po-  
teris, membranisque duris incisis cerebri motum  
contemplari. Quod cerebrum ita mouetur, ut i-  
psū cor moueri omnes fatentur, motu scilicet  
dilatationis, & constrictionis. neque aliter fieri  
poterat ob animalium spirituum generationem,  
quam cerebro acceptam ferunt omnes pene tum  
Philosophi, tum Medici.*

Cerebrimo  
tus contem-  
platio.

REALDI COLUMBI  
CREMONENSIS  
DE RE ANATOMICA,  
Liber XV.

DE IIS QVÆ RARO IN ANA-  
TOME REPERIUNTVR.

Medici su-  
perioris æ-  
tatis quales.



Satius est i-  
gnorare quā  
scire perpe-  
ram.

PROFECTO miseret me vicem  
superioris ætatis Medicorum,  
qui in frivolis, & dialecticis qua-  
stionibus die noctuque tempus  
conterentes, de his rebus, absque  
quarum exquisita cognitione ne noscere qui-  
dem morbos ipsos ullo pacto possumus, nihil doce-  
bant, discebant ve, vel adeo confuse, & distin-

cte, &

ete, & infide, ut ignorare satius fuisset, quā perpe-  
rā scire. Et de materia medicinali nūc nihil dicā,  
quam omnē ad pharmacopolas reiiciebant: Ana-  
tomica rei vel prorsus ignari erant, vel quod ton-  
soribus quoq; notissimum erat, id tantū sciebant.

Itaq; cū Anatomicā dissectionem publice profite-  
bantur, sitū querebant intestinorū, ventriculi,  
iecoris, lienis, vesicae, renū, cordis, pulmonisq; de  
inde caluaria disrupta, cerebrū ibi contineri vi-  
debant, reliqua oscitantē sane, & suis cū Arabi-

buscacutientes. quod si quicquam illis occurrebat  
præter hæc, aut quod cū Mundini, aut Auicennæ

scriptis nō cōueniret, id omne tanquam mōstrum

naturæ in illius indiuidui fabrica ostentabant,

adeo ut cōplura mōstrosa in singulis cadaueribus

esse existimarent. Ego vero licet ab ineunte ætate

innumera corpora dissecuerim, & ab hinc quin-

decim annos, & amplius cōplura cadauera Pata-

uij, Pisij, Romæ, in corona frequētis Academia,

tamē hæc dūtaxat rara visu, & a cæteris discre-

pātia obseruare potui, quæ reticere nullo pacto pos-

sum, ut hoc exemplo obseruare alia quoq; possint

posthac diligentiores Anatomici. Prius vero quā

de rebus raris historiam exordiar, hoc unū te ex-

cellens Iacobe Bone admonitum volo, nullū genus

hominū mihi dissecandū defuisse, nisi mutum ho-

minē ab ortu, quamuis quandoq; anno uno qua-

tuordecim cadauera mihi dissecare contigerit.

Hinc igitur de rebus in Anatome hominis ra-

Cognitiō  
nem simpli-  
med. nō de-  
bent medi-  
ci in phar-  
macopolas  
reiicere.

Anatome  
quomodo  
olim tracta-  
retur.

Ridiculum  
monstrum  
esse quod  
cum Mūdi-  
ni scriptis  
non conue-  
nit.

Anatome  
publice xv.  
annos præ-  
fessus.

Iacobus Bo-  
nus.

Dissecuit o-  
mnē genus  
hominum  
præter mu-  
tū aborti-



In capitis  
turis quid  
rarum vidit.

Galenī &  
Hipp. error.  
In dentibus  
quid rarū.

In maxilla  
inferiore  
quid rarū.  
Caput giga  
tis.  
Maxilla in  
ferior capi  
ti connata.

De vertebra  
prima occi  
pitio adhæ  
rente.  
De vertebra  
rum nume  
rō.

Vertebrae  
colli.  
Vertebrae  
thoracis.  
Vertebrae  
lumborum.

*ris, & animaduertendis a capite incipiā. Capit is  
suturas vario modo se haberi comperi. nā in qui  
busdā nullo pacto erāt cōspicuae, aliis suturare et a  
deerat: huic erāt ossa triangula, illi quadrāgula:  
alii sagittae specie, aliisq; id gen<sup>o</sup> figuris suturae cir  
cūdati. Eā tamē figurā, quā X Grēcā literā imi  
tetur, de qua Hippocrates, & Gal. meminerunt,  
fateor me numquā vidisse, licet Lynceis pene ocu  
lis saepenumero inquisiuerim. Magnā quoq; in dē  
tribus diuersitatem obseruauī, tū quo ad numerū  
dentium, tum quo ad dentium radicū numerū,  
in nonnullis praeterea dentes maxillis adeo nixos  
obseruauī, ut diuelli nullo modo possent, nisi ma  
xilla ossis frustum insigne vnā abstraheretur. De  
maxilla inferiore hoc in Summi Pōt. penu vide  
re est, caput Gigantis [maximum enim est omni  
um capitum quā hactenus viderim] in quo ma  
xilla inferior capiti adeo connata, & coniuncta  
est, ut omni motu prorsus careat, atq; in viuente  
non carere nō potuerit. Primā quinetiam verte  
bram occipitio ita adhaerentem hisce oculis vidi,  
ut moueri neutiquam possēt. Vertebrae num  
merus in quibusdā immutatus cernebatur. Nā  
quod attinet ad vertebrae colli, haec in omnibus pe  
ne septem sunt: ego vero nunc sex, nunc octo cer  
nui: vertebrae thoracis tum undecim, tum tredecim. Vertebrae lumborū in  
terdū sex, interdum quatuor. Os sacrū nonnum  
quam ex quinq; aliās ex sex ossibus cōstare vidi.*

*Costas*

Costas item viginti duas, viginti quinque & viginti sex. Quandoq, duas ex his, tres ve admodū connexas: at in aliis in notatū dignum tumorem excreuisse. Sternum ex duobus ossibus, & ex trib. Sternon. Ileon. Femoris processus. Tibiæ processus. Femur, tibia & mola vnita. Sex digiti in manu. Pollicis extremus articulus bifidus. Ioānis Bertonij sceleton admirabile visu describitur.

& ex quatuor. Os Ileon vnitum sacro esse deprehendi. Femur processus quosdam ad palmi longitudinem, acutosque: itidem in tibia, sed non tam proceros. Vidi femur cum tibia, molaque vniri: femur, tibiā, in incredibilem tumorem excreuisse. Sex in manu digitos: extremus etenim pollicis articulus in duos diuidebatur. Sed quāuis hac, quæ hætenus memorauī, memoranda videātur esse, & admiranda, admirabilius tamen erit, quod mox audies. Excellens medicus I. Bertonius ab Auricula mihi amicissimus, sceleton mihi dedit, quē ego domi ad studiosorum vtilitatē diligēter adseruo, in quo ossa omnia, i. omnes totius corporis articuli a capite ad extremos vsque pedis digitos vniti dicuntur. huic quatuor dentes desunt, bini supra, totidē infra ex illorum regione, qua via cibus, & potus intromittebatur. Romæ in Xenodochio diui Iacobi incurabiliū diu vitā traxit: viuēs autē, quē senem vidit, & inuist saepe Ioannes Auricula, nihil aliud mouebat, quam oculos, linguam, penem, abdomē, thoracem. nam cartilagine quidem costis articulatae erant, sed nondum coaluerāt: reliquæ corporis partes omnis motus expertes relinquebantur. Alios secui, quibus brachia ab ortu deerant: alios quibus de-

Lazarus vi-  
griuorax gu-  
stu carens,

erant crura. Præterea corpus integrum intuitus sum, cui dimidium alterius cohærebat. Auriculas instar brutorum in hominibus, cæcos iam inde ab incunabulis, & similia: sed quod maiore admiratione me affecit, fuit inspectio Lazari vigriuoracis vulgo dicti, quem patricij omnes Veneti, immo Veneti omnes, omnes Ferrarienses de facie nouerant. Hic nullo prorsus gustu, dum viveret, præditus erat, nullam in edendo voluptatem, nihil iniucundum per sentiebat: insipida, amara, dulcia, pingua, salsa, acrida, nō distinguebat: vitrum, saxa, lapides, ligna, viua animalia, carbones, pisces & viucrio extractos adhuc salientes vorabat. Vorabat lutum, lineos, laneosq; pannos, scenum, stipulam, & ut breui omnia cōplectar, quidquid homines, quidquid animātia vorant, quidquid illi edendum, seu deglutiendum potius offerebatur, mercede proposita, dictum, ac factum ingurgitabat. Testis est inter reliquos Martinus Aromatarius Patauj ad Angeli insigne, cui sacculum carbone refertum, & sacculum insuper deuorauit. quo viso persoluit, quod pollicitus fuerat, cōminatus ne ad pharmacopoliū amplius accederet: veritus ne se cum taberna, & vasis esset. Cum igitur hoc naturæ monstrum mihi dissectandum esset Patauj, cæpi huiusce rei diligenter, quoad eius fieri potuit, causam venari, quam me tandem Deo ducte ex particulari illius structura affecutum esse confido.



confido. Nam quarta nervorum coniugatio quæ gustus gratia in aliis hominibus a natura producta est, in hoc Lazaro vitriuorace neque ad palatum, neque ad linguam reptabat, sed ad occipitium reflectebatur. sed de hoc Lazaro satis, superque. In musculis vero equidem varietatem percepi, at non multam. Erant aliqui, quibus in facie musculus abundabat, aliis in thorace, aliis in extrema manu. Vidi & nonnullos, quibus aliqui musculi deficiebant, ut in nonnullis furibus illustribus, in quibus dissectandis oculatissimus fui. observavi in his deesse musculum illum, a quo latus tendo in vola proficiscitur, quo lato tēdine non carebant, sed non a dicto, verum a brachialis ligamento exoriebatur. In cruribus item, pedibusque aliquam diuersitatem inueni, sed hac mea sententia non multifacienda erant. In venis autem miram nactus sum sæpenumero varietatem, in internis inquam, atque externis. Nam in eodem latere duas internas iugulares venas deprehendi, duas, tres, quatuorque, & plures eodem latere, emulgentes binas, item eodem latere seminarias venas: Vreteres quatuor, venas in abdomine, & cruribus varicosas maxima molis. Vidi etiam renem unum dumtaxat, eumque maximum. Animaduerti intestinorum tenuium mutuū ingressū, spatio ampliore, quā sit digiti lōgitudo, præsertim in nonnullis, quos dolor iliacus enecaue- rat. Iecur quādoque mihi se obtulit inspiciendum

Quarta ner-  
uorum con-  
iugatio in  
Lazaro vitri-  
uorace ad  
palatum &  
linguam non  
tendebat.

In musculis  
quam diffe-  
rentiam in-  
uenerit.

In furibus  
illustribus  
quid rarum  
obseruaue-  
rit.

Crura.  
Pedes.

Venæ.

Vreteres.

Renes.

Iecur.

Lienes.  
Cartilago  
circa lienē.

Antonius  
Mirandula  
nus.  
Iustinianus  
Finettus.  
Franciscus  
Sanfonius.  
Omentum.

Pulmo.

Omne vul-  
nus thora-  
cis penetrās  
extra spira-  
re, falsū est.  
In pulmo-  
nibus stea-  
tomata &  
atheroma-  
ta.  
In Frācis-  
Capello os  
in pulmone.  
Paulus iiii.  
pon. max.

peritoneo adnexum: adnexam item vidi perito-  
nao lienem. Adde lienes adeo grandes, ut vigin-  
ti librarum pondus unusquisq; ex his longe exce-  
deret, quos cartilago exterius obuoluebat. Quæ  
res cum ab Antonio Mirandulano, quem nostri  
temporis philosophorum principē appellare me-  
rito possumus, & ab excellentissimo Iustiniano Fi-  
netto, & Francisco Sanfonio diligenter spectaretur,  
non poterant satis mirari nouitatem tanta  
in olis primū, deinde illius partis extrinsecæ car-  
tilagineæ. Conspicatus sum omentum peritoneo,  
nec non abdominis musculis adnexum. Præterea  
omenti selibrā extra umbilicum, & in scroto  
omēti libram, & amplius. Pulmonē in pluribus  
pleuræ connexum: nunc in altero latere: nunc in  
utroque, atq; hæc pulmonū in nōnullis cum pleu-  
ra connexio in causā plerumq; est, ut Medici de-  
cipiātur, penetrantia thoracis vulnera nequaquā  
agnoscētes, quippe qui hoc Chirurgorum axioma  
putent, omne thoracis vulnus penetrans extra  
spirare: at in illis, quibus hæc pulmonum conne-  
xio cum membrana succingente contingit, pos-  
sunt vulnere, thoracem perforante, laborare, ne-  
que tamen respirare vulnus cernitur. Quid?  
quod tum in pulmonibus, in iecore ipso scato-  
matā comperi, nec non adæquatā. Vidi & in  
pulmonibus ossa non parua, ut superiore anno in  
Francisco Capello, quem Paulus II II. Ponti-  
fex Maximus, e Verona Romam accersuit, ut

Sancti

Sancti spiritus hospitalis commendator, seu præceptor esset. cuius sectioni tu Iacobe Bone interfuisti. In thorace magnam aquæ copiam vidi. Vidi in corde ulcera, & tumores duros præter naturam, præsertim in sinistro cordis ventriculo. Vidi in nonnullis septum, quo cordis ventriculi distinguuntur, cartilagineum: alios, in quibus sinister ventriculus cordis deesse videbatur, tam exigua molis erat: Discipulum item in Romana Academia mortuum secui (aderat excellens Medicus Alexander Traianus Petronius a ciuitate Castellana, acris iudicij vir) huic misero iuueni pericardium deerat, itaque subinde in syncopen incidebat, subinde mortuo similis conspiciebatur, quo genere morbi exanimatus est. Inueni quoque partem thoracis pulmonem destitui, hoc est, minimam pulmonis portionem adesse: quod vero reliquum erat cavitatis, ab aqueo humore occupabatur. Diffecui non semel, qui ob fortem Apoplexiam obierant, in quorum cerebro magnam aquæ copiam reperi: perspicuam quidem, sed glutinosam. Monstrum mihi oblatum est Patauij dissecandum, erat infans semestris ætatis, ut alij mares sunt, cui alius imperfectus infantulus anteriore parte incumbebat, cruribus, brachiis, dorso, abdominis parte, pene, medioque collo. Videbatur autem caput huius imperfecti puelli in thoracem perfectioris intrusum. Hoc monstrum vixit aliquamdiu. Quamobrem inter studiosos viros lis orta, & questio, utrum cor vnicum illi a-

Iacobus Bonus.  
Thorax.  
Cor.  
Septum cordis.  
Ventriculus sinister.

Alexander Traianus Petronius.  
Rarus admodum casus.  
Pericardium.  
In thorace pulmonis portio minima.

Sectio apoplectici.

Monstrum Patauij dissectum matris semestris cui alius infanteriore in parte incubebat.



Marcus An-  
tonius la-  
nuæ.

Quid in  
monstri fe-  
ctione inue-  
nit.

Membrana  
Hymen.

desset vel duplex, idē de iecore, cerebroq, qua sitū  
est, & de aliis internis mēbris. Marcus Antonius  
Iama illustris philosophus, unicā in illo subiecto  
animā esse opinabatur. Nam si quis imperfectam  
illam appēdicem, & pōdus inutile attigisset, ille,  
quem integrum membrorū omniū diximus, sta-  
tim persentiscere animaduertebatur. Non dee-  
rant tamen, quibus oppositū videretur. Hoc ita-  
que monstrū ubi diem suam obiit, ego rei nouita-  
te allectus libenter secui. quæ autē obseruauī, hæc  
ferme sunt. In imperfecto, quē dixi, nōnulla inte-  
stina aderāt, ex quorum vnius portione tū vesi-  
ca, tū anus cōstruebantur. nullū ibi aderat iecur,  
neque cor, neq, cerebrū, sed ren permagnus, quem  
ego hepatis pene munero fungi sum opinatus. nā  
ab extremo iecore perfecti infantis crassa vena,  
duraque instar arteriæ deducebatur ad renem il-  
lum insignem: atque inde vena alia complures  
passim distribuebātur. at ab arteria dextra axil-  
lari perfecti puelli arteria ortum ducebat, quæ  
postmodū per vniuersam partem mōstri imper-  
fectioris deducebatur. Item a nervis dextri bra-  
chij exhibant, qui per reliquum corpus imperfecti  
homunculi diffeminabantur. atque hætenus de  
mōstro Patauino. Nūc de mēbrana hymene quid  
obseruauerim, dicam tibi: licet vulgus hominum  
putet nullā esse virginē, quæ hymena nō habeat.  
Ter dūt axat illam inueni, bis in duabus parui-  
lis puellis, semel in natu maiore, quā cū diffecarē,

inter-

intererat excellentissimus Antonius Fracanzanus Vicentinus, & Paulus Crassus Patauinus, & una cum his Ioan. Caius Anglus. Est hymen membrana quadam sub nymphis ante cervicem uteri unico foramine praedita superiore parte, ut menses effluere possent: atq; haec illa est eadem membrana, quae ingressum penis quamvis membrosi hominis prohibet.

Lapides aut innumerabiles pene hisce manib. extraxi, inuentos in renibus, colore vario, in pulmonibus, in iecore, in vena porta, ut tu tuis oculis vidisti Iacobe Bone in Venerabili Egnatio Generali congregationis Iesu. Vidi etiam lapillos in vreteris, in vesica, in intestino colo, in venis haemorrhoidalibus, atq; in umbilico. In bilis quoq; vesicula, quod tamen exciderat, varij coloris, variaeque figurae lapillos, & in nonnullis coplures inueni: vidi abscessum. De abscessibus aut quid attinet dicere? Inter reliquos saepe simillima materia refertissimum abscessum in omento, & peritoneo cuiusdam mulieris extraxi: quae ob harum partium abscessum in hydropem inciderat: & mirum mihi visum fuit, cum eiusdem iecur, & lien, neq; in colore, neq; in substantia praeter naturam affecta esse viderentur, in illius tamen abdomine aquae incredibilem copiam adfuisse. Hanc hydropicam, dum ego Romae diffecarem: intererat excellens Cosmus Iacomellus nunc Romae Archiatros. Innotuit mihi ex Anatome abscessus cor undique circum-

Antonius Fracanzanus.

Paulus Crassus.

Ioannes Caius.

Caius.

Quid sit hymen.

Lapides in renibus.

Lapides in pulmonib.

Lapides in iecore.

Egnatius

Generalis

congregatio nis Iesu habebat lapides in vena

portae.

Lapides in vreteris,

Vesica.

Umbilico,

Venis haemorrhoid.

Vesica bilis,

De abscessibus.

Hydropic

cui iecur, & lien in colore

& subst. non erat praeter

naturam.

Cosmus Iacomellus,

Abscessus in corde.

Marcus Appogius.  
Iecur scirrhum.  
Lien scirrhusa cartilagine obducta.

Stephanus Cerasius.

In cardinali Gambara tumor oui magnitudine in sinistro ventriculo cordis.  
In Cardinali Cibo cur ventriculus & intestina sanguine refertissima.  
Antonius Musa Brasauolus.  
In Cardinali Campegio intestina ad hypochondria redacta.

plectens & cor illius iam ferme putrescens. quam rem excellēs Medicus Marcus Appogius ab Oximomagna admiratione intuebatur. Præterea iecur, quod toties scirrhum deprehēdi, lienē quoque nō modo scirrhus laborantem, sed extra cartilagine obductum, quod summa cum voluptate vidit excellentissimus Stephanus Cerasius. Multa alia minoris momenti, rara tamen obseruauī, quæ, ne tractatus hic nimis excreſcat, missa faciā. Non possum tamen abstinere, quin tibi explicē breui quoad eius fieri potest, quid in tribus Cardinalibus Romæ, quid Patavi in Hermaphrodito deprehēderim, quam historiā postquā absoluerō, finem faciam. In Cardinali Gambara Brixiano tumorem prædurum, & ad oui magnitudinem in sinistro cordis vetriculo Romæ vidi, ubi illū in affiniū gratiā diffecarē. In Cardinali Cibo vena, quæ a liene ad os vetriculi tendit, insignis erat magnitudinis: quæ quū primū ob anastomosis, vel fracturam reserata est, illico vetriculus sanguine repletus fuit, & nō modo ventriculus, sed intestina omnia: licet, dum adhuc viueret, in morbo ipso libras aliquot tum per vomitum reieciſſet, tū per secessum deieciſſet. Quam sectionem dum ego summa diligētia peragerem ob subiecti dignitatē, & ob morbi raritatē, aderat excellentissimus Antonius Musa Brasauolus Ferrariēsis, quem honoris gratia nomino. In cardinali Campegio intestina omnia ad hypochondria redacta erant.



erant. propterea cavitās inferior abdominis intestinis destituta erat, & spina detecta. Quamobrem Medico licebat abdomen Cardinalis attrectanti magna arteria motum persentire, & unā cum illa durities persentiebatur. Illa vero durities nihil aliud erat, quam vertebrarū corpora. cuius rei novitatem nō poterat satis mirari excelsus Augustinus Riccus Lucensis. Sed profecto mihi Bone, vel Optime potius Iacobe, inter tot admirabilia, & rara, quæ in humani corporis fabrica diuersis tēporibus obseruauī, nihil admirabilius, nihil rarius censeo, quā quod de neutra natura diligenter inuestigauī. Proposito enim mihi androgyno, seu hermaphrodito, subiecto, inquā eodem mare, & fœmina. superioribus etenim annis fœminam mihi videre contigit, quæ præter vuluā, membro quoque virili prædita erat, quod tamen non erat admodū crassum. Quamobrem in eius Anatomie generationis vasa accurate admodum peruestigauī: vasa seminaria, testesq; cōsiderans, nūquid vlla inter hæc cōmunio, & consensus adisset: tandē hoc cōperi, vasa quidē preparātia, ab aliarū fœminarū preparantibus vasis nō differre: sed deferentia differre. nam bipartita erant, & ex binis quaternaria natura genuerat, ex quibus duo, quæ etiam maiora erant, ad matricis conuū destinabantur, reliqua duo ad penis radicē, cui glandularū parastatum expers erat. Hoc tā admirabile visu, & speculatu erat quam quod

Augustinus  
Riccus.

Fœmina androgyna  
fœta quid rarum.

maximè: quo pacto natura prudens sagaxq; locū  
 satis tutū selegerat, per quod vasa hæc ad penem  
 deferri possent: & quemadmodū meatum, qui in  
 ipso est pene, perforarent: qui meatus in aliis tum  
 semini, tum lotio cōmunis existit, hic vero vrina  
 nihil quicquam opis afferebat. nam instar aliarū  
 mulierum vrina exibat. Vterus autem, necnō v-  
 teri cervix a cæterarum fæminarum matrice,  
 colloq; nihil distabat: sed in testibus discrimen e-  
 rat. nam testes in hac crassiores erāt, quam in re-  
 liquis mulieribus: sed quoad situm ipsorum, nul-  
 lum discrimen deprehendi. Peni scrotum conti-  
 guum non erat, immo vero scroto prorsus care-  
 bat, & duobus musculis præditus erat huius fæ-  
 minæ penis nō quatuor, vt in maribus perfectis.  
 Præterea penis huius hermaphroditi tenui pelle  
 integebatur, nullū aderat præputium sed duo spō-  
 giosa corpora, per quæ duæ arteriæ ferebantur, ab  
 illis ortæ, quæ ad vesicam tendebant. Atque hæc  
 sint satis de hermaphrodito, quem mortuū secui.  
 Duos deinde Hermaphroditos viuentes conside-  
 rari, in quibus alter mas, fæmina altera erat (di-  
 cuntur autem a superabundanti vel mares, vel  
 fæmina, vt vel plantandis hominibus, vel homi-  
 ni suscipiendo sunt aptiores, vel aptiores credun-  
 tur.) Fæmina erat Aethiopica mulier earū, quas  
 Cingaras appellant Longobardi, hæc neque age-  
 re, neque pati commode poterat. nam uterque  
 sexus imperfectus illi cōtigerat suo magno malo:  
 penis

Herma-  
 phroditus  
 quomodo  
 dicatur mas  
 aut femina.  
 Cingaræ her-  
 maphrodi-  
 ta viuentis  
 quid rarū.


penis namque minimi digiti lōgitudinem, craf-  
 stitiemque non excedeabat: vulua autem foramen  
 adeo angustum erat, vt minimi digiti apicē vix  
 intromitteret, optabat misera, vt hunc illi penē  
 ferro euellerem, quippe qui sibi impedimento esse  
 diceret, dum cum viro coire exoptabat; optabat  
 etiam, vt vulua foramē illi amplificarem, vt vi-  
 ro ferendo idonea esset. Ego vero, qui horum va-  
 forum discrimen intueri sēpius cupiebam, verbis  
 detinui. Non. n. sum ausus aggredi illius cupidi-  
 tati satisfacere, quoniam id absque vitā discrimi-  
 ne fieri non posse existimabam. Hermaphroditus  
 vir, quem vinum summa diligentia inspexi, hoc  
 modo habebat. penis aderat cum scroto, testibus-  
 que, sub quibus in peritoneo seu tauro, quo loco (in-  
 ter anum scilicet, & testes) fit scētio pro extra-  
 bendo vesicæ lapide: foramen quidem perstabat  
 in vulua morem, sed non penetrabat. atq; hi sunt  
 quos vidi, Hermaphroditi. Sed priusquam finem  
 huic tractatui imponam: libet recensere, quid  
 monstrosum in muliere animaduverterim. Fæmi  
 na erat, cuius vulua ab aliarum fæminarū vul-  
 uis nihil peculiare, & diuersum habebat: & ma-  
 tricis colli portio prominebat, vel matricis collo  
 simile: matrix autem nulla aderat in abdomine,  
 neque vasa seminaria, neque testes; & quoties cū  
 viro coibat (coibat autem sæpe) mirandū in mo-  
 dum conquerebatur.

Vir herma-  
 phroditus  
 quomodo  
 haberet.

Vulua rara

FINIS.





IOHAN. POSTHIVS,  
GERMERSHEMII AVLÆ PAL.

elect. medicus, Petro Fischero Bibliopo-  
læ Francofurdenſi S.



NATOMICOS REALDI  
COLUMBI libros Fischere  
ornatiff. meo ſuaſu te prælo  
commiſſiſſe, & fere ad umbili-  
cum iã denuo perduxiffiſſe ſcribis: meaſque  
eiufdẽ farinae OBSERVATIONES vltério-  
res, vt vnà cū illis imprimãtur, tibi prope-  
diẽ transmitti poſtulas. Quãuis autẽ me cū  
occupationes aliæ, tum vero temporis an-  
guſtia ſatis excuſare poſſent. tamẽ vt fidem  
meam aliqua ex parte apud te liberẽ (*om-  
ne enim promiſſum cadere in debitum Iuriſcon-  
ſulti affirmant.*) pauca ex ſchedis meis feſti-  
nanter excerpta, de inſtino Recto, ad il-  
las meas priores ad te iam mitto: plura ali-  
quando, ſi diuturniorem vitę uſuram mihi  
Deus cõceſſerit, illis forſan additurus. Va-  
le, Heidelbergæ Kal. Auguſti, Anno Do-  
mini, 1593.

IN REALDI COLVM-  
BI CREMONENSIS ANATO-  
miam IOANNIS POSTHII, Germerf-  
hemij, Med. D. OBSERVA-  
TIONES ANATO-  
MICÆ.

**T**ὁ γὰρ διὰ σεαυτὸν: non solum ad  
animum; sed etiam ad corpus  
referri commodè potest, ac  
debet. Se enim ipsum nō nos-  
se videtur, qui corporis sui fa-  
bricam non habet perspectam. Ista autem  
cognitio non tantum lectione, & auditu  
comparatur: sed etiam αὐτοψίαν & tracta-  
tionem in primis requirit. Quapropter D.  
Rondelerius p.m. Academię Monspeli-  
ensis Cancellarius, meus olim præceptor fi-  
delissimus, sæpe admonere solebat audito-  
res suos, ne libris Anatomicis crederent:  
sed librum ab ipsa Natura scriptum crebro  
inspicerēt: ita enim & exactius singula pos-  
se cognosci, & subinde quædam observari,  
quæ prius non fuissent animaduersa.

In Anatomica administratione cōside-  
randaveniunt; 1, Nomen. 2, Substantia. 3,  
Quātitas. 4, Figura. 5, Situs. 6, Vsus, seu fi-  
nis. 7, Qui morbi singulis partibus acci-  
dere soleant.

A ventre inferiore anatomiam incipimus. 1, vt excrementa citius remoueantur. 2, Naturæ ordinem in hoc sequimur; quia primum more plantarum viuimus.

Cutem crasso modo nominare possumus omne id, quod in corpore humano inuenitur vsq; ad musculos. Illud autem ab Anatomicis in quatuor diuiditur partes; quarum prima est Epidermis. 2, Cutis vera. 3, Adeps. 4, Panniculus carnosus.

I. Epidermis Latinis cuticula vocatur. Hinc curare cuticulā dicuntur, qui frictionibus, balneis, & vnguentis frequenter vtuntur, quibus cuticula nitescit: & nitidus pro homine vrbanus, delicato, & ocioso sumitur, cui opponitur rusticus, vt apud Horat. in Epistolis; -- *e nitido fit rusticus*. Item, *Me pinguem & nitidum bene curata cute vises*  
*Cum ridere voles, Epicuri de grege porcum.*

Item,

*In cute curanda plus a quo operata iuuentus.*

Hæc autem non est pars nostri corporis, quia non est ex prima conformatione in vtero. Nam infantes in lucem nuper editi toti rubent: & si eorum cuti lumē, aut ferrū cādens admoueas, tum cutem totā attolli videbis. In adultis autem sola Epidermis in bullas, seu vesicas eleuatur, & a vera cute separatur, quod & vesicatoria medicamen-



IOAN. POSTHII OBSERVAT. 499  
menta adhibita probant. Vfus huius est, vt  
verā cutē ab iniuriis externis tueatur: & est  
velut emunctorium totius corporis. Quia  
cutis vera multis scatet humorib. qui alio-  
quī assidue resudarēt, ac destillarēt, quē ad-  
modū fieri videmus Epidermide detracta.

Ex huius cōstipatione non pauci proue-  
niūt mōrbi. Interdū ēt Epidermis tota de-  
cidit sine vllo dolore, vt in morbo Gallico.

Hac a vetularum facie detracta, nouam  
renasci, ac faciē fieri luculentiorē, &  
ipse met ex fide dignis audiui, & Tibullus  
lib. i. Elegia 8. testatur, vbi inquit;

*Tollere tunc cura est albos a stirpe capillos;  
Et faciem, dempta pelle, referre nouam.*

Huic respondere videtur in caneris cru-  
sta, quā deponunt, & in serpentibus pellis.

Hanc sequitur cutis vera, quā ligamēto-  
sam esse D. Rondeletius affirmabat; quod  
esset robustissima. D. Iubert<sup>o</sup> vero eandē ex  
crassiori seminis parte generari existima-  
bat: poros autē fieri ab excrementis frequen-  
ter eā transeuntib. Habet hæc omnis gēne-  
ris fibras, vt ad extensionē sit paratior, quē-  
admodū videmus in hominib. ventricosis,  
& admodum crassis. Adeps Cuti veræ sub-  
est in homine: in brutis vero est sub panni-  
culo carnosō, quē lanij discindere solēt, vt  
adipē emptoribus reddant conspicuū. hoc  
ideo a natura factū videtur, vt cōtra frigus

brutamelius essent munita. Panniculus enim carnosus adipi circumtensus impedit, quo minus frigus ad interiora penetret. Homini vero hanc veluti vestē pelliceam induit inuersam, quum manus ei dederit, quibus vestimenta alia ad placitum sibi conficere, & ab aeris iniuria sese possit tueri, quod brutis est negatum.

Panniculus carnosus a veteribus dictus, membranosus est potius in plerisque locis in adultioribus. In infantibus autē & brutis vere carnosus existit: vnde colligitur, veteres Anatomicos in infantium, & brutorū dissectione versatos fuisse potius, quam in adultis hominibus dissecandis, quorū cadauera cōburebantur. Infantium autem facilius dabatur copia. Idem patet ex ossiū descriptione a veteribus tradita, quę infantium magis, quā adultiorū ossibus respōdet.

#### PERITONÆVM.

Hoc comparatur sacco, in quo oliuæ, vel amygdalæ exprimuntur. Hoc enim sacco compresso, fæces alui excernuntur. Tenue est, ne sit oneri, & ne multum spaciij occupet. Densum vero vt calorem retineat. Exterius asperum, vt musculis ea parte facilius adhærere possit.

IOAN. POSTHII OBSERVAT. 501  
EPIPLOON.

Nihil aliud est, quam peritonæum duplicatum, venis, Arteriis, Neruis, & pinguedine multa refertum. Id naturaliter ultra umbilicum raro descendit. Figuram habet marsupij, seu hami piscatorii. Vfus est, 1. vt vasorum sit sustentaculum. 2. vt Intestina tueatur. 3. vt concoctionem adiuuet. Subiectum est Scirrhus propter frequentes glandulas. Interdum etiam flatibus, interdum aqua repletur.

INTESTINA.

Hæc fatuo Regi comparare solebat D. Rondeletius. Nam vt hic non nisi grauiter irritatus iniuriam propulsat: sic intestina non expellunt excrementa, nisi vel quantitate, vel qualitate insigni ipsis sint molesta.

Est autem vnus intestinorum veluti tubus, superiori parte gracilis, & angustus, inferiori latus, & crassus. Inferiora facta sunt latiora, tum vt fæces iam sicciore facilius permearent, tum vt maiorem fæcum copiam capere, & diutius retinere possent. Restum videtur reliquorum esse veluti basis, Itaq; ab hoc numerare incipiebat D. Laur. Tubertus, p. m. qui & ipse, in Monte Pessulano meus olim fuit præceptor, & hospes iu-



cundissimus. Quum apud eundem tū habitarent Ianantionius Saracenus, & Iohannes Pidoxius, & Franciscus de Sancto Vertuniano, conuictores mei, & condiscipuli suauissimi, quos & honoris, & amicitiae causa hic nominare volui.

Rectum intestinum aliquando foetui in vtero (res mira) prorsus occludi contingit, cuius ego proximis superiorib. annis duo vidi exēpla. Alterū apud generosum & Illustrē D. Ioachimū Comitem Ortenburgicū, in arce Ortenburgica, qui in Musæo suo suspēsum habebat hoc intestinū instar vesicæ inflatū, Nepotis nimirum sui ex Antonio filio, Comite virtutibus & doctrina præstantiss. Huius miraculi causam cū ex me quæreret Generosus D. Comes, equidem diu multumq; meditando inuenire, quæ mihi satis faceret, nullam potui.

Tandem in eam veni sententiam, vt illud ex Comitissæ prægnantis summa animi consternatione occasionem habuisse omnino existimarem, cui etiam rationi D. Comes facile assentiebatur. Quum enim illa vna cum marito suo Viēnā versus nauī prægnans veheretur, contigit vt Generosus D. acutissimo morbo subito correptus intra paucas horas in cariss. coniugis amplexu exspiraret. Vixerat autem infans

IOAN. POSTHII OBSERVAT. 503  
ille misellus (masculus enim fuerat) dies  
plus, min<sup>9</sup> octo, vt intellexi, & v̄etris excre-  
menta subinde per os reiecerat, nesciētib.  
cum aliis, tum ipsis etiam medicis, quānā  
esset huius symptomatis causa. Intus enim  
intestinū illud coaluerat, exteriori forami-  
ne libero satis & naturaliter se habēte. Fru-  
stra etiam clysteres & suppositoriola fuere  
adhibita. Nam ne flatib. quidem erat per-  
uium, tantum abest vt inde aliquid egredi,  
aut quicquam in illud iniici potuerit.

Alterum exemplum vidi Heidelbergæ  
in præcipui cuiusdam viri filiolo, cuius iam  
mortui corpusculum rogatus aperui, & in-  
testinum rectum eodem plane modo, vt  
prius illud, affectum reperi. Cōtigerat au-  
tem vt huius mater prægnans descenden-  
do per scalas caderet, & clunibus nudis per  
aliquot gradus delaberetur, ex quo casu &  
magno animi terrore illam Intestini recti  
*εὐμυστιν* fuisse ortam, mihi persuadeo. Idē  
etiam inflatum & parte superiori colliga-  
tum asseruari iussimus. Puerulus iste ultra  
5. vel 6. dies, puto, non fuit superstes.

In talibus autem cura aliqua tentari for-  
tassis posset, nimirū si per fistulam argen-  
teā podici impositam stylus ferreus ignitus  
immitteretur ad impedimentū illud per-  
forandū, &c. Hoc obiter adiciere volui vt  
vltcrius cogitandi occasionē aliis præberē.

Colon est veluti receptaculum pituitæ; in eo colici dolores generantur. Refrigeratur etiam hoc intestinum & ab aere per podicem ingressio, & dum quis lapidi insidet. Hoc igitur vitare meminerint, qui colicis doloribus sunt obnoxij. In eodem calculi ex pituita vitrea interdum generantur.

Cæcum intestinum est veluti secundus venter, in quo chylus immoratur. Hoc a natura factum videtur, ne excrementa regurgitare possent, præsertim in pueris (in quibus etiam maius est quam in adultioribus) qui dum in utero gestantur, pedes sepe sursum versos habent, & in lucem editi terram proni perreptant. Excrementorum autem regressum quoque impedit valvula huic intestino apposita, quam pauci hactenus animaduenerunt Anatomi. Itaque Ionas Charisius, Danus, Medicinæ Patavij nunc operam navans, de eadem observata, & sibi ostensa, tamquam de re rara ad Mollerum meum inde scripsit. Nos tamen Mompelije eandem iam olim observauimus. Et notatu dignum est, quod in gracilibus intestinis, dum pueri in utero continentur, nihil aut parum excrementi soleat colligi: sed quod a crassioribus illa tantum excipiantur; quæ ut expellantur ante, quam pueri recēs nati lacte, vel alio cibo alantur, omnino procurandum est.

Nam



Nam alioqui tormina, febriculæ, & alia grauiora mala pueros infestare consueverunt.

Intestina dissecta fidibus conuenienter consuuntur, intestina videlicet intestinis.

### M E S E N T E R I V M.

Hoc crassum oportebat esse, & glandulosum, non propterea ne venæ mesaraicæ rumperentur: sed potius, ne comprimerentur ab intestinis, & actio earum impediretur. Venæ autem mesaraicæ nullas habent valvulas, quemadmodum Columbus fingit, ut neque vreteres, qui inter tunicam & tunicam vesicæ inseruntur. Nam si venæ mesaraicæ valvulas haberent, sibi ipsis viam præcluderent, & sic impediretur attractio alimenti.

### E P A T.

Carne Epatis dissoluta, & abstracta, eleganter videri possunt vasa per Epatis corpus dispersa, quæ sanguini generando sunt destinata. Facillime autem dissoluitur recens natis. Venæ portæ radices per cauam Iecoris partem disseminari, eiusdemque ramos in intestina inseri Columbus affirmat: quod verum esse concesserim, si illarum originem spectes: si vero nutritionis ordinem, inuertendum est potius. Nimirum ut radices dicantur mesaraicæ venæ, & ramuli in

Epate constituentur. Nam vt plantarum radices e terra, sic mesaraicæ venæ ex intestinis, & ventriculo alimentum attrahunt.

Vesicula fellis amara bile delectatur, quemadmodum capræ foliis, & corticibus vescuntur amaris. Falsum igitur esse videtur, nullum animal nutriri amaris.

## L I E N.

Habet formam linguæ, & videtur esse quasi alterum lecur, a Natura factus, vt crassiores sanguinis partem elaboraret, propterea laxius est ipsius corpus, & arteriis multis, ac magnis refertum. Homini lienem, si cum aliis conferatur, satis magnum Natura dedit eò, vt sanguis defæcator fieret, quod non parum ad sapientiam conferre creditur. Duplicem Lienem vidimus in cadauere quodam virili, quod publice sequebatur in Monte-Pessulano, Anno Domini 1565. Erat autem alter alteri impositus.

## R E N E S.

Natura collocauit renes inæqualiter. 1, vt tam superiores, quam inferiores corporis partes purgarentur. 2, Ne alter alterius actionem impediret. 3, Quia venæ, & arteriæ emulgentes e directo positæ, foraminibus suis vasa illa, quibus inseruntur, absumerent ita, vt ruptioni facilius essent obnoxia.

noxia. In quibusdam tamē, sed admodum raro, emulgentes e directo positæ inveniuntur, quemadmodum Mompelij aliquādo vidimus.

In renibus processus mammillares primus observavit D. Rondeletius, in cadavere D. Fontanoni, Collegæ sui, qui ut se mortuum aperiret, & Cerebrum, & Iecur, & Renes diligenter inspiceret, Rondeletium vivus serio rogaverat. Processus isti mammillares spectaculum præbent valde iucundum, quod nuper etiam ostendi Ioan. Mollero, Medicinæ candidato, convictori meo suavissimo, qui mirum hoc Naturæ opificium magna cum voluptate sua quam diutissime est contemplatus. Hosce inuestigaturus, sectionem renis in caua parte facias oportet. Nam si contrario modo seces, non facile tibi apparebunt. Sanguinem in arteriis contentum non esse purissimum, vel ex eo colligi potest, quod emulgentes arteriæ satis magnæ ex aorta in renes vtrique porriguntur: Id a Natura factum non fuisset, nisi sanguis arteriarum aliqua etiam eguisset purgatione.

Femorariæ venæ circa diuisionem ipsarum insignes habent valvulas ad sanguinem retardandum, ne impetu suo deorsum fluat vniuersus.



## TESTES.

In substantia testium nihil omnino feminis vñquam reperitur. Vnde constat, ad feminis generationem testes parum conferre: sed in eum præcipue vñum esse factos, vt quemadmodum renes ab arteriis & venis: ita illi a vasis spermaticis serofum excrementum suscipiunt, eaque sustinent, ac tuerentur.

## MENTVLA.

Huius substantia cum vteri substantia magnam habet similitudinem. In parte interna habet quosdã veluti circulos, quemadmodum in trachea arteria videre licet: eorum beneficio & contrahi, & extēdi potest. Quibusdam animalibus ossea est; quia nō satis habēt spiritus ad eius inflationem. Breuior hæc fieri putatur, cum recens natis puerulis nimium retrahitur vmbilicus. Sic enim vna cum vracho, vesica, & per consequens etiam penis retrahitur. Longior fit iis, qui caligis non vtuntur, vt monachi. Huius musculos tantum quatuor enumerat Columbus: sed re vera sex inveniuntur, vt Paulus Constantinus Phrygio, meus olim in Monte Pessulano condiscipulus, in re anatomica egregie versatus, nunc Aulæ Wirtenbergenſis Medicus clariss. recte annotauit.

Partes

Partes genitales nimiū refrigeratæ, gan-  
grænā sepe contrahunt, & veluti mortuæ  
decidunt. Quare per hiemem iter facturi  
partes illas diligenter munire debent, ne a  
frigore lædantur.

Rectum intestinum in excretionē ster-  
coris ad partem exteriorē nonnihil protru-  
ditur, postea a musculis duobus retrahitur.  
Id a natura factū est, ne nates inter excer-  
nendum omnino commaculentur.

#### V T E R V S.

Hic cucurbitæ in fundo latioris, in cer-  
uice angustioris, figuram refert. In huius  
capacitate nonnulla apparent foramina,  
quæ venarum, arteriarumq; capita sunt, Ac-  
cetabula dicta, quasi Acceptabula: quia se-  
men infusum accipiunt, ac retinent.

Os vteri interius durum, & angustū est:  
mollius tamen in virginibus, & Venerem  
non expertis. In vetulis omnino callosum.

Collum vteri ita longum est, vt verisimi-  
le sit, semen nō statim in vterum iniici pos-  
se: sed ori ipsius interno affusum paulatim  
intro assumi. Id D. Rondeletius in anima-  
lib. post coitum dissectis se vidisse affirma-  
bat. Quum foetus in dextro latere conti-  
netur, intestina in sinistrum latus trūduntur,  
& e contra. Vnde mulieres parum exerci-  
tatæ duos se gestare foetus existimant.

Menstruum sanguinem feminis fluere per vasa in vteri collum definentia, Columbus asserit. Atqui non tantum per hæc, sed & per ea, quæ in ipsius vteri corpus inferuntur vasa, menses promanare certum est, præsertim in virginibus, & mulieribus, quæ non sunt gravidæ. Gravidis autem, quæ multo abundant sanguine, ex vteri ceruice sanguis tantum profunditur (primis nimirum tribus, aut quatuor mensibus, dum fœtus ad sui nutritionem pauco indiget sanguine.) Nam os vteri interius illis exactissime clauditur: & Acetabulis vteri placenta (quæ alii Iecur vteri vocant) ita adhæret, ut ab iis nihil sanguinis emanare possit. Quod si vero ab internis vasis tum profluat sanguis, abortire mulierem contingit, quod & Hippoc. noster in Aphorismis affirmat, & experientia verum esse probat.

## THORAX.

Diaphragmatis usus est; 1. ut nutritionis instrumenta ab instrumentis spiritus distinguat. 2. ut respirationi inseruiat. 3. ut fecum, & urinam, & fœtus expulsionem adiuuet.

Hic Galenus reprehenditur, qui viros ideo mammas non habere affirmat, quod vtero ea reant. Rectius autem id ascribitur ætioni caloris, & materiæ paucitati.

Mu-



Mulieres enim sanguinis copia longe superant viros. Quare tantum rudimenta mammarum in viris apparent, & vasa papillaria defunt.

Mammillarum substantia porosa tota existit, & in his ductus quidam ad papillas porriguntur, similes quodammodo iis, qui in Epate conspiciuntur. Meatus per quos lac e papilla profluit ubi inuestigare voles, a papilla tibi erit incipiendum.

Intercostalia spacia numerantur vndecim, & in quolibet inveniuntur duo tantum musculi, non quatuor in verarum costarum interstitiis, ut Vesalius, & Columbus asserunt. In cartilaginosis vero partibus tantum vnicus existit musculus, ad coniungendas costas potius, quam ad eas dilatandas comparatus.

Pleura proprie latus significat: sed hinc improprie dicitur membrana illa tenuis, & neruea totum thoracem interna parte vestiens.

Suppuratos incidimus, vel vrinus inter quinta m, & sextam costam, non procul a transuersis vertebrarum processibus. eo enim in loco facilius colligitur materia. Vtatio autem fieri debet ferro ad cultri formam facto, excepta cuspide: itaque instituenda est, ut exteriorum intercostalium musculorum

fibræ transuersim incidātur, & interiorum fibræ maneant illæ sæ. Facilius enim curatur vulnus externū, quam internum. Huc pertinet Aphorismus 37, libri sexti. *Quicumque suppurati*, &c. Hoc olim Lugduni fieri vidimus. Inde pus per Syringā extrahendum est. Nam propter crassitiem sponte sua non efflueret. Sub costis secundum longitudinem parui carnales existunt, qui venas, arterias, & neruos recipiunt, quæ vasa ne lēdantur, dum suppuratos incidimus, vel vrimus, cauendum est.

In Pericardio cōtinetur aqua, quam ex resolutione spirituum in morientibus gigni quidam falso existimant. Nam & in viuentibus, & bene valentib. aqua illa inuenitur. Similiter etiam reperitur in tunicis testes circumdantibus, & in cerebri membranis. In Hydropicis autem prædictis in locis longe maior aquæ copia continetur.

In Ranis fissuræ duæ vtrimque ad collū apparent, auriculis in corde omnino similes: harum vsus est, ne dum cor mouetur, vasa huic inserta nimio sanguine oppleta disrumpantur; præsertim vena caua, & arteria venosa, quarum tunicæ sunt tenues. Nam dum cor cōstringitur, sanguis in auriculas illas recipitur.

Valuulæ ad venam cauam, & arteriam

venosam appositæ intro spectant, ne quide corde in hæc vasa regredi possit. Valvulæ vero ad venam arteriosam, & aortam appositæ contrario modo se habent nihilque ex hisce vasis in cordis cavitatē relabi sinunt.

Vena coronalis e vena caua oritur ante, quam ea cor attingit. Hæc vena coronalis multas venas per cordis substantiam spargit, easq; exterius in circuitu conspicuas. Demittuntur autem venæ illæ e superiori cordis parte recta deorsum, & nō instar circuli cor circumeunt, vt vulgus existimat.

## CAPV T.

Caput a capiēdo videtur dictum, quod omnes sensus capiat. Estque instar camini in domo. Paruum caput semper vituperatur; magnum vero non semper est bonum. Caput vtrinque leuiter est depressum, tum propter ventriculos cerebri, tū propter aures, ne longius ad latera, quod indecorum fuisset, porrigerentur.

Pili sunt excremēta viscida, alioqui enim non possent in longum extendi. Hi per omnem vitam in homine crescunt. Finduntur autem in extremitate, & partes illę fissæ decidunt. Inde factum est, vt quidam existimarint, pilis certum crescēdi tempus esse destinatum. In quibusdam locis nascuntur ex dispositiōe loci humida, vt subalis,



& circa inguina: in quibusdam prouidentia creatoris, vt supercilia.

Caluities neq; in posteriore capitis parte, neq; in eius lateribus fieri solet propter musculos. In Alopecia autem & morbo Gallico pili magis defluunt in musculosis partibus, quia hæ partes plus vitiosi humoris continent. Tempora canescunt citius, quia sunt humidiora.

Furfures in capite magis proueniunt, quã aliis in locis, quia nascuntur ex recrementis serosis, quæ multa colliguntur sub cute densiore, quæ plurimum est perforata. Aristot. cutē capitis sentire negat: sed dolor, & pruritus contrarium docet. Accipit enim neruos a prima, & secunda vertebris.

Sub cute est panniculus carnosus, qui imbibito sanguine (vt in uulnerib. fit) crassissimus apparet.

Hydrops capitis intra pericranium & panniculum carnosum generatur.

Cum dolores capitis in morbo Gallico sunt vagi, tum proueniunt a flatibus: cum vero sunt fixi, tum signum est eo in loco fieri Talpariam, id est, abscessum ossis.

In facie tria præcipue sunt cōsideranda. 1. Hominum diuersitas. 2. Pulchritudo. 3. Animi affectus. Non raro tamen simulatur vultus. Hinc illa: *Fronti nulla fides*: Item, *No-*

*lite secundum faciem indicare: & Gallicū proverb. On ne cognoit pas les gens au visage. Item apud Poetam, Spem vultu simulat, premit altum corde dolorem.*

Musculi, qui labra ad os, & intra dentes attrahunt, quatuor inveniuntur: duo nimirum in inferiori, & totidem in superiori parte interna. Hi a Columbo nō describuntur.

Labra, præter cætera, serviunt etiam ad bibendum, & ad sputum reiiciendum, nec non ad odores gratos penitius attrahēdos: quod apparet etiam in equis equarum vrinam olfacientibus. Hi enim superius labrū versus nares attollunt, ut odorē illum, qui ipsis gratus est, omnino haurire, & penitius attrahere possint.

Linguam exerentes musculi e medio mento proficiscuntur, & in linguæ radicem desinunt. Hi exterius sub mento inveniuntur.

In interna parte alarū nasi duos aliquando inuenimus musculos, qui tamen non in omnibus, sed tantū in corpore admodum musculofo, & nasuto reperiuntur. Hac igitur in parte Vesalium temere reprehendit Columbus; quasi ex sola imaginatione hosce musculos descripserit.

Nasus factus est; i. Ornamenti gratia,

quod eius absentia declarat. 2, vt cerebrum per hanc viam excrementa sua deponeret; vnde per iocum dicitur, *Cerebri cloacam esse nasum. 3*, Vt odoribus aditum præberet. 4, vt foramina in palatum definentia (per que aerem ore clauso attrahimus, & reddimus) instar operculi tegeret. 5, Vt mucum a cerebro defluentem aliquandiu detineret. Nam in septo nasi parte superiori duo officula visuntur satis inæqualia & aspera, in eum finem a natura fabrefacta, vt mucus illis adhæreret, alioqui assidue destillaturus. Hæc officula lue Gallica laborantibus eroduntur.

Quartus maxillæ inferioris musculus non a stiloide processu (vt & Vesalius, & Columbus asserunt) sed a mammillari processu originem ducit. Idem Musculus media sui parte, qua tendinosus est, ossi Hyoidi adhæreret, quod alij non annotarunt.

Oculi sunt velut Episcopi, & custodes in summa arce collocati, & quibusdam quasi collibus circumdati, ne facile læderentur: præterea etiam pinguedine multa contra frigus sunt muniti.

Oculus musculos proprios habet sex, quatuor quadræguli in modum positi sunt, quintus oblique incedit, & trochleā in maiori oculi cantho parte superiori annexam habet.



habet. Sextus itē oblique fertur, & oritur ab osse sub maiori cantho : atq; his duobus musculis in orbem mouetur oculus. Si trochleam vna cū sexto recte inuestigare voles, os a superiori parte abscindas oportet, vt oculus in sua sede maneat. Ita enim predictos musculos facilius inuenies. Columbus trochleam inter musculos palpebram mouētes non recte ponit, lib. 5. cap. 8. Tertij musculi sunt tereti figura, &c.

Tres nobiles in capite sunt membranæ: duæ videlicet meninges, & pericraniū : ab hoc perioſtion : ab illis maxima pars reliquarum membranarum proficiscitur. Cavitates cerebri factæ sunt; 1, propter spiritū. 2, propter plexum coroidem. 3. Vt humiditatem excrementitiā exciperent.

Processus mammillares naribus imminentes non sunt olfactus instrumenta, sed tantum opercula, ne aer in cerebrum cumulatim irruat. Rete mirabile (de quo veteres multa scripserunt) infra sellam turcicam sub dura matre occultatur. Ex altera parte calami scriptorij spectatur caput bubulum, cui ego nomen imposui.

## ADHVC DE MUSCULIS

### QVÆDAM.

Consideratione dignum est, quod nulla pars corporis se ipsam moueat: sed motum

suum debeat musculis parti proximæ insertis. Ita etiam in communi hominum vita alter alterius ope semper indiget.

Musculi quātum fieri potest, omnes ita secandi sunt, vt & origo, & insertio eorum relinquatur integra. Hoc enim modo ipsorum vsus cōmodissime potest demonstrari. Carnis vsus est, tum vt villorum capacitates impleat, roboret, ac firmet: tū etiam vt partes ab iniuriis externis defendat.

Quartus humeri musculus inferius ita adheret quarto respirationis musculo, vt eum separare sit impossibile: licet alii scribant hunc musculum vsq; ad dimidium ossis sacri descendere.

Tertius scapulæ musculus quintuplex est. Oritur enim a 1, 2, 3, 4, & 5. transversis processibus vertebrarum colli.

Quarti musculi manus interioris quatuor tendines perforati non in secundum digitorum articulum desinunt, vt Columbus scribit; sed supra eundem articulum in secundum os digitorum inseruntur.

Quatuor musculi in vola manus e tendinibus digitos mouentibus enascuntur, quos vermiculares appellant Anatomici: mittuntq; tendines suos in tertium digitorum articulum, & digitos (quod mirū est, cum in vola manus oriātur) extendere dicuntur.

Solos

Solos vngues per omnem vitam crescere Galenus libro 1. de Vsu Part. affirmat: sed in eo fallitur. Nam & dentibus hoc datum est.

Vulgo dicitur, summum excitari dolorem, quum quid inter carnem & vngues intercedit. Atqui tēdines immediate subsunt vnguibus, & non caro. Ideoq; sub vnguibus tam exquisitus sensus delitescit.

Musculos femur mouētes decem enumerat Colūbus: sed a recentioribus etiam vndecimus est inuētus. Is oritur ab infima appendice ossis coxendicis, & inseritur ad maiorem trochanterem parte inferiori.

Vndecimus iste musculus sub carneo Marsupio fere occultatur inferiora versus, & multa pinguedine tegitur, vt mirum non sit, illum ab Anatomicis sero esse animaduersum.

FINIS.



# INDEX IN REALDI COLUMBI CR. LIB. XV. DE

ANATOMICA ADMINISTRA-

*tione satis copiosus.*

**A** Bdomen quid 258. 434  
Abdominis muscoli

2. 8

Acetabula quæ 457 Aceta-  
buli descriptio 151

Acutus processus 60

Adeps 468

Æger cur interdum, resti-  
tuta coxendicis luxatio-  
ne, claudicet 190

Ægilopes ubi fiunt 54. 74  
neglectæ transeunt in fi-  
stulas 54

Affusio orbicularis instar  
placentæ 456

*αἰμαίνουσα* 489

Anger quid 86

*Ανδρογυνή* processus 124

Alexandriæ multi anato-  
mici 102

Allantois quid significet  
457

Alterans omne alterandum  
in sui colorē alterat 304

Alveoli dentium 26. 60  
quando in senibus ob-  
seruentur 60

Ambulatio legitimus mo-  
tus hominis 85

*Αμύμος* vel *ἀμύμος* 457

*Ανατομία* venarum & ar-  
teriarum 436

Anatomæ ordo 2. Anato-  
mæ ossium a capite cur  
incipienda 27. Anato-  
micorum doctrina erro-

nea de arteria venali 326

Anatomicorum error de  
vfu foraminis pubis 133

Anatomicorum error in  
musculis palpebrarum

224. Anatomicorum er-  
ror in intercostaliū mu-  
sculorum vfu 254

Anchoræ imagine proces-  
sus 11. Anchyroidis pro-  
cessus 123. Ancyroidis  
processus qui 12

Androgynā quid rari 493

in Angina præsciendenda  
mēbrana contegens tra-  
cheæ anulos 185. 186

Ani muscoli 166

Animalia, quæ in corde os-  
aluntur Animalia quæ-  
dam cito famelcunt 423

*Αντιφύσιον* 272

Antrum lphenoidis 45

Anulorū tracheæ figura 185

*Απόφυσις*, id est, processus  
quid 11

Appendices in sectione nō  
laudanda 205. Appen-  
dices dentium 67. Appen-  
dices in senib. 33. Appen-  
dices cur non arteriautur  
assiduo motu articulorū  
9. Appendices scapula-  
rum 125. Appendices nō  
sunt duriores ossibus 8.  
Appendicum vfu 8. Ap-  
pendicū vfu verus a ne-  
mine

# I N D E X.

- mine adhuc expressus 9  
 Appendix humeri 129  
 Appendix in grandiori-  
 bus vix. in iunioribus fa-  
 cilis deprehenditur 7  
 Appendix a processu dif-  
 fertur Appendix ossium  
 quid 7  
 Aquâ quid obstetrices vo-  
 cent in partu 458 Aquæ  
 humoris situs 403  
 Arabum error de venæ sal-  
 uatellæ sectione in lienis  
 affectibus 307 Arabum  
 error in cornea 401  
 Aranea membra. 402 Ara-  
 nea inuoluit humores  
 crystallinum & vitreum  
 404  
 Aratri simile os 58  
*Αεχχοειδης* membr. 402  
 Ardinghellus dimidiâ fron-  
 tem mouet 220  
*Αεθρὸν* quid 20  
 Arthrodia quid 16. 22 in  
 Arthrodia differt motus  
 à motu per magis & mi-  
 nus 22 Arthrodia ubi  
 manifestior 22 Arthro-  
 dia exemplum sub syn-  
 arthrosi 22  
 Arist. error in humeri cum  
 cubito coniunctione 131  
 Arist. error de cordis vē-  
 triculis 476 Arist. error  
 de diaphragmate 256 A-  
 rist. decipitur in tale 166  
 Arist. ponit humerū pro  
 cubito 114  
 Aues existimat carere fe-  
 more 154 Aristoteles na-  
 turæ filius 112 in nume-  
 ro costarum errat 112  
 Arist. mulierum futuram  
 circularem posuit 36 A-  
 rist. locus 3 de nat. anim.  
 7. de continuitate ossium  
 refutatur 15 Arist. cor in  
 medio pectoris ponit 119.  
 120 Aristot. de occipite  
 dogma 40 Arist. de bre-  
 gmate 38 Arist. de canū  
 caluaria abiq; futuris 32  
 Aristot. lyssarcosis 27  
 Arteria aorta 326. 327 Ar-  
 teriæ aortes maior trun-  
 cus 340 Arteria corona-  
 lis 324 Arteriæ dentium  
 radices ingredientes 334  
 Arteriæ emulgentes 341  
 Arteriæ emulgentes 428  
 Arteriæ magnæ diuisio  
 ad curam 344 Arteriæ or-  
 tus in sinibus neruorum  
 94 Arteriæ penem eri-  
 gentes 343 Arteria pul-  
 monem nulla tendit 340  
 Arteria tangentibus me-  
 dicis brachium se offe-  
 tens 332 Arteria, quo si-  
 nu costarum suscipiatur  
 118 Arteria venalis 326  
 Arteria venalis sanguine  
 plena 413  
 Articuli nomine quid intel-  
 ligat Hippocrates 20  
 Articuli appendicib. ca-  
 rentes ligamenti vinciu-  
 untur 10 Articulatio  
 occipitis cū primis dua-  
 bus vertebrais colli quo-  
 modo fiat 90 Articulo-

# INDEX.

rum ossa cartilagine in-  
 crustantur 191 Artic-  
 ulorū tabula cur post do-  
 ctroam de processibus  
 14.15 Articulus quid 20  
 Αρτicularος os 83 Atytano-  
 idis constitutio 239  
 aspera Arteria quæ 410 ve-  
 nalis Arteria 410 Aspe-  
 ra arteria tendit in pul-  
 mones 96 Aspera arte-  
 riæ progressus 186  
 ασπεράτος 166  
 ασπεράτος 166  
 Auditus instrumenti ossa  
 non prorsus solida 6 Au-  
 ditus ossicula in anat. vt  
 inueniantur 49.50 Au-  
 ditus ossicula 47.48  
 Aues vbi femur habent 154  
 Aues sceletum conficiūt  
 202 Auiū iecur in duas  
 tantum partes secari 299  
 Aures cur non ossæ 182  
 cur cartilagineæ 182 cur  
 earum cutis pertinax 182  
 Auriculæ cordis 326  
 Auris arteriæ 336 Au-  
 riū cartilagineum 181 Au-  
 rium musculi 228  
 Authoribus legendis iudi-  
 cium adhuc bendum 104  
 Axi innituntur quæ circum-  
 aguntur 90 Axillares  
 venæ 306  
 αξίλας vena 305  
 B  
 Basilare os 45  
 Basilica vena 308  
 Basis ossium 148 Basis in  
 scapulis 123

Βελουδής 43  
 Bilis quid 427 Bilis vtrius-  
 que generatio 303  
 Brachiale 128 Brachiale  
 quid 137 Brachiale os  
 perforatum esse 6 iuxta  
 Brachiale cartilago 190  
 Brachialis ligamentum  
 197 Brachialis ossa quot  
 137 Brachialis ossa con-  
 nata cur credant nonnulli  
 137 carent nomine pro-  
 prio 138 Brachialis ossa  
 non solida 141 Brachij  
 articulus abiq; scapulis  
 123 Brachium vnde aga-  
 tur 245 Brachiū quid 128  
 Bregma quid 38 Bregmatis  
 ossū descriptio 39 Breg-  
 matis vulnera lethalia 39  
 Bubones vbi fiunt 319  
 Buccarum musculi 223  
 C  
 Cadauer ad sceletum confi-  
 ciendum aptum 203  
 Calcaneum os quod 169  
 Calcar pedis 169  
 Caluaria cur futuris distin-  
 ctæ 30 Caluariæ substā-  
 tia cur non aspera 33  
 Caluariæ parietes 34  
 Caluariæ futuræ difficul-  
 ter diuellitur 24  
 Calx tarsi os 166  
 Campus sanctus Romæ 35  
 Cancrorum oculi 28  
 Canini dentes qui 64  
 Canis iuuenis ad secundum  
 aptus 473 Canis mori-  
 turæ in fœtum beneuo-  
 lentia 475  
 Caput



# I N D E X.

Caput qđ significet 33	eius	tilago sub sacro 188
vsus, figura 35	Caput in	Cartilago vtrum sentiat
processibus cur 13	Caput	180 Cartilaginu anatomo-
est pars princeps reliqua-	rum 193	men ligamenta sequun-
rum 193	Caput ne ocu-	tur 2 Cartilaginum fi-
lorum causa factum 28	Caput sine vitæ discrimi-	gura varia in costis 187
ne non luxatur 91	Capitis naturalis figura quæ	Καρδιας arteriæ 333
35.36	Capitis ligamen-	Casæ vt extruantur à rusti-
ta 193	Capitis luxatio le-	cis 1
thalis 194	Capitis motus	Κατὰ τὴν quid vocet Galen.
tres 245	Capitis musculi	124
245.246.247	Capitis ossa	Cauæ venæ ductus 313
qualia 29	in Capitis su-	ua vena eiusq; eminentiæ
turis rarum 484	Capitis	299 Cavitas inter pro-
talalis vena 307	Καρπός quid	cessus eminentes 169
Καρπός quid 137	Carpus Med. chir. 48	Cavitas in talo cur 168
Cartilagines costarum no-	Cartilagines quales 116	καυλός 440
tharum quales 116	Cartilagines cum vinculis &	Causa doloris ingentis in
clauis & ditiſſiorum com-	parantur 2	solutione continui inter
Cartilagines ligamētales 10	Cartilagines	carnem & vnguem aliis
non coquendæ 205	Cartilagines pectoris os-	ignota 291
ſi relinquendæ 204	Cartilagines temporis suc-	Cauterium in crure facien-
cessu abolentur 20	Cartilagines vt excipiendæ	dum 389
205	Cartilaginis descri-	Cautio in temporum chi-
Cartilago circula-	ris augēs acetabulum	rurgia 229
151	Cartilago glutinis	Centrum corporis 322
inſtar 150	Cartilago luna-	Cephalicæ venæ 307
ta 160	Cartilago ſcu-	phalica cum basilica vni-
talalis 81	Cartilag. in ſinu	tur 307
& processu ſecundæ ma-	xillæ inferioris 50	Ceratois 401
Car-		Cerebellum 355

# I N D E X.

Cerebri munimenta	346	nibus diligenter obser-	
Kepais quid	134	uauit ossium vnionem	
Ceruix in ossib. quid vocetur	13	haud sine medio 19	
Ceruix vteri quid		lumb. peculiare habet de	
445 Ceruicis muscoli		larynge	236
247.248 Ceruix ex vertebris.	88	Columella	407
Chorion. id est, secundina		Communis vena quare	308
401 Chorion	350	Conarius locus	337
Chylus quid	302	Concepio quando fiat	453
Ciceronis error de mesenterio	423	Concupiscibilis vis in eo-	300
Cilia visum dirigunt	397	Contradicere ob veritatem	
Circumuolutiones	355	licet	413
Claudus ex luxatione coræ-		Coniugia nervorū quor	94
dicis	199	Cor arteriarum omniū ra-	
Claucula 124 Clauicula		dix 322 Cor nō princeps	
quid, & vnde dicta	126	pars 322 Cor, cerebrum,	
κλειδus quid	126	recur instar triū fontium	
Clypealis cartilago	120	406 Cor facilius lædi-	
Κνημην quid	159	tur, quam cerebrum 346	
Coccyx vnde dicta	108	Cor in medio pectoris v-	
Coccyx in partu patitur		bi 120 Cōspiritus vita-	
459 Coecygis vertebræ		les in pulmone elabora-	
87 Coecygis os in par-		tos perficit 322 Corda	
tu retrahitur	152	ossa habentia in se	121
Cœcum intestinum	421	Cordis pingued. 32 Cor-	
κοιλία quæ	417	dis septum 325 Cordis	
Κοκκυξ	103	tunica alia à pericardio	
Colon intestinum	421	323 Cordis vetriculi 325	
Collatio pedis & manus os-		Coronæ processus qui	12
sium	177	Coronalis vena 305 Co-	
Colli vertebræ 87 Colli		ronalis futura 35 Coro-	
musculi lati	221	nalis vena	301
Columbus cur à Gal. & Ve-		Coronon processus	229
salio in quibusdam desce-		Cornea vnica est	401
ndat 17.18 Columb. vbi		Cornelij Celsi opinio de bo-	
anatomem professus	101	nitare capitis absque su-	
Columb. tertium audi-		turis	31
tus os inuenit 5 Colum.		Corpora aut simplicia, aut	
in cadauerum dissectio-		composita 3 aliagrauio-	
		ra, alia leuiora 3 Corpo-	
		ris	

# I N D E X.

ris animati proprium 15  
 Corpus in vertebra quid  
 92 Corpus animatū cur  
 non ex ossē vno continuo  
 15  
 Coryza laborans cur dolo-  
 rem non sentiat 46  
 Costæ quot 97 Costarum  
 pars interior cur nō aspe-  
 ra 118 Costæ constri-  
 guntur & dilatantur 22  
 Costæ veræ quæ & unde  
 dictæ 112 Costæ nothæ  
 cedunt intestinis tamen-  
 tibus 98 Costæ curl lon-  
 gas cartilagineas habeant  
 116 Costarum numerus  
 proportionē respondet  
 vertebri 111 Costæ ha-  
 bent periostion 415 Co-  
 stæ cartilagineas habent  
 187 Costarum substantia  
 114  
 Κοτύλη siue κερταληδα 13  
 Coxendicis os quid 148  
 Coxendicis cartilago 189  
 Coxendicis descriptio 150  
 Cranium tutamenti gratia  
 factū 15 Craniij ossa non  
 moueri 23 Cranium cur  
 osseum 31 Craniij sectio  
 204 Cranium cerebro  
 inseruit 29  
 Crassa intestina quæ 421  
 Cremasteres dicti 104  
 Cremasteres quid 384  
 Cribrum ab aliis fictum in  
 renibus non dari 314  
 Crocodilus mouet maxil-  
 lam superiorem 51. 219  
 Crurium in sceletō flexio vi-

tanta 212  
 Crusta cartilaginea 159  
 Cubiti articulatio 130 Cu-  
 biti flexio diuersa 131  
 Cubiti musculi 284 Cu-  
 bitus quid significet 132  
 Cubiti ossa cur caua 137  
 Cucullaris musculus 240  
 Cuniiforme os 45  
 Cutanea distributio neruo-  
 rum 382  
 Cuticula 466  
 Cutis 467  
 Cutis sentit 467  
 Κυβοειδής quod 172  
 Cyboides tarsus 166  
 Cymba os quod 171  
 κυρτωειδής vala 431  
 Cystis fellis 42

## D

Δερμός membrana 164  
 δερμὶς quid 439  
 δερτωειδής musculus qui 24  
 Dentes semper crescunt 63  
 Dētes durissimi 64 Dē-  
 tes in matris aluo 66  
 Dentes sentiunt 5 Den-  
 tes perforatos esse 6 Dē-  
 tium alueoli 26 Dentium  
 dolor pulsantis 62 Den-  
 tium numerus variat 63  
 Dētiū ordo triplex 67  
 Dentis pars quæ sentiat  
 62 Dentium radix 64  
 Dentis superficies aspe-  
 ra 94 Dentes sentiunt 61  
 Dens oritur in secunda  
 vertebra 94 Dentes vi-  
 ginti sex 66 Dentes vt  
 pulsent 63 in Dentibus  
 rarum 484



# INDEX.

<i>Diaphragma</i> quid	467	matici vbi secandi ibid.
<i>Diaphragma</i> quid	255	Enarthrosis quid 16. 21 En-
<i>Diaphragma</i>	401	arthrosis non est eadem
Diarthrosis quid 16. 20. e-		sub diarthrosi quæ sub
ius diuisio	ibid.	synarthrosi 21 Enarthro-
Diaſtoles & Syſtoles in ce-		sios sub diarthrosi exem-
rebro 347 Diaſtole in		pla 21 sub synarthrosi
pueri bregmate perspi-		exempla 21 huius mo-
cua	38	tus est obscurissimus 22
<i>Didymus</i> qui	438	Enſiformis cartilago 121
Digitorum manus & pedis		Enumeratio partium liga-
osſicula quot 166 Digi-		menta habentium 250.
torum musculi 297 Di-		<i>Επιερμεις</i>
gitorum ossa concava 5.		466
Digitorum ossa, quatu-		<i>Επιερμειον</i>
ordecim aliis, aliis quin-		258. 434.
decim 144 Digitorum		<i>Επισκωτις</i> quid
summi articuli cur ap-		84
pēdice & cartilagine 177		Epiglottis cur ita dicaſ
Digitorum ossa nō sunt		78
solida 144 Digitorū os-		qd, & cur cartilaginea 185
sa nonnulla perforata 6		<i>Επιγναπν</i> quid Græci no-
Dolores parturientiū 459		minent
Dolores vehementiss. in		164
dentibus cur	66	<i>Επιγυειδα</i> quid vocent
Dorsi diuisio 87 Dorsi mu-		Græci
sculi 249 Dorsi structu-		164
ra 84 Dorſo quid intel-		<i>Επιπλεον</i>
ligatur 85 quot verte-		424
bris constet	85	<i>Εππμεις</i> musculus quid
Duodenum	420	243
Dura mater	348.	error posteriorum Ana-
E		tomicorum
<i>Εκφυσις</i>	420	163
Empiricorum error in la-		<i>Ερυθραιδα</i>
pide e vesica extrahendo		439
166		F
Emulgentes venæ 313. 314.		Facies quid appelleretur 219.
Emunctorium cordis 395		Facies rotunda cur ho-
Emunctorium iecoris 395		mini 58 Faciei musculi
<i>Εμυνημα</i> quid 118. Empe-		219.
		Fames vnde excitetur 301
		Famē alij facilius ferunt
		302
		Fauces
		408
		Femur eiusque explanatio
		154. 155. 156. 157 Femur cū
		quibus articuletur 155
		Femoris luxatio 14 Fe-
		moris musculi
		167
		Fertum in os sacrum im-
		ponen-

# I N D E X.

ponendum 212  
 Fibrae cordis 324  
 Fibula quid 159 Fibula  
 cur in pronum & supinū  
 nō moueatur 163 Fibula  
 ubi dehiscat a tibia 163  
 Filamenta cordis 329  
 Florentiae alūtur leones 115  
 Fœtus distinguuntur mem  
 branis 444 Fœtus non  
 concipitur absque mu  
 tua voluptate 448 Fœ  
 tus ut plures gignantur  
 in corpore 463 Fœtus  
 nutritur bono sanguine  
 457 Fœtus vivit vitam  
 plantæ primo, deinde a  
 nimalis 455  
 Formatio fœtus 454.455  
 Foramen in occipite maxi  
 mum 72 Foramen ano  
 simile 354 Foramē me  
 dia facie 359 Foramen  
 cæcum 71 Foramen pu  
 bis 152 Foraminibus  
 cur ossa donata 6  
 Fracta ossa quomodo vni  
 untur 25  
 Frigimelica Medicus 203  
 Frontis muscoli 219 Fron  
 tis muscoli duo 220  
 Frontis os ubi teguius  
 42 Frontis os 41 eius  
 substantia 42  
 Fuchij error 259  
 Furculæ cur dicantur cla  
 uiculæ 127  
 Furum præmia 288 in Fu  
 ribus rarum 487

## G

Galen. etiam errare potuit

328 Galeni error 230.232  
 Gale. ignoravit ossicula  
 auditus 47 Gal. nō con  
 stat sibi de ossium maxil  
 lę numero.52.53. Gal. be  
 luinos oculos descripsit  
 228 Gal. error de lobis  
 409 Gal. inconueniens  
 de musc. numerorū 242  
 Gal. error in capitis ver  
 sione in gyrum 90  
 Gal. error in ultimis dor  
 si musc. describendis 251  
 Gal. error de capitum di  
 gitorum insertionē 146  
 Gal. opinio de osse inter  
*axillares* & iugula 124  
 Gal. in maxillæ inf. sinu  
 error 60 Gal. aliquot  
 loci 89 Galeni errores  
 quod ad compositiones  
 ossium 18 Gal. error in  
 processibus 132 Gal. er  
 ror in adnascētia humo  
 ri appendicis ibid. Gal.  
 error in osse malæ 55  
 Gal. error de appendice  
 humeri 130 Gal. error in  
 coniunctione radij capi  
 tis cum brachiali 133  
 Galeni ratio de appendi  
 cum vfu 8 Gal. error de  
 ligamentis vertebrarum  
 195 Gal. error de rectis  
 musculis 261 Gal. do  
 ctrina de etymo muscoli  
 reicitur 216 Gal. error  
 de antro sphenoidis 45  
 Gal. laus 147 Gal. Lab  
 doidis additamenta 37  
 Gal. & Hipp. cōtradicere

licet 413 Gal. errauit in  
 capitis moribus 89 Gal.  
 de foraminibus cap. non  
 scripsit 67 Gal. de me-  
 dicamentis in oculos 54  
 Gal. dentium dolore la-  
 borauit 62 Galenus op-  
 pugnatur, pilos sicciore  
 & frigidiore ossibus ef-  
 se statuens 3 Gale. quot  
 ossa capitis numeret 38  
 Gal. oppugnatur negans  
 digitorum ossa concaua  
 5 Gal. soletissimus na-  
 turæ inuestigator appen-  
 dicum vtilitatem nō re-  
 cte descripsit 7 Gal. si-  
 mias secauit 80 Gal. nō  
 recte sinum iuxta meatū  
 auditoriū descripsit 44  
 Gal. os gladiale quid vo-  
 cet 121 Gal. ignorat ca-  
 uitatem in osse frōtis 42  
 Gal. non homines secuit  
 419 Gal. articulationē  
 capitis cum primā & se-  
 cunda vertebra vt refe-  
 rat 41 Galen. defenditur  
 quod ad dūritiē appen-  
 dicum attinet 9 iterum  
 oppugnatur ibid. Gal.  
 frustra laborauit in in-  
 ueniendis emulgentibus  
 313 Galen. male dixit os  
 maxillæ inferioris duo-  
 decimum 59 Gal. quos  
 processus coronæ voca-  
 rit 12 Gale. descripsit os  
 sacrum beluinum 104  
 Gal. errat lib. de vsu par-  
 tium; & errorem agno-

scit lib. de administ. sect.  
 198 Gal. in Alexandriam  
 profectus 202 Gal. os  
 hyoidis nō descripsit 79  
 eius meminit ibid. Gal.  
 sagittalem in omni capi-  
 tis figura seruari ait 35  
 Galenus existimat caput  
 oculorum gratia condi-  
 tum 28 Galenus refuta-  
 tur cū sua dūritie appen-  
 dicum 8 Gal. ossa non  
 sentire 5 Gal. de femo-  
 ris rima 157 Gal. errat in  
 numero ossium pectoris  
 119 in simiis & canibus  
 verificatur 119  
 Gallici morbi signū rauce-  
 do 408  
 Γαστήρ quid 417  
 Ginglymos quid 17.23  
 Ginglymi sub Diarthro-  
 si exempla 23 Gingly-  
 mi sub Synarthrosi ex-  
 pla 23  
 Gladialis cartilago 120. 257  
 Glandula quid 392 Glandu-  
 la pituitam suscipiens  
 45 Glandulæ circa œso-  
 phagum 394 Glandula  
 excipiens humiditatem  
 oculorum 74 Glandulæ  
 cur post aures 394 Glan-  
 dulæ parastatæ 437 Glan-  
 dula pinealis 35 Glan-  
 dula in quibus bubones  
 fiunt 319 Glandulæ sub  
 lingua 393  
 Γλύν per Glenem cōmitti 173  
 Γλυν quid vocetur 83  
 Γλυν



# I N D E X.

- γλωττις quid 362 Glottis  
 quid 237  
 Gomphosis quid 16 Gom-  
 phoseos exemplum 172  
 Grandinosum os quod 26  
 Gluten ad dentes in alueis  
 suis conglutinandos 210  
 γαστροειδής 43  
 H  
 Harmonia ossium quid 16.  
 25 Harmoniæ exempla 25  
 Hæmorrhoidales arteriæ  
 342 Hæmorrhoidales  
 venæ 303  
 Hepar 298  
 Hepatica vena 308  
 Hermaphroditus quis 494  
 Hippocr. & Gal. error 258  
 Hippocr. quid per manū  
 intelligat 128 Hippocr.  
 locus lib. de artic. 85  
 Hippocr. cut vocet se-  
 cundam vertebram den-  
 tem 91 Hippocr. arti-  
 culi nomine arctius vi-  
 tur 20 Hippoc. maior  
 Galeno 174  
 Hispanus pilosus 470  
 Historia iuuenis demortui  
 ob dolorem capitis 30  
 Homo maxillam superio-  
 rem non mouet 51 Ho-  
 minis ossa qualia esse de-  
 buerint propter artes in-  
 finitas 15 in Hominis  
 corde os non inuenitur  
 330 Hominis larynx  
 processu temporis ex of-  
 fe constat 184 Hominis  
 iecur nō diuidi in lobos  
 298 Homines in Persi-  
 de vtrum absq; suturis 31  
 Homines viuos secari nō  
 licet 472  
 Humani corporis diuisio  
 20  
 Humerus quid 128. 129  
 Humerus non est maior  
 tibia 159 Humerus ra-  
 ro luxatur 189 luxatus  
 difficulter restituitur i-  
 bid. Humerorum mus-  
 sculi 242 Humerales  
 venæ 307 Humeralis  
 musculus 243  
 Humor aqueus in pericar-  
 dio 323 Humor aqueus  
 in oculis quid 403 Hu-  
 mor Crystallinus qui,  
 qualis. vbi ibid. Humor  
 υαλοειδής quis 404  
 Humiditas ad nares vnde  
 descendat 74  
 Hyoides os linguæ pecu-  
 liares 77 Hyoides ex  
 quinque processibus 79  
 Hyoidis musculus 231.  
 232  
 Hymen interrara 490  
 Hymen quid 491 Hy-  
 men in virginibus 446  
 I  
 Ianitor 410  
 Iecur 298 Iecur sanguinis  
 fons 300 Iecoris liga-  
 menta 201 Iecoris liga-  
 menta duo 298. Iecur  
 primum in nobis gignit  
 ibid. Iecur prius cord  
 gignitur 455 Iecoris  
 substantia 300 Ieco-  
 raria vena 308

# I N D E X.

<i>ispar</i> os	103	vnde exprimantur	400
Ieiunum intestinum	420	Lachrymæ vnde fluant	
Ileum	421	Ileum os quid	393
vocetur	148	Lachrymam quæ &	
articulatio qualis	10	quot efficiant	81
Ilium ossa pelui similia		Labdoidis additamenta su-	
149		turæ quæ	37
Iliorum ossa	129	Lambdoides siue Labdoi-	
Imperiti Medici puerorum		des futura	34
ossa tenella validius at-		Lapillus qui e renibus ad	
trectant	11	vesicam detrudatur	314
Incisorij dentes qui	63	Larynx quid	235
Incudis ossiculi descriptio		Larynx musculi ibid. La-	
49		rynx ex omnium Anato-	
Indumentum	355	micorum sententia car-	
Infantibus bregma tener-		tilagine constat	184
rima futura, & paula-		Larynx ossæ	80
tim durecit	38	Larynx veluti cartilagineu cor-	
Infundibulum	354	pus	79
Intercostales musculi	253	Latus tendo acutissimi sen-	
Intercostales venæ	306	sus	282
Intestina quid	422	Latrones carent plerumque	
norum continuatio	419	primo interiore muscu-	
Inuolucrum	358	lo manus	288
crum cordis	323	Leonis costæ quales	114
Ipse dixit, Pythagoricis sa-		ossa non solida	115
ris est	104	Lien quid	425
Iris in oculo	400	Lientan-	
Iscij vena	320	tū excrementis alitur	301
Iudæusa pella	443	Ligamēta ex appendicibus	
Iugula cur dicuntur	127	etiam vbi non est articu-	
Iugale os	47	lus	10
Iugulorum		Ligamenta ten-	
descriptio	126	dinum digitorum	198
Iuncturis cur adsit Cartila-		Ligamenta sensu cur care-	
go	172	ant	192
Iuuenis suturis carens	30	Ligamentorum	
L		nutrimenta	193
Ascendens	77	differentia ibid. Ligamen-	
Labiorum musculi	222	tum coxendicis & ossis	
Labra processus	14	sacri	199
Lachrymæ quomodo gi-		Ligamentum	
gnuntur	70	membranosum	201
Lachrymæ		Ligamentū processus den-	
		tis dicti	91
		Ligamentorum commune	200
		Liga-	

# INDEX.

- Ligamentū ambiens rotulam genu 199 Ligamentum femoris cum acetabulo quale 155 Ligamenti etymon 192 Ligamenta iecoris non omnino sensu carent 201 Ligamentum dentis 195 Ligamenta vertebrarum cur valida 196 Ligamenta quæ partes habeant 200 Ligamenta transversa in pede ibid. Ligamenta ad musculorū constitutionem necessarij 10 Ligamenta ubi nō appendices ibid. Ligamenta ex ossium capitibus 27 Ligamentorum doctrina 193. & deinceps. Ligamentales cartilaginee musculis originem præbent 10 desinunt in tendines ibid. *Asperid* ossa 44 Lineæ in mento puerorum 59 Linea in liene 425 Lingua vnde gustum habet 233 Linguae musculi 232 Linguae ligamenta duo 197 Linguae constitutionia 235 Linon 312 Linon quid 350 Liuidus musculus qui 387 Lobi plures in brutis, quam hominibus, & cur 409 Lonigus Medicus chir. 44 Longaon intestinum 422 Lotium vnde exeat in mulieribus 449 Lotiū cur vna cū sanguine deferat 406. 407
- Lumbarū vertebræ 87. 100 Lunata cartilago 160 Luxata vertebra spinalis medella redigitur in acutū angulum 86 Luxatio articuli femoris 155 Luxatio in pede cur repositu difficilis 179 Luxatio malleorū quo inclinet 162 Luxatio manu facta nō curari aut nō, aut difficulter potest ibid. Luxationē causa 10 Luxationē femoris quid difficiliorē reddat 14
- ## M
- Mahumeti arca 197 Malæ os 55 Malleoli duo quæ 162 Malleus os auditus 49 Malleolos quid constituat 162 Malum granatum Arabes quid vocent 188 Mammillaris processus etymologia 43 Mammillæ sanguinem in lac cōmutant 304 Manfredus Med. 194 Mansorius musculus 230 Manum mouentes musculi 286 Manus interna cur adeo sentiat 377 Manus quid Hipp. 128 Manus organum organorum 286. 374 Mares a fœminis differunt in ossē pubis 152 Mares gignit aut fœminas vnde 453



# I N D E X.

Marfupium carneum	171	bus alarum inftar poſitę	
Marris mons	296	165 Membranolum li-	
Maſſereres muſculus	230	gamentum	201
Maſſeteris ortus	70	Memorię locus	353
Maxillę	43	Meninx craſſa, tenuis, dura	
Maxillę cartilagineſ	184	347	
Maxillę oſſa quot	52. 53	Menſes vnde fluant	446
Maxilla ſuperior cur in-		Menſtrua vbi egrediantur	
feriore breuior	52	316 Menſtruus ſanguis	
Maxilla ſuperior	51	quid	461
Maxilla quandoq; indu-		Meſenterion quid proprie	
teſcit lapidis inſtar	26	423	
Mazzolarius Cremonenſis		Meſenſis quid	141
euſque opinio de ſenſu		μητρη	443
dentium	61	Mirach 434 Mirach qui	
Meatus lotio & ſemini cõ-		Arabibus	258
munis	431	Modus in cõnectendis ſce-	
Mediana vena	308	leti oſſibus	215
Mediaſtinum membranę		Molares quot	64
potius quam ligamentũ		Monſtra	485
201		Motus capitis & cervicis	
Medici vt conſciãt ſangu-		communis 89 Motus	
nẽ ferri e pulmone	412	naſi 24 Motus obſcuri	
Medulla ſpinalis quid	367	articulorũ exempla	20
Medulloſa oſſa quid	8	Motus duplex duplicem	
Medulloſus ſuccus con-		articulationis differen-	
tinetur in ſefaminis	178	tiam deſiderat	ibid.
Membra cunãta ſanguine		Motus perſpicui articu-	
nutriuntur 321 Membra-		lorum exempla	ibid.
na dicitur totius	454	Motus poſtbrachialis	
Membrana carnea	468	22. 23 Motus voluntarius	
Membrana cordis inuo-		in Thorace	188
lucrum 323 Membrana		Mucus ad nares vnde de-	
iecur inueſtiens	300	ſcendat	74
Mẽbrana oſſa obducens		Mucus in articulorum	
ſentit 14 Membranę		cartilagine & vnde	191
tricuſpides 329 Mem-		Mucronata cartilago	121.
branę trifulcę	ibid.	188 Mucronata cartila-	
Membranula ex vaſis in		govtrum decidat	ibid.
radicem dentium	66	Mulier in coitu ſemẽ emit-	
Membrana in vteri lateri-		tit 453 Mulieribus carti-	
		tilago	

# INDEX.

tilago multa inter pri-  
 mum & secundum os  
 coccygis 186  
 Mundinus parum Anato-  
 micus 421  
 Musculus quid 215 ex qui-  
 bus sit constructus 215.  
 216 Musculus vnde di-  
 ctus 216 Musculus dor-  
 salis longissimus 119  
 Musculus perforans 283  
 Musculi linguā mouen-  
 tus vnde oriuntur 78  
 Musculus longissimus  
 dorsi 217 Musculi ma-  
 nus externi 291 Muscu-  
 lus minimus 234 Mu-  
 sculus in ore latitans 230  
 Musculus octauus femoris  
 est omniū maximus 158  
 Musculus os aperiens 230  
 Musculi oculorum vnde 69  
 Musculi instrumenta mo-  
 tus voluntarij 218 Mu-  
 sculi radium in prouum  
 vertētes 290 in Muscu-  
 lo omnes adfunt nerui  
 vel vnus vel plures 391

## N

Nares cartilagineae cur 57  
 Nasus musculi 221 Nasus os  
 non prorsus solida 15  
 Nasus ossis motus nec ne 24  
 Nasus extremus cur car-  
 tilagineus 183 Nasus  
 cur non osseus totus ib.  
 Natura in componēdis of-  
 sibus non vnam rationē  
 seruat 15 Natura est  
 voluntas Dei 4 Natu-  
 rales spiritus in hepate

non gigni 360  
 Nauis & ossium compara-  
 tio 2 Nauiformeos 171  
 Nervus quid 357 Nervus in  
 musculorum substantias  
 disseminantur 218 Ner-  
 ui nomine ligamēta ve-  
 teres comprehendebant  
 26 Nervorum septē pa-  
 ria 357 Nervorum pri-  
 ma coniug. oculis defer-  
 uit 68 Nervorum sec-  
 unda coniugatio mouet  
 musculos oculorum 69  
 Nervorum tertia coniug-  
 atio 61. 70 Nervorum  
 quarta coniugat. quor-  
 sum 70 Nervorum sex-  
 ta coniugatio 72 Ner-  
 uorum septima coniuga-  
 tio ibid. Nervorum o-  
 ctava coniugat. 70  
 Nerui thoracis 380  
 Nervus quo sinu costarū  
 suscipiatur 18 Nervus  
 nostri corporis maxi-  
 mus 387 Nerui pul-  
 monis 413 Nerui reuer-  
 si efformant vocem 72  
 Nerui omnes praeter op-  
 ticos deferunt sensum  
 & motum 366 Nerui  
 lumborum 383 Nerui  
 maximi ortus 151 Ner-  
 uo laeso quando non a-  
 mittuntur vel sensus vel  
 motus 380 Nerui opti-  
 ci substantia 398 Nerui  
 ossis sacri & pedis 186  
 Nilus sceletum conficit &  
 perpolit 202

# INDEX

Nympharum situs 446

O

Oculus futura 35

Observatio in omnib. vertebrarum articulationibus 93 Observatio in expoliendo scheleto 204

Obstettrices ligamentū sub lingua pueris cur secent 197

Occipitis descriptio 39

Occiput in adultis vnū, in pueris multiplex os habet 40 Occiput in pueris cur ex plurib. ossibus 90 Occiput in pueris cur bifidum 194.195

Cur in occipite prominentia 39 Occipitis multifidi in pueris utilitas 41 Occipitis os crassissimum 39 Occipitij latera quinque 40

Oculos aperientes musculi 225

Oculi musculi ibid. 226.227

Oculos claudētes musculi 225

Oculus humanus ex quibus cōflet 398

Oculi sedes ex quibus ossibus 56

Oculorum medicamenta per nates effluere 54

Oculi organa visionis 396

cur in loco excelso ibid.

in Oculi fabrica pinguedo quid utilis 399

Oculi canerorum duri 28

Odituū processus 91

Oesophagus desinit in ventriculum 96

Oesophagus quid & eius synony-

ma 416 Oesophagum complectens musculus 237

Omentum 424

Opticus nervus cur dicatur 69

Orbicularis musculus 166.

167

Orbita sedes oculi 56

Ordo anatomæ 2

Oribasius cap. habet de hyoide 79

Orificij inferioris vetriculi situs 417

Ossa quid 2 Ossa quid siue eorum munus 4

Ossa aratri simile 58

Ossa capitis quot 38

Ossa capitis qualia 29

Ossa capitis multiplex cur 32

Ossa in cordibus 121

Ossa cranij non moueri 23

Ossa digitorū quot 144

Ossa digitorum insigniter concaua 5

Ossa frontis 41

Ossa grandinosum 172

Ossa innominatum 81

Ossa laryngis quinq; ibid.

Ossa nasi non moueri 24

Ossa peristitij gratia sentiunt 4

Ossa cur perforata 68

Ossa petrosa 44

Ossis sacri vertebrae 87

Ossa sacrum 103

Ossa sacrum in numero vertebrarum 104

Ossa spongiosa 58

Ossa spongiosa, pumicij; similia 6

Ossa squamosa vbi 25

Ossa squamosa cur



# INDEX.

cur sic dicta 37 Ossae-  
porum 42 Os ventri-  
culi cur 34. *Idem* 364 Os-  
sium anatome cur præ-  
cedat 1 Ossium anatome,  
cartilaginum sectione  
prior 2 Ossa non cõ-  
tigua vt venæ 15 Os nõ  
est in corde hominis 121  
Ossi pars fungosa quæ &  
cur 34 Ossa moueri ap-  
prime necessarium 15  
Ossa cum ædificiis com-  
parantur 1 nauis 2 Os-  
sa capitis foraminibus  
prædita 34 Os primum  
quid peculiare 104 Os-  
sa omni sensu carent 5  
Ossa partes ignobiles 68  
Ossium substantia quid  
3 Ossa cur non sentiant  
4 Ossa quædam appen-  
dice carent 12 Ossium  
cõpositio qualis esse de-  
buit 15 Ossa alia con-  
nata, alia coniuncta 19  
Ossa ne fœteant 209  
Ossa immobilia, graua  
alba, sensus expertia 34  
Ossa a medulla retenta  
denigrantur 207 Ossa  
non sentire euentissi-  
ma ratio 4 Ossa vt can-  
didiora fiant 207 Ossa  
minime medullosa quid  
secundum Vesaliũ 8  
Ossium differẽtia a ma-  
gnitudine, figura, forma  
5 Ossa sentire qui dicũt,  
quæ absurda introducãt  
4 Ossa cur prædita fo-

raminibus 6 Ossa fora-  
minibus extrinsecus re-  
ferta 6 Ossa arteriis nõ  
carent 34 Ossa cur ter-  
rea 3 Ossium partes a-  
liquæ in pueris cartila-  
ginæ videntur 33 Os  
omne cũ alio vnitur aut  
media carne, aut liga-  
mento, aut cartilagine  
19 Ossa fracta vt vnian-  
tur 25  
Ossa quæ cum sacro cõ-  
mittuntur, os sacrum, &  
os scapulæ insigni caui-  
tate carent 5 Ossa funda-  
menta animati corporis  
15 Ossa ex calce aut cine-  
re nigrescunt 2 10 Ossa  
cur sentiunt 61 Ossa vt  
carne denudentur 208  
Ossa tria quæ cum sacro  
coniunguntur immobi-  
lia 148 Ossa non omnia  
appendicem habent 9  
Ossa non semper crescũt  
63 Ossa trabium & fun-  
damentorum rationem  
habent 1 Ossa sine do-  
lore secantur, combu-  
runtur & quouis modo  
tractantur 4 Ossium  
compositio varia 15 Os-  
sa contigua & cõiuncta  
cur 15 Ossium nomen-  
clatura quare non in ex-  
ordio eorum tractatus  
perpendatur 2.3 Ossa  
humani corporis cõposi-  
ta propter articulum &  
symphysem 16 Ossium

# I N D E X.

in disquisitione quæ &  
 quot spectanda 3  
 ὅτι quod 438  
 αὐτοῦ quid 431 ὅτι quid 438  
 αἰσθητικόν quid 294  
 αἰσθητικὴ scapulæ 122  
 P  
 Palpebrarum cartilagines  
 181 Palpebrarum mu-  
 sculi 224  
 πτερύγας glandula, 394 424  
 πτερύγαι 166. 394  
 Παρίσχυμ quid 410  
 Paristhmia ubi sint & quid  
 sint 408 Paristhmia in  
 pharynge posita 393  
 Parotides vnde fiant 394  
 Partus facilis 459  
 Patellæ doctrina cur sepa-  
 rata a doctr. de femore  
 & tibia 163 Patella cur  
 mobilis 164 Patellæ no-  
 minationes 164 Patella  
 ubi similis vmboni 165  
 Pecten quid in pede 175  
 Pectoris medij cartilago,  
 & mollis cur 187  
 Perioftion 415  
 Πεδιον quid 175  
 Pes obscuro motu moue-  
 tur & quomodo 168  
 Pedis extremi musculi  
 176 Pedis ossa quot 165  
 Pedis luxatio cur repofi-  
 tu difficilis interdum 179  
 Pelvis 354 Pelui similia  
 ossa 149  
 Penis quid 440 in Pene ar-  
 teriæ cur 442 Penis mu-  
 sculi 164 Penis descrip-  
 tio ibid. Penis muscu-

li quatuor 442  
 Pericardium iuueni deest  
 489 Pericardiū non tam  
 ligamentū quam mem-  
 brana 201 Περικαρδιον  
 quare sic dictum 121 Pe-  
 ricardiū diastoles & sy-  
 stoles cordis motus 323  
 Pericraniū 348 Περικρανιον  
 a dura membrana 32  
 Περίσσος cur dicatur 4  
 Perioftion 470  
 Περιτόμιον quid 432 Perito-  
 niū potius, membrana  
 quam ligamentum 201  
 Περὶν quid 159  
 Pharynx 408  
 Phrenes 256  
 Φάτνια quid 64  
 Planta quid 175 Plantæ  
 ossa cur non foraminu-  
 lenta 176 Plantæ ossa  
 quot 175 Planta nō de-  
 pilis tendinis causa 282  
 Πληκτρον 43  
 Plexus cotiformes 351  
 πλοῦς quid 432 Pleura  
 quid 414 Pleura potius  
 membrana quam liga-  
 mentum 201 Pleuritis v-  
 bi sæpius fiat 415 Pleura  
 interna sensus exquisitiss-  
 simi ibid. πλοῦς costas  
 succingit 117  
 πλατὺς lacrum 103  
 Pia mater quid 350  
 Pili, & vnde oriantur 469.  
 470 Pilorum in carti-  
 laginib. palpebrarum v-  
 sus 181 Pili excrementa,  
 non autē pars corporis 3  
 Pinealis

# I N D E X:

- Pinealis glandula 339  
 Pinguedo seruanda nec of-  
 fusbus relinquenda 208  
 Pinnæ narium quomodo  
 claudantur 183 Pinnæ  
 solæ in naso cur moueā-  
 tur 183  
 Pollex duos habet articu-  
 los in manu pedeque 176  
 πολύμυρρον os 45 πολύμυρ-  
 ρον cyboides cur dicatur  
 172  
 Poplitris vena 320  
 Portanarius 410  
 Postbrachiale 128 Postbra-  
 chiale quid 141 Postbra-  
 chialis motus proprius  
 22. 23 Postbrachiale  
 quot ossibus constet 141  
 Prægnantibus cur quibus-  
 dam menstrua nō fluant  
 460  
 Præputium 443  
 Processus & appendicis dif-  
 ferentia 11. 12 Processus  
 seu ἀπένδυσις quid 11 Pro-  
 cessus bifurcati 95  
 Processus capite depres-  
 so qui 13 capite rotun-  
 do ibid. oblongi & pro-  
 minentes ibid. Proces-  
 sus circulares 13 Proces-  
 suum differentiæ 12 Pro-  
 cessus femoris 156 Pro-  
 cessus laterales 93 Pro-  
 cessus mamillares 43  
 Processus numero diffe-  
 runt 14 Processus infe-  
 rioris maxillæ 59 Pro-  
 cessus vertebrarum tho-  
 racis qualis 97 Processus  
 in vertebra quid 92 Pro-  
 cessuum vsus triplex 14  
 Processus vteri binus  
 447  
 Prominentia in occipite  
 cur 39  
 Psittacus maxillam vtram-  
 que mouet 51. 219  
 ψιταρδεῖς processus 46  
 ψιτῆρῃ quid 169  
 Pubis os quid 148 Pubis  
 ossa in partu nō aperiun-  
 tur 190 Pubis ossa non  
 dilatantur 153 Pubis ossa  
 non dehiscunt in partu  
 152 Pubis foramen 152  
 Pubis ligamentorum v-  
 tilitas 201 inter Pubis  
 ossa cartilago 190 Pubis  
 ossa quando distinguant  
 mas a fœminis 152  
 Puer cui os lapidosum fra-  
 ctum 44  
 Pulmo 409 Pulmonum ſ-  
 tus & vsus 110 Pulmonū  
 substantia 410 Pulmo  
 parū sentit 413 Pulmo-  
 num vasa 410  
 Pupilla quid 400 Pupilla  
 non est atra ibid.  
 Πύλιν 420  
 ψῆας quas Græci musculos  
 vocent 251  

Q

 Quadrupedibus cur diui-  
 sum iecur 299  

R

 ραβδδεῖς futura 35  
 Radius 132 Radius eiusque  
 situs & motus 134  
 Ratio regina virtutum 29  

Mm



# I N D E X.

Rancedo ob morbum Gal-  
licum 408  
Pæph vnde dicta 24  
Realdus ossa capitis octo  
numerat 38  
Rectum intestinum 422  
Recti intestini arteriæ  
342  
Renes quid 427 Renum fi-  
tus 314 Renū opus quod  
450  
Rete mirabile dari 336  
Retina quid 402 Retina a-  
lit humorē vitreum 404  
Rima vocem modulans 82  
Rimæ magnæ in orbita  
69  
Rotatores processus 12  
Rugæ in collo matricis 445  
S  
Sacrum os maius humero  
129  
Sagittalis sutura 35 Sagit-  
talis quandoque ad na-  
res vsque descendit 36  
Saluatella 307  
Sancta mulier costas xxv.  
habuit III  
Sanguis in iecore tantū gi-  
gnitur 300 Sanguine par-  
tes omnes aluntur 305  
Saphena vena 319  
Scaphoides tarsos 166  
Pocidēs 171  
Scapulæ cartilago 189 Sca-  
pule vbi fungosæ & me-  
dulloſæ 125 Scapularum  
musculi 246 Scapularū  
numerus 122 Scapularū  
ossis coarticulatio 10  
Sceletos quid 202 Sceleti

venustas in quo cōsistat  
213 Sceletus vt parari  
debeat 203 Sceletus Bar-  
tholomæi Stratenſis III  
Sceleti puelli nō diu eo-  
quendi 214 Sceletos vt  
bene oleat 214 Sceletos  
diu in vsu 202 Sceleti a-  
natome quando & quid  
sequatur 1  
Sciæ vena 320  
Scrotum quod 438  
Scutiformis cartilago 188  
Sectio testium 439  
Sedes delectationis in mu-  
lieribus 447  
Sella in sphenoidē 45  
Semen qui exeat 431 Semē  
cur non semper a formi-  
na detineatur 454 Se-  
minariorum vasorū iter  
154 Seminales arteriæ  
341 Seminalis venæ or-  
tus 315  
Sensus exquisitus sub vn-  
guibus 191  
Septum transuersum 255  
Septum transuersum quid  
257  
Sesamina cur sint dicta 178  
Sesamina ossa non pror-  
sus solida 6  
Sigmoides vnde & cur 132  
Simia manibus vtitur 59  
Simiæ facies similis hu-  
manæ 54 Simiæ quid  
pro osse in corde 122  
Sinus pportione respōdent  
capitib. processuū 13 Si-  
nus amplius quis ib. pla-  
nus & obscurus quis ib.  
Sinus

# I N D E X.

Sinus amplius in osse frō-	Statura sceleti	203
tis 42 Sinus ossis quan-	σταθμική	488
doque à processu & car-	συλκοειδής	43
tilagine amplificatur 13	στέφαν	119
Sinus inter ilium & co-	σῆθος quid	ibid.
xendicem 151	Stylois processus 293	Sty-
Siphac quid 432	loides processus non agit	
Soporariæ arteriæ quæ 333	manum in obliquum 133	
Speculū quid in cerebro 353	Styloides processus quæ 12	
Specillorū inuentio 403	Sumen quid 430	
Sphenois sellæ 338 Sphe-	Superciliorum processus 14	
noidis processus vesper-	Superciliorū musculi 223	
tilionum alis similes 57	in suspensū caput nō lu-	
Sphenoidis os instar sellæ	xatur 194	
excavatum 69	Sutura quid 16	Suturæ
Spina dorsi inter ossa primo	quot 24	Sutura addita-
generatur 456 Spina cur	menta labdoidis dicta 37	
sic dicta 86 Spina dorsi	Sutura caluariz vix scal-	
cartilagines 186 Spina	pello diuelluntur 24	Su-
tibiz quid 161 Spina in	tura coronalis 35	Sutu-
iliis quid 149 Spinalis	rarum differentia 36	Su-
medulla naturā sapit ce-	turarum diuisio 34	Sut-
rebri 86 Spinalis me-	numerus 34	Sutura Lā-
dulla est cerebrum pro-	doidis siue Labdoidis 34	
ductum 87	Sutura sagittalis 35	Su-
Spiritus animales vbi gene-	turæ septima & octaua 38	
rentur 351 Spiritus ani-	Sutura sexta quid 53	Su-
males vt generentur 411	Sutura στεφανεία, λαμβδαι-	
Spiritus vitales 412 de	δής, ὀβελιαία quæ 25	Su-
Spiritibus animalib. no-	tura transuersa 55	Sutu-
ua opinio 45	ræ vtilitates tres 32	Su-
Splen quid 425	turarum vtilitas 30	Su-
Spongiosa ossa 58	tura vnde dicta 24	Sutu-
Σφλωειδὲς os 45	ræ exiguæ & amplæ quos	
Σφικτική 164	dolores plerunq; appor-	
Squamæ ossis caluariz 34	tent 30.31	Suturæ in val-
Squamosarum suturarū	de senib. 33	Suturæ quæ
descriptio 36.37	Suturæ	nominentur 34
Squa-	ob trāspirationem factæ	
mosa ossa cur sic dicta 37	15	Suturæ intus obscuræ:
Squamosa ossa quæ 25	extra magis perspicuæ 38	
Staphæ comparatum os 50		

# INDEX

**Symphysis** quid 23 **Sym-**  
**physis** f. **Vesalium** quæ 18  
**Symphysis** ossiū quid 16  
 eius diuisio ibid. **Sym-**  
**physis** f. **Galenum** quæ 18  
**Symphysicos** diuisio 23  
**Synarthrosis** quid 16.20 eius  
 diuisio 16 **Synarthrosis**  
 & **diarthrosis** vti differant  
 16 **Synarthrosis** f. **Gale-**  
**num** quid 18 eius species  
 f. eundem ibid.  
**Synchondrosis** quid 17.26  
**Synchondroseos** exem-  
 plum 26  
**Syndesmos** quid 26  
**Syndesmos** quid 192 **Syn-**  
**desmos** quid 17  
**Synneurosis** quid 26 **Syn-**  
**neuroseos** exempla 27  
**Synsincipitis** ossa 38 vti an-  
 cipit.  
**Syssarcosis** quid 17.26 **Sys-**  
**sarcoseos** exempla 27  
**Syssarcosis** **Aristotelica**  
 27  
**Systole** in pueri **bregmate**  
 perspicua 38  
 T  
**Tabula** compositionis os-  
 sum 16.17  
**Talus** tarsos 166 **Talios**  
 sinuatum 168  
**Tarsus** quid 165 **Tarsi** ossiū  
 substantia 175 **Tarsi** ossa  
 cur prominent 173  
**Temporis** os asperum 182  
**Tēporalis** musculus 229  
**Temporalium** oss. figura  
 42  
**Tendo** quid 218 **Tendobi-**

**cornis** 293 **Tendines**  
 quatuor in musculo tan-  
 quam in crumena 151  
**Tēdinis** octauī musculi  
 pedis insertio 176 **Ten-**  
**dinis** & **nerui** diff. 218  
**Tendines** musculorum  
 alij perforati, alij mini-  
 me 217 **Tendines** ma-  
 nus perforati 289 **Ten-**  
**do** manus bifidus 292  
**Tendo** longissimus hu-  
 mani corporis 177  
**Tenuia** intestina quæ 421  
**Testes** qui 438 **Testes** san-  
 guinem album reddunt  
 304 **Testes** virorum &  
 mulierū inter adenes 394  
**Testes** in cerebro 354  
**Testiculorū** musculi 164  
**Testiū** vsus in muliere 451  
**Thoracis** motus volūtarius  
 188 **Thoracis** musculi  
 251 **Thoracis** vertebrae  
 87.96 **Thorax** in se quid  
 contineat 414 **Thorax**  
 cur non totus osseus 110  
**Thorax** ex quibus cōstat  
 109 **Thorax** & naturali  
 & voluntario motu mo-  
 uetur 251 **Thorax** cur  
 sphæricus 117  
**Thymus** sive lactes sub iu-  
 gulis 393  
**Thymus** glandula quid 415  
**Tibia** quid 159 **Tibiæ** mu-  
 sculi 171 **Tibiæ** sinuum  
 cartilago 189 **Tibia** lon-  
 gior humero 129 **Tibia**  
 tribus præcipue partibus  
 incuruatur 160  
**Topi-**



# INDEX.

Topica remedia mucronata cartilagini temere adhiberi 199  
 Torcular 312. 337 Torcular quid 350  
 Trachea anulis crebris constat 185 Tracheam arteriam omnes Anatomici voluerunt ex cartilagine constare 184  
 Transuersi processus medię vertebrę lumborū quales 101 Transuersales musculi 262  
 Τροχαντήρες quid 156  
 Trochanteres processus appendices videntur 12  
 Trochlearum forma 130  
 Tubera in occipite duo 41  
 Tunica nares, palatum & linguam circumdans, portio durę matris 407  
 Tunicalinguam ambiens 433

## V

Varici forme vas 437  
 Vasa præparantia quę 435  
 Vasa seminaria 435 Vasa semen præparantia 163  
 Vasa seminaria in mulierib. quomodo constituta 317  
 Vulvę muliebris imago in cerebro 354  
 Valuarum cardinibus articulatio comparatur 92  
 Vena quid 305 Venę capitis ossa, utramq; maxillam dentesq; nutriens 313  
 Vena quę ad duram matrem inseritur 311 Vena

quo sinu costarum suscipiatur 11 Vena à liene ad ventriculum acidum humorem deferens 301  
 Vena cava in duas scinditur partes & ubi 316  
 Vena arteriosa 326 Venę concaua, chylis quę 304 Venę iugularis 311  
 Vena in capitis affectib. secari solita 309 Vena mirabilem sinum constituens 312 Venę mesentericę 424 Venę quę sanguificandi vi careant 304 Venas substantiam cerebri ingredi nemini hæcenus cognitum 312  
 Venę emulgentes 428 Vena umbilicalis 454  
 Venę cur genitę 406 Venę portę primus ramus 300 Secundus, tertius, quartus 301 Quintus, sextus, septimus 302  
 Vena quę in Angina seceatur 311 Venę quę in viris anteriores abdominis musculos alunt in foeminis lac generant 310  
 Venę ortus in sinib. nervorum 94 Venarū vsus duplex 303 Venę capitis musculis deseruiētes 310  
 Venę vertebrae ac spinalem medullam nutriendes 306  
 Venarū substantia 312 Venę portę origo 300  
 Venę peritonęum alentes 317 Venę membra-

# INDEX.

- na synonyma 401 Venę  
 feminales 431 Vena sine  
 pari 305 Venę per quas  
 menstrua purgantur 318  
 Veneris mons 295  
 Ventriculus non nutritur  
 chylo 301 Ventriculus  
 omnem cibum albū red  
 dit 304 Ventriculi virtu  
 tes 418 Ventriculus non  
 nutritur chylo 419 Ven  
 triculi cerebri 350 Ven  
 triculus quis 417  
 Vermes in cerebello 356  
 Vertebra quid 85 Vertebra  
 quę & quot proprię 87  
 Vertebra decima in cane  
 & simia medium verte  
 brarum dorsū, in homine  
 duodecima 99 Vertebra  
 lumborū 100 Vertebra  
 omnes habent processus  
 ascendentes & descende  
 tes 93 Vertebra quid cō  
 mune habeant 103 Ver  
 tebra omnes habent ap  
 pendices 196 Vertebra  
 secūda facilius frangitur  
 quam luxetur 194 Ver  
 tebrarū cōpositio in  
 star carinę 84 Vertebra  
 thoracis processus quin  
 que habent 100  
 Vesal. errat in describendis  
 nasi musculis 221 Vesal.  
 error de nervorū in mu  
 sculos distributione 218  
 Vesal. error de circulari  
 motu digitorum 146  
 Vesal. error de duobus la  
 ryngis primis musculis  
 238 Vesal. error in adna  
 scentia appēdicis hume  
 ri 132 Vesal. error, insci  
 tia. laus 219 Vesalij error  
 de symphyssi 18 Vesal. er  
 ror de appendice hume  
 ri 130 Vesalij error circa  
 appendices 19 Vesal. er  
 rat in musculo flectente  
 tibiam ad ext. 157 Vesal.  
 falso citat Gal. 40 Vesal.  
 de verteb. lumb. error 101  
 Vesalius peccat circa os  
 sium commissuras 19  
 Vesalius male distinguit  
 inter rotatores proces  
 sus & appendices 12  
 Vesalio multum tribuen  
 dum ob artem anatomi  
 cam 18 Vesal. non sibi  
 constat de maxillę ossiū  
 numero 53 Vesal. quan  
 doq; errat nimio studio  
 reprehendēdi Galenū 7  
 Vesal. errat in oculi histo  
 ria 405 Vesalij inscitia  
 207. 214 Vesal. negligētia  
 250 Vesal. laudatur 48  
 Vesal. laus in explicatione  
 vsus styloidis 134 Vesal.  
 in Germaniā opus suum  
 anatomicum apparat 112  
 Vesal. in describēdis mo  
 tibus capitis Galeno di  
 ligentior 89 Vesal. oppu  
 gnatur de soliditate ossiū  
 nasi, sesaminum & audi  
 tus 6 Vesal. maxillę os  
 quartum quod 57 Vesal.  
 sermonis prolixitas 104  
 Vesal. ridiculus Galeni  
 repre-

# I N D E X.

- reprehensor 235 Ves-  
falius Gal. impugnatio  
doctrina de appendicum  
vfu 8 Vesal. interni  
quidam musculi narium  
mouetur 183 Vesal. quot  
capitis ossa numeret 38  
Ves. non humanos ocu-  
los dissecut 228 Vesal.  
non bene docet de iugali  
osse 47 Ves. secabat la-  
ryngem bruti nō homi-  
nis 80  
Vesica quæ 430 Vesicæ ar-  
teriar 343 Vesica bilis 426  
Vesicæ musculi 166  
Vestalis Pilosa 470  
Vestigium pedis quid 175  
Verula 449  
In lib. de Visceribus de quo.  
& de quo non acturus  
Col. 406  
Viscio vt fiat difficilis quæ-  
stio 397  
Vitalis spiritus generatio  
nemini adhuc animad-  
uerfa 325  
Vitreus humor oculi qui  
404 Vitreus humora-  
lit Crystallinum 404  
Vitriurorax 486  
Viua sectio 471 Viua sectio  
vt instituenda & peragē-  
da 473 in Viua sectione  
consideranda 474  
Vlnæ articulatio 130 ab  
Vlna præcipuus motus  
cubiti 136  
Vmbilicus 449 Vmbili-  
cus centrū corporis 322  
Vmbilicalis vena 317  
Vmbilicali arteria ge-  
nerata generatur cor  
344  
Vmboni similis patella 165  
Vngues quid faciunt 147  
Vnguuium natura qualis  
191 origo ibid. de Vn-  
guibus vbi tractabitur  
144  
Vnio ossium brachialis 138  
Vola 287 Vola cur caret  
pilis 470 in Vola ma-  
nus nunc quinq; nūc se-  
ptem nerui 376  
Vox vbi primo efformetur  
235 Voces graues vnde  
239  
Vreter 315 Vreteres quid  
429  
Vrina infantis vbi 458  
Vrina non colligitur in  
vesica per resudationem  
429 Vrinaria vasa quid  
429  
Vteri synonyma 443 Vteri  
fibræ 444 Vteri longi-  
tudo 445 Vteri musculi  
165  
Vua & eius synonyma 407  
Vuula ibid. Vuca vnde  
sic dicta 401 Vuca non  
est in omnibus concolor  
400  
Vulnus lethale in cartila-  
gine mucronata 188  
Vulnera lethalia 39 in  
Vulneratis cur interdū  
sensus interdum motus,  
interdum vterq; amitta-  
tur 379 Vulnera ad sca-  
pulæ processum cur le-



# I N D E X.

thalia	374		Y
Vulua non motu volunta-		Υψιλοειδὲς os	77
rio mouetur	163	ὕστερος	443
X			Z
Xenodochium Diuz Ma-		Zirbus quid	424
riz Nouz Florentiz	35	Ζιφοειδής	188
Xiphoidis Cartilago	120	Ζύγωμα	47

F I N I S.



